





The image shows the front cover of an old book. The cover is decorated with a marbled paper pattern featuring dark, irregular shapes on a lighter background, with thin veins of red and yellow. The spine and corners are reinforced with a brown, leather-like material. A white oval label is affixed to the lower-left portion of the cover.

Scand

87377

Supp

2

Thommas Joh. Hall




Thommas Joh. Hall

Thomas Hall

Broderen og

Sønne og



8° 50 Sup 87377 (2)

Naturhistorie

for

Ungdommen

af

P. Chr. Asbjørnsen,

Stud. Med.

Anden Deel

Fuglene.

BIBL. STE
GENEVIÈVE

Christiania.

Forlagt af Guldberg & Dzwonkowskii.
Trykt i Forlæggerens Officin af L. Nisum.

1840.

(9975)

Thomas Jacob Aall.

Statistische

Angaben

über die

Landw.

Statistik

Englanc.

Veröffentlichung

Verlag von G. Fischer, Leipzig

1890

Indledning.

Om Fuglene.

Fuglene (Aves) ere varmblodige Hvirveldyr, der aande ved Lunger, lægge Æg, som ere forsynede med en kalkagtig Skal og udruges ved Legemets Varme. Deres Legeme er bedækket med Fjære; Forlemmerne ere indrettede til Flugt, kun de bageste til at gaae eller svømme med. De forlængede Kjæver ere overtrukne med en hornagtig Beflødning, som kaldes Næbbet.

Disse ere de mest isinesfaldende Eiendommeligheder, hvorved Fuglene adskille sig fra Pattedyrene; men deres Skelet og hele indre Bygning har endnu mange flere at opvise. Fuglenes lange rørformige Knogler ere haarde, fjære og (undtagen i den unge Alder) fordetmeste hule og uden Marv. Skelettet har kun lidet Brusk og danner fornemmelig en rummelig Brysthulhed. Hovedet er li-

det; Hjerneskalens Been ere sammenvorne, Ansigtets derimod ikke, og Overnebbet kan bevæges ved Hjælp af Kvadratbenet og det trefantede Been. Baghovedet har kun een rund Fremstaaenhed, der passer i en tilsvarende Fordybning i den første Halskugle, hvorved Fuglene sættes istand til at dreie Hovedet til alle Kanter. Halsen har fra 9 til 23 Halskugle; dens Længde retter sig efter Antallet af Kuglerne, der ere meget bevægelige. Ryg- og Lændekuglerne ere derimod sammenvorne, saa at de tilhøde Ringerne og deres stærke Muskler et fast Støttepunkt. Brystbenet er stort og paa Midten forsynet med en fremspringende Kam, der tjener til Befæstningspunkt for det overordentlig stærke Muskelapparat, hvorved Ringerne bevæges nedad. Tillsigemed Ribbenene, der bestaae af tvende under en Vinkel sammenstødende bevægelige Stykker, stiger Brystbenet langt ned og kan ved disse sænkes og hæves som Bunden i en Blæsehælg. Til Brystet ere Ringebenene befæstede ved lange og smale Skuldrerblade, stærke Nøglebeen og ved Gaffelbenet. Ved det stærke Bryst og Nøglebeen, ved Kuglernes Sammenvornung faaer Fuglens Legeme en overordentlig Fasthed, medens Brystkassen ved Ribbenenes Bevægelighed og derved at Mellemgulvet mangler, kan udvides betydeligt. Forlemmene bestaae af Overarmen, Forarmen og Haanden, hvilken sidste kun har een fuldkommen og to ufuldkomne Fingre. Naar Fuglen hviler ere Forlemmerne bøiede sammen i Form af et flævt Z. Baglemmerne bestaae af Læret, som altid er kort, og Læggen, der før urigtig

kaldtes Vaaret. Det Been, som følger derefter, svarer til Bristen og Platsoden, og kaldes Tarsen. Det Led, hvorved dette Been er forenet med Læggebenet, kalde vi Hælleddet (fordum Knæet). Med Tarsen ere Tærne forbundne ved Led.

I Almindelighed ere Fuglene beklædte med Fjære, den mest passende Bedækning til at beskytte dem mod Indflydelsen af de hurtige Temperaturforandringer, hvorfor de ere udsatte ved at tumle sig i de forskellige Lustegne. Fjærbedækningen dannes af to Slags Fjær, de egentlige Fjære eller Overfjærene og Dunene. De stærkeste Fjære ere Svingfjærene eller Slagfjærene, og Hale- eller Styrefjærene.

Slagfjærene sidde i Bingerne og ligge op til hinanden ved Siderne. De ti første (Slagfjære af første Orden) ere befæstede paa Haandens Been; paa Underarmen sidde Svingfjærene af anden Orden. Dækfjære kaldes Overarmens Fjære, der sidde ved Roden af Svingfjærene og bedække hverandre tagsteensformigt. Hale- eller Styrefjærene sidde ved Siden af hinanden i Hælen.

De egentlige Fjære bestaae af en trind, hুল, med Luft opfyldt, Deel, som kaldes Penneposen eller Spølen, hvori der er en tør, cellet Marv, Sjælen; Posen fortsætter sig opad i Fanen, hvis midterste Deel er fast og kantet, den kaldes Skæftet; herfra udgaae Strålerne til begge Sider; disse ere fine linieformige Pla-

der, der paa Siderne igjen ere besatte med finere Hager, som gribe ind i hinanden saaledes at alle Straalerne danne en Glade. Dunene ere finere og blødere og deres Straaler ere ikke sammenhængende.

Hjærene sidde i regelmæssige Rader fast i Huden, der luffer sig om dem. En Hjør, som endnu ikke er fuldkomment udvoren, kan vanskelig rives ud af Huden; en fuldvoren Hjør udrykkes derimod let. Naar Hjærene skjæres af, vore de ikke til igjen; rykkes derimod en Hjør ud, saa udsveder Huden en Vædske, der størkner og danner en Blære, som efterhaanden forlænger sig, og omslutter den nye Hjør.

Gjennemtrængte af Luften lige ind i Venenes Hulheder hæve Fuglene sig op og bevæge sig i Luften; denne Bevægelse kaldes Flugt. Det er ved de store Svinghjæere eller rigtigere ved den Modstand, hele Vingens Underslade gjør mod Luften, at Flugten bevirkes. Af Haleshjæerene betjene Fuglene sig som et Roer til at frembringe de forskjellige Vøininger og Svingninger under Flugten, og da de saaledes styre dennes Retning, kaldes de Styrehjæere. Efter Vingernes Længde og Dannelse er Fuglenes Flugt forskjellig, enten roende eller seilende.

De Fugle, hvis Flugt er roende, have fordetmeste kortere, spidsere og smælere Vinger, som de bevæge ved

hurtige og gjentagne Slag, f. Ex. Spurve, Uender, Skader. De, hvis Flugt er seilende, have lange, undertiden mere tilrundede og brede Binger, som de bevæge langsommere; de ere ogsaa mere udholdende i deres Flugt, f. Ex. Orne, Biber, Maager. Ofte flyve de i længere Tid med en kredsende Bevægelse i Luften, næsten uden at bevæge Bingerne. — Nogle have den Orne at kunne standse i Luften og holde sig stille paa et Sted ved meget hurtigt at bevæge Bingerne op og ned; f. Ex. Taarnfalken og Tærnerne.

Naar Fuglen vil flyve, gjør den en stærk Indaa-
ding, flaaer med Bingerne og gjør et Spring; jo for-
tere Bingerne ere, desto høiere er Springet; nogle (som
f. Ex. Kragerne) maae endog løbe nogle Skridt med
udspændte Binger for at hæve sig i Luften. Saalænge
Fuglen stiger, vedbliver den at flaae hurtigt med Bin-
gerne, bøier Hovedet opad og Halen nedad; er den kom-
men saa høit som den vil, holder den Legemet horizon-
talt og flyver med jævne Slag; de fleste trække da Be-
nene ind under Kroppen; de langbenede strække dem
bagud; ligeledes strække de fleste Halsen lige ud. Hele
Legemet er da i Ligevægt og Flugten koster kun ringe
Anstrængelse. Naar Fuglen vil sætte sig igjen, vender
den Hovedet ned og Halen op, og synker saaledes hurti-
gere eller langsommere til Jorden. Svingninger og
Bendinger bevirkes ved Hjælp af Halefjærene, som dreies
til den modsatte Side af den Fuglen vil vende sig til.
De forthalede Fugle flyve derfor usikkert. Naar de ven-
de sig i Flugten, dreie de Hovedet til Side, og arbejde

mest med Bingerne paa den modsatte Side. — Der gives faa Fugle, som ikke kunne flyve. Til disse horer Geirfuglen, hvis Svingfiare ere for korte, og Kasfuaren og Fædgjæssene, hos hvilke de aldeles mangle. Nogle Fugle, der opholde sig ved Havet, skulle ofte naar de ere blevne forvildede ind i Landet, tabe Eyen til at flyve, men saasnart de faae Havet at see, kunne de atter flyve. En stor Deel Svømmefugle tabe Flyveeynen i Fældings-tiden, men have da istedet den samme Eyne til at dykke, de havde som Unger, men hvilken de tabte, da Bingerne udvikledes til Flugt.

Fuglenes Fodder have lidet eller intet Kjød og ere fordetmeste til Hælledeet bedækkede med en ru, haard, skjættet Hud. De have to til fire Tæer, efter hvis Forhold og Bessaffenhed man adskiller forskjellige Arter af Fodder. Hos dem alle er, som ovenfor anført, Fodroden og Mellemfoden sammenvoret til et langt Been, der fordetmeste staaer lige op.

Naar Tæerne ere frie og adskilte og tre vende fortil, en bagtil, kaldes Foden en Gangfod; Benene ere beklædte med Fjær til over Hælen.



En Gangfod.

Er Mellemtaaen sammenvoren med den yderste
Sidetaa kaldes de Skridesødder f. Ex. hos
Jisfuglen.

Halvforbundne Fødder eller Fødder med
halvforbundne Tæer ere Gangfødder, hvis forreste
Tæer ved Roden ere forbundne ved en kort Hud.



En halvforbunden Fod.

En Løbefod har en temmelig lang Tarse,
to eller tre Fortæer; Bagtaaen mangler eller er
saa kort, at den ikke berører Jorden, f. Ex. Struds-
sen, Trappaasen, Brokfuglen.



En Løbefod.

En Klattrefod har to Tæer fortil og en
bagtil, f. Ex. hos Spætter og Papegoier; dog

gives der mange Fugle, der flattrer godt, uagtet de ikke have Klattrefodder; andre have Klattrefodder, men flattrer ikke.



En Klattrefod.

Badesoden har en lang Tarse, Benet er nøgent ovenfor Hælen, tre Fortæer og en Bagtaa, f. Ex. Sneppen, Heiren.

En Svømmefod er meget bred og skiftet til at svømme med. Hver Taa kan enten være omgivet med en Svømmehud, som snart er glat og har en udeelt Rand; disse kaldes bredlappede Svømmefodder, f. Ex. hos mange Dyktere; snart er derimod Huden deelt i smaa Lapper og kaldes da smallappede, eller der er mellem Tæerne udspændt en Hinde, som aldeles forbinder dem og de kaldes da heeltforbundne eller egentlige Svømmefodder.




Bredlappet Svømmefod.



Smallappet Svømmefod.



Seeltforbunden Svømmefod.



Pelikanfod.

Hos Pelikanerne og nogle Dyffere ere alle fire Tæer forbundne paa denne Maade. Halsens og Føddernes Længde retter sig ialmindelighed efter hinanden og er indrettet efter Fodens Bessaffenhed. Saaledes have Sumpfuglene et langt Næb og en lang Hals, men ogsaa lange Been; thi de hente deres meste Føde op af Vand, Dynd osv. Svalerne derimod have meget kort Næb og Hals og ligeledes meget korte Fødder; thi de gribe deres Føde, der bestaaer af smaa Insekter, i Luften. Kun meget faa Fugle (Muursvalerne) have alle fire Tæer vendte fortil; nogle have tre Tæer fortil, men den yderste af disse kan vendes baade for og bagtil. Den kaldes en Vendetaa, f. Ex. hos Uglen. Iffun Strudsen har to Tæer.

Naar Fuglene ikke bevæge sig hvile de; hvilket i daglig Tale hedder, at de sidde; men de fleste hvile staaende, enten paa et Been, som Storken, eller paa begge Been; nogle ligge, idet de trække Benene ind under sig og hvile paa Underlivet, som flere Rov- og Svømmefugle; kun nogle faa Søfugle hvile siddende. Adskillige Landfugle have den Vane at boltre sig i Støv eller Sand, idet de ryste med Hærene, f. Ex. Hønsfuglene; den samme Lyst have Vandfuglene til at bade sig i Vandet, men ogsaa adskillige Landfugle bade sig gjerne i lavt Vand.

Foruden Evnen til at gaae og flyve have ogsaa mange Fugle Evne til at svømme eller bevæge sig paa Vandet. Denne Evne findes for-

nemmelig udviklet hos en egen Orden af Fuglene, som man derfor ogsaa har kaldet Svømmefugle; disse gaae og flyve derimod ofte flet. De fleste Svømmefugle kunne desforuden dykke, eller sænke sig ned under Vandet.

Fuglenes Muskelkraft er forholdsviis større end Pattebyrenes, og det er især i Kjæverne, Bingerne og Fødderne, at denne Styrke har sit Sæde. Rorfluglene kunne i lang Tid svæve ubevægeligt i Luften; Muur- eller Fjeldsvalen flyver næsten hele Dagen uden at sætte sig. Fuglene kunne sove staaende paa en Green, ja endog i længere Tid paa et Been; Strudsen og Kasuaren kunne staae en Mand til Jorden ved et Slag med Foden.

Fuglene have de samme Sandser som Pattebyrene, men de fleste af Organerne udmærke sig ved en meget forskjellig Bygning. Hjernen har kun meget tynde Halvfugler og mangler Bindinger; Nærsenhulheden er mindre sammensat; Dret er simplere; men Diet derimod konstigere bygget. Synet er ogsaa hos mange Fugle overordentlig skarpt; ligeledes Hørelsen; hos mange skal ogsaa Lugten være meget fin. Følelsens og Smagens Sandsere derimod svage.

Ligesom hos Pattebyrene, staae hos Fuglene Hjernens Størrelse og Dannelse i Forhold til Sjæleevnerne. Saaledes finder man nogle iblandt dem, der ere meget

fløge og listige, andre, der ere overordentlig lærvillige
 og have en udmærket Sukommelse (s. Ex. den amerikanske
 Spottetrost). Om Fuglenes levende Fantasi vidne
 deres Drømme og heftige Lidenstaber. Fuglenes Dine
 ere forholdsvis noget store, men kun lidet bevægelige.
 De ere saaledes indrettede, at Fuglene lige godt kunne
 adskille nære og fjerne Gjenstande; hertil bidrager sand-
 synligheds en foldet, sort, for Fuglesiet eiendommelig
 Membran, der dannes af Centralkarrene i det bageste
 Dietammer og strækker sig gennem Glaslegemet hen til
 Lindsen, som derved bevæges; den kaldes Bisten. Den
 forreste Deel af Dieæblet er forstærket ved en af Been-
 stykker bestaaende Ring, hvilken, s. Ex. hos Uglerne er
 meget stor, og foruden de to almindelige Diebryn findes
 der steds i den indre Dietrig et tredje, der ved et mærk-
 værdigt Muskelapparat kan bedække Diet ligesom et For-
 hæng. Fuglenes Dre har en ydre hudet Høregang. Dre-
 muslingen erstattes hos de fleste ved Hjærenes kredsfor-
 mige Stilling. Trommehulheden staaer i Forbindelse
 med Svælget. Sneffen er en svagt krummet Regle;
 men de halvcirkelformige Kanaler ere store og ligge i
 en Deel af Hjerneskallen, hvor de paa alle Sider ere
 omgivne med Lusthuler, der staae i Forbindelse med
 Trommehulen. Ved den tynde Trommehinde sidder en
 liden Beensoile, der med sin anden Ende er indsat i det
 ovale Bindu.

Lugteorganet er skjult ved Roden af Næbbet og
 bestaaer fordetmeste kun af tre bruskagtige Tude.

Tungen er fordetmeste haard og brustagtig; de synes derfor kun at have en sløv Smag, skjøndt de foretrække en Slags Næring for en anden.

Det eneste Organ, Fuglene have for Følesandsen, er Næbbet, hvis Spidse hos flere Vandfugle er overtrukket med en meget nerverig Hud. Hverken i Fødderne, eller i de øvrige Legemsdele lader der sig paavise Spor af nogen Følesands, skjøndt man ikke kan frakende Fuglene en Forudsølelse af Veirforandringer.

Fuglenes Fordøielsesredskaber ere forskjellige efter den Føde, hvoraf de nære sig. Med Næbbet gribe, sønderslide og nedsluge de Føden, men tygge den ikke. Af Tungen betjene de sig til at befordre Nedsvælgningen af Føden, som ikke er vædet med Spyt. Svælget er vidt og Maven enten enkelt eller tredobbelt.

Hos de kjød- og insektædende Fugle er Maven hubet; de have meget tynde Mavemuffler og Føden opløses og fordoies ved Mavesaften. Hos de fleste planteædende Fugle optages Føden først i Kroen, en Udvidelse af Madpiben eller Spiserøret, hvor den opbevares i nogen Tid. Hvor Spiserøret støder til Maven, findes en Formave, hvor Føden dernæst blødes. Derpaa gaaer den over i den egentlige Mave, som hos de Fugle, der spise Frøe og Korn, er forsynet med meget tykke og stærke Muffler ved hvis Udvidning og Sammentrækning de i Maven optagne Fødemidler knuses mellem Mavens

Bægge, der sædvanlig dannes af en pergamentagtig haard og skarp Hud, og virke paa de mellemkomne Korn som et Par Møllestene. Til Sønderknuusningens Befordring nedsvælge desuden de planteædende Fugle Graus og Smaaastene. Endetarmen og Uringangene ende sig i en fælles Abning, der kaldes Kloakken.

Åndedrætssystemet er fortrinlig udviklet hos Fuglene. Lungerne ere heftede til Ribbenene og omgivne med en med store Huller gjennemboret Hud, hvorigjennem Luften trænger ind i flere Hulheder i Brystet, Underlivet, de hule Knogler og selv i Penneposerne. Paa denne Maade kommer Luften ikke alene, som hos Pattedyrene, i Berørelse med Lungernes Pulsaarer, men indvirker paa og ligesom leder Blodet rundt omkring i Legemet. Følgen heraf er, at Fuglenes Blod er meget rødere og varmere end Pattedyrenes.

Lustrøret er langt og bestaaer af hele Bruskfringe. Det har oftere en Udvidning. Det øverste Strubehoved er ufuldkomment og mangler Laag; men ved Lustrørets Deling findes et andet, for Fuglene eiendommeligt Lustrørhoved, hvor Stemmen fornemmelig frembringes. Lungerne danne ikke frit nedhængende Sække, men tvende svampagtige, hvirode, af fine Celler bestaaende, og med parallelle Kanaler gjennemborede Masser, hvorfra Luften gennem hudagtige Celleræffer udbredes rundt om i Legemet.

Det er denne Mængde af Luft, som opfylder Fuglenes Legemer, der næst Hjerene sætter dem istand til at flyve; ogsaa bidrager den betydeligt til deres Stemmes Udholdenhed og Styrke. Paa Grund af Kommunikationen mellem alle Dele kan hele Fuglen saaledes opblæses gennem Luftrøret, og hvis man paa Armpiben af en død Fugl borer et Hul og indblæser Luft, gaar denne ud gennem Luftrøret og Fuglen giver en Lyd fra sig, der ligner dens almindelige Skrig.

Under Forplantningstiden leve de fleste Fugle parviis (i Monogami); færre leve i Polygami, idet een Han lever med flere Hunner saaledes som Hønsene. I dette Tilfælde bekymrer Hannen sig hverken om Hunnerne eller Eggene. Hos de monogame Fugle er det meget forskjelligt. Hos nogle bekymrer Hannen sig mindre om Hunnen og sine Unger, og tager ingen Deel i at bygge Rede, ruge Eggene og made Ungerne, men opholder sig kun i Nærheden af Redet. Hos andre hjælpe Magerne hinanden i alle disse Forretninger: de dele i Alt Godt og Ondt; de bygge Reden sammen, ruge skifteviis Eggene, made Ungerne og værne om dem med forenede Kræfter.

De to Fugle, som under Forplantningstiden have havt Unger sammen, vise ogsaa i den øvrige Tid af Aaret Hengivenhed for hinanden og ved næste Parrings-

tid udgjøre disse to atter Han og Hun ved samme Rede. Ægteskabet vedvarer saaledes uafbrudt for hele Livet og indgaaes aldeles ikke blot for at tilfredsstille Kjønsløst. "Fuglenes Parring synes at være grundet paa en ædlere Følelse, paa Omhed, Hengivenhed og noget, der ligner Kjærlighed. Denne Følelse udtrykker sig tydelig i Magernes Ytringer for hverandre, i Hannernes Omhu for den rugende Hun og i Sangfuglenes Sang. Thi sikkert vilde denne snart vildt raste, snart overgiven glade, snart ømt klagende Sang, hvis den kunde oversættes i Menneskets Sprog og udtrykkes i Ord, indholde noget, der lignede Kjærlighedsfange." — De fleste Fugle lægge Æg kun een Gang om Aaret, og kun naar Æggene berøves dem, lægge de til et nyt Kuld. Andre have regelmæssig to Kuld om Aaret. Her i Landet er Rugetiden fordetmeste forbi strax efter Midtsommer. Da ophører Hannernes Sang, og Ungernes Forsørgelse optager mest Fuglenes Tid. Den Kjærlighed de nære for disse, er ikke mindre end den Omhed, de have for hinanden. Ofte styrte de sig i den øiensynligste Livsfare for at redde sine Unger. Selv Hønen aflægger sin Idmyghed og Forknyttelse, naar det gjælder at forsvare Kyllingerne mod en Fiende.

De fleste Fugle parre sig om Vaaren. Naar Hunnen er befrugtet, drives den af Instinkt til at sørge for Fremtiden og begynder at bygge sig et Rede. Valget af Bygningsmaterialierne, hvorpaa og Stedet, hvorpaa de bygge sine Reder, stemmer

altid overeens med deres Levemaade og Fornødenheder. Med Hensyn til den Maade, hvorpaa de bygge Rede, og Materialierne, hvoraaf de opføre det, kan man adstille tre forskjellige Slags. 1. Nogle søge sig kun en Plads eller et Rum for Redet uden synderlig at benytte sig af fremmede Materialier, f. Ex. Spætter, Pappegøier, Strandsvaler. 2. Andre tage fremmede Materialier, hvoraaf de danne et Rede. Disse ere de egentlige Redebyggere og manges Neder ere meget hensigtsmæssigt indrettede. 3. Atter Andre anvende desforuden Stoffer af deres eget Legeme til Redet.

Fugle af det første Slags have enten Neder i Træstammer eller paa Jorden. Klattrerne lægge sine Æg i hule Træer, undtagen Gjøgen, som værper i andre Fugles Rede. Strandsvalen, Iisfuglen og Alken grave Huller i Jorden, Sandbakker osv., og have derfor faaet Navn af Mineerfugle. — De egentlige Redebyggere danne deres Neder af meget forskellige Materialier. Dagrovfuglene bygge et stort og klodset Rede af Pinde, Grene, Riiskviste osv. Kragefuglene indflette blødere Stoffer mellem Pindene. Sangfuglene danne Reden af Straae, Uld, Fjære, som de ialmindelighed sammenflette paa en meget kunstig Maade. Deres Neder have ofte besynderlige Former. Pungmeisens Rede har Form af en Pung, der har en Indgang paa Siden; dette Rede hænger Fuglen op ved Straa el. besl. og

Naturhistorie. II Deel.

beflæder det udenpaa med Moos eller Løvarter af samme Slags, som vore paa Træet, hvorved den bliver vandskælig at opdage. Skrædderfuglen indfletter med megen Konst Straa og Traade i sit Rede; en Art Spurv, der kaldes Republikaneren, bygger i Selskab flere Neder, der staar i Kreds rundt om en Træstamme, og ere bedækkede med en af Græs dannet Skjærm. De grovere Stoffer findes fordetmeste i Redets Ydre, medens det Indre ofte bestaaer af fine, regelmæssigt ordnede Dele. Der gives ogsaa Fugle, som forbinde Mineerfuglenes og de egentlige Redebyggeres Egenskaber, idet de først grave et Hul og siden udfodre dette med forskjellige Ting. At Vender og andre Svømmefugle rykke Duun ud af deres Legemer, er bekjendt nok; af denne Grund er det Edderfuglens Neder, der giue den fineste Edderduun; derfor findes der hos Maagerne og flere i Rugetiden een eller to nøgne Pletter paa Bugen, som kaldes Rugepletter. De, der affondre et Spytt, bygge Redet fordetmeste af jordagtige Dele, saaledes Svalerne, der med sit Spytt klæbe Dynd og Muld til Mure og Bægge. De spiselige Svalereder skille ene og alene bestaae af saadant Spytt. Sangtrostens Rede bestaaer udvendig af Kviste, indvendig af Hvidmose og raaddent Træe, der er muret sammen med Leer og vaad Jord. Pottemagerfuglen fra Sydamerika bygger et sneglehuusformigt Rede, der alene bestaaer af Leer.

Saa snart Redet er færdigt, lægger Hunnen den samme Dag et Æg, og vedbliver dermed ind-

til det bestemte Antal er lagt. Saavel Eggene's Antal, Størrelse, Farve, som den Tid, der udfordres til deres Rugning, er meget forskjellig. Nogle lægge kun et Egg, mange to, og nogle fra ti til tyve. Adskillige blive ved at erstatte de Egg, man berøver dem. Saaledes lægger Honen i Regelen 50 Egg, naar man vedbliver at borttage de lagte; thi den vil almindelig have 18—20 samlede.

Uddannelsen af det unge Dyr, der hos Pattedyrene fuldbyrdes i Moders Liv, bevirktes hos Fuglene ved Klækning eller Rugning af det allerede fødte Egg. Dette skeer almindeligst ved Varmen af Fuglenes Legeme, og i de tropiske Lande undertiden ved Solens. Man kan ogsaa udklække Fugleunger, f. Ex. Kyllinger, ved kunstig Varme, i Gjødsel eller ved Lampeild i Udrugningsmaskiner og egne, dertil indrettede, Dyne. Den unge Fugls Næring er tilberedt i Forveien og indsluttet i en Sæk, som staaer i Forbindelse med dens Tarmkanal; det er Egggeblommen, hvoraf Ungen i Begyndelsen udgjør en næsten usynlig Deel, som den opsluger, og hvorved den ernæres og udvikles.

Naar Ungerne have opnaaet deres tilbørlige Størrelse, pikke de Hul paa Eggets Kalkskal og frybe ud. De ere da enten strax duunklædte og

funne løbe afsted med Moderen og selv søge deres Føde saaledes som Hønsenes og Undernes; eller de ere nøgne og ufuldkomne, og maa i kortere eller længere Tid mades af Forældrene, indtil de selv kunne flyve ud, f. Ex. Duernes og Sangfuglenes. I dette Tilfælde sørge fordetmeste begge Forældrene for Ungerne. De smaa Sangfugle flyve, naar Veiret er smukt, ud efter 8 til 10 Dage; men maa mades længe efter den Tid. Men selv disse Fugles Unger faae Duun før de faae virkelige Fjær, og enhver Fugl har saaledes et Tidsrum, der gaaer forud før den faaer Fjære, hvori den er beklædt med Duun.

Ligesom enhver anden Klædning, slides Fuglenes Fjærklædning, og de ombytte den derfor idetmindste eengang om Aaret. Dette kaldes Fjærfældingen eller Nytingen, der indtræffer ved den Tid, da Hannen og Hunnen stille sig ad. Den bestaaer deri, at de forslidte Dverfjære falde af, og nye komme i deres Sted. Dunene fældes ikke. Hos Rov- og Sangfuglene foregaaer Fældingen kun een Gang om Aaret; disse Fugle ere da stille og sørgmodige og æde kun lidt, inden de have

faaet deres fuldstændige Vinter- eller Reisedragt. Andre fælde to og flere Gange, f. Ex. Kyperne, og angribes ikke saameget ved denne Forandring. Ingen Fugleart fælder imidlertid Hales og Vingefjære mere end een Gang om Aaret. Mærkeligt er det, at mange Fugle ved Fældingen ligesom glemme sine forrige Færdigheder, og derfor ofte lære om igjen; saaledes maae de afrettede Fiske afrettes paa ny og Kanarifugle og andre Sangere paany øve sig i sin Sang.

De fleste, som fælde to eller flere Gange, faae ved Fældingen en Dragt, som er forskjellig fra den foregaaende. De smukkeste Fjære komme hos disse frem ved Vinterfældingen. Men ogsaa en stor Deel af de Fugle, der kun fælde een Gang om Aaret, ere meget ulige Vinter og Sommer f. Ex. Triften og Vosinken. Disse faae om Høsten en yppigere Klædning end den, de havde om Sommeren; men dens Fjære ere fordetmeste omgivne med en bred smudsigfarvet Rand, der fældes mod Baaren, hvorved de faae en heel anden Farve end forhen. Men der gives ogsaa hos Fuglene en Farveforandring uden Fældning. Korsnæbberne og Konglebiten forandre regelmæssig Farve mellem Fældningerne. De unge Fugles Fjære ere somoftest meget forskellige fra de Gamles. Fordetmeste ere de graalige eller smudsigfarvede. Mange Fugle forandre flere Gange deres Farve, førend

de antage den, der egentlig tilkommer dem. Man maa saaledes kjende Redefuglen, den eenaarige, den toaarige og den gamle Fugl, desforuden baade Han og Hun i Sommer- og Vinterdragt, før man tilfulde kjender en Arts Farve. — Ogsaa Næbbet undergaaer hos en stor Deel Fugle Farvesforandringer efter Alderen og hos en stor Deel ogsaa efter Aarstiderne. Hos mange er det om Vinteren guult, om Sommeren hornbrunt eller sort. Dinenes Farve forandrer sig efter Alderen. Nyrerne fælde ogsaa aarlig Kløerne.

Enhver Art af levende Væsener, og saaledes ogsaa hver Fugleart er af Naturen bleven anvist en vis Zone af Jorden, inden hvis Grændser hvert Individ deraf lever og opholder sig, og som den aldrig med Villie og sjelden ustraffet forlader. Nogle Arter have en meget vid Tumbleplads, der udstrækker sig tusinde Mile; andre en meget indskrænket.

Nogle Slægter og Arter leve kun i de tropiske Lande og udmærke sig ved de mest glimrende, pragtfulde, ofte metalglindsende Fjære, andre kun i de tempererede Zoner, og atter andre have sin Zones Grænse indenfor Sneelinien, og boe altsaa enten paa Toppen af de høie sne-dækte Fjælde eller i Nærheden af Polen. Hos disse er Fjærenes Farvepragt og Metalglands forsvunden, ofte træder den rene, hvide Farve istedet derfor. Ogsaa i

Retningen fra Ost til Vest eller omvendt viser der sig Forskelligheder. Vi finde saaledes en vis Gruppe af Fugle i Brasilien, en anden under samme Paralleler i det Indre af Afrika, en tredje fra disse forskjellig Fuglegruppe i Indien og en fjerde i det tropiske Australien. Mange Arter ere saa lokale, at der i den samme Gruppe paa en enkelt Sted findes en Art, som ellers ikke findes paa noget andet Sted i Verden; dette er Tilfældet med flere Pappegøier. Ligeledes ere de amerikanske Pappegøier baade forskjellige fra de afrikanske og indiske. Kolibriterne ere indskrænkede til den nye Verden. Nogle Arter ere indskrænkede til en meget liden Udbredning f. Ex. i Vestindien, andre derimod have en meget betydelig, f. Ex. *Trochilus flammifrons*, der forekommer ligesaa Lima til Den Juan Fernáñez og Magelhaens-Strædet. Et Beviis for denne Sætning indeholder den skotske Ornitologi; thi den skotske Rype forekommer ikke noget andet Sted i Verden end paa Bjergene i Skotland.

Der gives Fugle, der næsten udelukkende tilhøre den sydlige Halvkugle. Atter andre tilhøre begge Halvkugler, men forekomme kun i visse Egne af dem, f. Ex. Albatrossen. Andre Fugle synes at tilhøre den hele Verden. Dette skal være Tilfælde med Stormfuglen, Graagaasen, Fiskeørnen, Fuglekongen o. fl. — Om at visse Fugle ere indskrænkede til visse Zoner kan man let overtøye sig ved at foretage en Vandring opad et af de Fjelde, hvis Top ligger inden den evige Snees Grændser; inden saa Tømer kommer man her til de samme Fugles Nordgrændse,

som man paa en Reise i horizontal Retning ei træffer inden kortere Tid end Dage og Uger. Nordgrændsen for enhver Art bestemmes saaledes ved Afstanden fra Sneelinien (det være nu i horizontal eller vertikal Retning). De samme Løbe vise sig endnu tydeligere i Planteriget.

Antallet af samtlige Fuglearter anslaaes med et rundt Tal til 5000. Bonaparte opregnede i 1832 4109 Arter, men i Berlinermuseet vil man paaataa der skal findes 6000. Af disse tilhøre efter Swainson 388 Arter Europa. I Skandinavien findes 269 Arter; i Norge anfører Rasch 218, af hvilke 194 forekomme i Omegnen af Christiania.)

Da Fuglene ere de Dyr, der med den største Frihed og Lethed kunne forandre Sted, er Vandringsdriften meget udviklet hos dem. En Vandring kaldes enhver Bortfjernelse fra Fuglens Hjem, naar den foregaaer paa bestemte Tider. Foregaaer den derimod kun til ubestemte Tider, er den en Udvandring, hvorpaa hos os Harefuglen og Tiuren om Vinteren undertiden afgive Exempler. Fuglene kunne være Standfugle, saadanne som hele Aaret gjennem blive i

sit Hjem og ei forlade den Egn, hvor de ere fødte, hvor de bygge Rede og klække Unger; eller Strøgfulge, d. v. s. saadanne, der stryge om Høst og Vinter i andre Egne end der, hvor de ere blevne udklækkede, uden dog 'at gjøre lange Vandringer; eller Træffugle, som gjøre saa lange Vandringer, at der ligger flere Længde- eller Breddegrader mellem deres Sommer- og Vinteropholdsted, f. Ex. Svalen, Graagaasen, Storken, Gjøgen, Lærken.

Det er vanskeligt at afgjøre, om en Fugl er Standfugl eller ikke; skal den kaldes Standfugl, maa det være de samme Individuer, som blive hele Aaret (f. Ex. Hjerpen), men dette er ikke altid Tilfældet med de Fugle, der bære dette Navn. Saaledes er der flere Fugle hos os hele Aaret; men de, som ere her om Sommeren, drage om Høsten til sydligere Egne, hvorimod der kommer andre fra de nordligere, der blive Vinteren over. — Nogle Fugle drage periodisk bort fra høiere Breddegrader, for at undgaae Vinterkulden og hvad der følger med den, Mangel paa Næring, Insekter og Planteføde; Andre skulle foretage disse periodiske Vandringer, for at søge visse Næringsmidler, som de ansee nødvendige til Ungernes Opføddning, og drage til denne Ende ofte tusinde Mile bort over Oceanet. Til disse Træffugle henregnes Bakkelen, Rattergalen, Storken, Graagaasen, Svalen

o. m. fl. — Alexander von Humboldt omtaler ligesaa regelmæssige periodiske Vandringer hos de amerikanske Sefugle, der drage fra den ene Side af Troperne til den anden, i en Zone, hvor Temperaturen stedsse er eens. Der er altsaa ikke nogen lavere Barmegrad Aarsagen til Reisen. Det er heller ikke Tilfældet med en Deel af de Træffugle, der findes hos os; thi de afreise under en Barmegrad, der er langt høiere end den, hvorunder de ankom. Derimod er der meget, som taler for, at det er en i Dyret boende Drift, der uimodstaaeligt tvinger det til at forlade sit Hjem eller vende tilbage dertil paa en vis Tid. „Instinktet viser sig her reent og ublandet; Fuglen handler uden selv at vide hvorfor, den føres af en indre Drift og gaaer derved ofte, uden ydre Nødvendighed, den siensynligste Livsfare imøde, f. Ex. naar en liden Spurvefugl forlader Fastlandets nordligste Spids, og styrter sig ud i Luften over det stormfulde Ocean, for efter hundrede Miles modsommelige Flugt at klække paa en liden Klippe i Polarhavet.“ — Man seer saaledes ogsaa, at fangne og tæmmede Fugle, der hverken mangle Føde eller have Kulde at befrygte, regelmæssig vise Tegn til Uro og Reiseslyst paa den Tid, da de vilde Fugle af samme Art drage bort. Imidlertid er det unægteligt, at Fuglenes Vandringsdrift staaer i nøie Forbindelse saavel med deres eget som Ungernes Velbefindende og Bekvemmelighed og ligesom er beregnet derpaa. Man kan i denne Henseende, naar man ikke blot tager Hensyn til Træffet hos de egentlige Træffugle, men ogsaa til de Spoer af Vandringsdrift, der findes hos alle

Fugle, autage tre Slags Vandringer, 1. **Næringsvandring**, 2. **Sikkerhedsvandring** og 3. **Ynglevandring**.

1. En **Næringsvandring** har til Hensigt at forskaffe Fuglen de Næringsmidler, der ere nødvendige til dens Livsophold. Hos mange Fugle ere disse Vandringer meget korte og indskrænke sig til at være blotte Døgnvandringer, som hos Krager, mange Bildænder osv.; hos mange ere de meget lange, f. Ex. hos Albatrossen, der reiser fra Sydhavet over Ækvator til det østlige Hav. De fiskædende Fugle rette sig i deres Vandring efter Fiskenes Vandringer i Floderne.

Mange nordiske Søfugle tilbringe saaledes Natten roligt ude paa Havet, men saasnart det gryer ad Dag, søge de ind til Stranden og i Gjordene, hvor Vandet er lavt og hvor de lettere kunne faae deres Føde; mange af dem følge paa disse Døgnvandringer nøiagtigt den samme Vej i Luften, saaledes at man fanger dem i Flokke ved at stille Garn i Luften for dem; de følge saa nøiagtigt Landets Omrids, at de aldrig sætte over den smaleste Landtunge. De Fugle, der almindeligst fanges med Næt i de svenske Skjærgaarde, hvor denne Fange- maade er brugelig, ere Svartanden (*Fuligula fusca*), Hvidanden (*F. glacialis*) og Ederfuglen (*F. mollissima*). Saaledes fanges ogsaa Bildgæsene, som hver Dag

gaae fra Søerne op paa de besaaede Kornmarker over de laveste Egne af Birkeskovene, af Rosatterne; de hugge nemlig smalle Veie gjennem Skovene, hvori de opstille deres Garn. Vignende Dognvandring foretager Vanddringsduen og andre fornædende Fugle i Nordamerika; om Dagen ødelægge de Riis- og Maismarkerne, mod Aften søge de i tallose Flokke til Skovene, hvor de holde Nattekvarteer.

2. En Sikkerhedsvandring har til Hensigt at opnaae den Tryghed og Sikkerhed, der er nødvendig for Fuglens Liv; f. Ex. naar Fuglen op søger et Sted, hvor den kan være i Fred for sine Fiender, eller hvor den kan finde Beskyttelse mod Veirligets Indvirkning osv. Denne Drift sees tydeligst, naar Fuglene begive sig hen til affidesliggende Steder i den Tid de fælde og altså ere udygtige til at flyve.

Hannerne af de af vore Vandfugle, som klække inde i Landet, begive sig i Fældingstiden til de større Indsøer, der ere omgivne med Siv eller med sibe stærkt græs- og mosbegroede Eng, hvor de søge Skjul om Dagen; om Natten søge de derimod ud paa Vandet for at erholde Føde. — Adskillige Vand- og Røvfugle holde sig, saalænge de ere unge, affondrede fra de ældre, og søge først, naar de ere blevne yngledygtige, tilbage til disses Opholdssteder. Denne Vandring foregaaer altsaa

kun een Gang i Fuglenes Liv, og mange Egne have af denne Grund kun unge Fugle af en vis Art, saaledes seer man aldrig i Søerne i Schweiz gamle Ederfugle eller andre Audearter.

3. Unglevandringen har Omsorgen for den kommende Ungel til Hensigt og viser sig derved, at Fuglen drager tilbage til de samme Steder, hvor den selv kom til Verden, og som mest begunstige Ungernes Dannelse og Væxt.

Disse Vandringer foretages til bestemte Tider og netop til saadanne, da disse Steder ere mest skikede til at modtage dem. Jo længre Vinteropholdet er bortfiærnet fra Fuglens Hjem, desto senere kommer den tilbage.

Den Tid af Døgnet, paa hvilken Fuglene vandre, er forskjellig. Om Dagen reise Dagrovfugle, Lærkerne, Stærren osv. En Deel af dem holde sig sammen i Skarer, begynde oftest at vandre tidligt om Morgen, og sætte sig ned om Middagen for at hvile og søge Føde. Om Natten vandre Trosterne, Uglerne og mange Gump og Søfugle; de bryde op mod Skumringen og sætte sig mod Morgen; i stormfulde Nætter holde de sig stille og holde mest af Maanenskin og den stjerneklare Himmel. Baade Dag og Nat vandre Gjæssene, Storkene, Bipstjerterne o. fl. Dog er der adskillige, som kun vandre den ene Tid af Døgnet, men tage, naar de have Hæstværk, den anden til Hjælp.

Nogle Fugle reise eenlige, f. Ex. Snepperne, Hær-
fuglen o. A., og stedsø om Natten. Atter Andre i Sel-
skab og samle sig enten først familievís, og forene sig
siden til større Flokke; eller de samle sig strax i store
Flokke, ofte paa visse bestemte Steder; eller de samle
sig med andre Fugle og reise i deres Selskab; saaledes
reise Biben og Brokfuglen gjerne sammen. Hanner,
Hunner og unge Fugle reise gjerne sammen; dog gives
der herfra mange Undtagelser. Om Vaaren komme saa-
ledes Hannerne af flere Arter, f. Ex. Vosinken, Bruus-
hanen, Biben, den sorte og hvide Bluesnapper m. fl.
8—12 til 16 Dage førend Hunnerne og drage igjen bort,
saasnart Ungerne ere flyveborne, medens Hunnerne først
trække længe bagefter. Det samme er Tilfældet med flere
Andearter. Ligeledes er det hos mange Arter alminde-
ligt, at de unge Fugle trække for sig og de gamle for sig.

Den Orden, hvori de flyve, er ligeledes forskjellig.
Nogle flyve i en uafbrudt lige Linie, den ene ved Siden
af den anden, f. Ex. Kragerne; andre danne en bølget
Slangelinie, som Brokfuglene; atter andre danne Vink-
ler eller skæve Linier, f. Ex. Bildgjæssene. Flugten
gaaer bedst imod Vinden, og mange holde sig saa høit
i Luften, at de sjelden sees. Svalerne seer man saale-
des næsten aldrig trække; Traner og Gæs flyve meget
høit; lavere gaae Droske og Duer, og mange Smaafugle,
som Meiser og Gærdesmutter, holde sig i de laveste Re-
gioner; nogle amerikanske Fugle trække nogle faa Fod
over Jordens Overflade. Dog er alt dette afhængigt af

Flyvemaaden. Kun faa Fugle (f. Ex. den grønfødebe Vandhøne) trække gaaende eller løbende, og det er da kun korte Strækninger; naar de skulle til det egentlige Træk, tage de til Vingerne. Vandfuglene trække ei heller svømmende, men flyvende; fra Floberne og Bugterne svømme de ud i Havet, derpaa hæve de sig op i Luften og flyve; naar de atter nærme sig Land, kaste de sig ned i Vandet og naae Strandbredden svømmende.

Mange Fugle have visse Forberedelser, der gaae forud for Vortreisen. Saaledes seer man i den sidste Tid Stærren mod Aftenen med hvinende Bulder at freise om i tallose Skarer, som beskrive mangfoldige forskjellige Bevægelser i Luften. Storken forlader med sin Familie hver Dag i den sidste Uge Nebet, holder sig svævende i en betydelig Høide, og vender først tilbage ved Solnedgang. Det samme er Tilfældet med Svallerne. Man antager, at Fuglene paa deres Reiser i Gjennemsnit tilbagelægge 50 geografiske Mile i Timen; understøttede af Vinden naae de altsaa inden kort Tid de varmere Isthmer. Spallanzani udregne, at en Svale tilbagelegde 92 Mil i Timen og antog Strandsvaleens Flugt for tre Gange hurtigere. Man har anslaaet Ederfuglens Flugt til 90 Mil i Timen og nogle Falkarters til 150.

I Forhold til deres Størrelse og i Sammenligning med Pattedyrene, opnaae Fuglene en meget høi Alder; man har Exempler paa, at Orne og Pappegøier ere blevne over hundrede Aar, og Vosinker og Stilidsfer over fire og tyve.

I Naturens Huusholdning ere Fuglene meget vigtige Skabninger, idet de sætte Grændser for den altforstore Formerelse af mange Orme, Insekter og Planter og derimod selv tjene mange Pattedyr til Føde.

Mange Fugle udrydde saaledes Markmuus, Slanger, skadelige Insekter og Larver osv. Gribbene fortære Radder og befrie derved Luften i de varme Lande for skadelige Uddunstninger. Andre forplante ved deres Gjødning Trø, der ikke synes at kunne spire førend de have gaaet gennem Fuglenes Mave. Saaledes forplantes Mistelen, der vorer paa andre Træer, alene ved Fugle; Duerne paa Banda forplante Mustatnødtræet. Mange ufrugtbare Klipper blive gjort frugtbare ved Söfuglenes Gjødning.

At Menneffene benyttes Fuglene paa mange Maader og gavne ved sine Æg og sit Kjød, der af de fleste give en sund og velsmagende Føde, og ved sine Hjære, der danne en vigtig Handelsartikkel. — Mange tæmmes deels for at afrettes til at fange andre Fugle, Pattedyr eller Fiske, deels fordi de ved Sang eller pudseerlige Manerer forlyste sine Herrer. Nogle kunne ogsaa lære at udføge enkelte Ord. Adskillige holdes tamme alene for sine smukke og glimrende Farvers Skyld.

Fuglenes Skadelighed indskrænker sig mest til, at de ødelægge adskillige gavnlige Dyr for Menneftet, som Rovfuglene eller Heirene; eller at de fortære Frugter og Korn, som Spurve og Duer. I Nordamerika ere de

saakaldte Rilsfugle, Maisædere og Vandringssbuen saa skadelige, at der er bleven udsat Præmier for deres Odelæggelse, ligesom der ogsaa anstilles hele Tog for at tilintetgjøre dem; paa Isle de France ere Hønsene meget skadelige. Kun Lammegribben, Kongeørnen og Harpyen, en Orneart fra Sydamerika, blive farlige for Mennesket selv, idet de to første skulle bortføre Smaa børn, og den sidste vove at angribe Skabningens Herre.

Fuglene inddeles fornemmelig efter Føddernes og Næbbets Bygning i sex Ordener:

- I. Korfugle have et krumt Næb med en skarpt, nedadboiet Hage. Fødderne ere bevæbnede med stærke Kløer. *Floget*
- II. Spurvefuglene omfatte mange, i Størrelse og Udseende meget forskellige Arter, der have det tilfælles, at deres to ydre Tæer ved Roden ere forenede. *Spurven*
- III. Klattrefugle. Deres Ydertaa kan vendes tilbage, hvilket gjør dem stikkede til den opreiste Stilling, de antage, naar de klatre opad Træstammerne. *Papegøien*
- IV. Hønsfugle have et middelmaadigt Næb, hvis øverste Halvdeel er hvælvet. Tæerne ere i Randen tandede og forsynede med en kort Hud ved Roden. *Hønen*

V. Styltefuglene have langt Næb, høie,
fordetmeste ubefjærede Been og Hudlapper
paa Tærne. *Storken*

VI. Svømmefuglenes Tær ere forenede ved
en Hinde, *Anden*

An



Anden Klasse.

Fuglene.

Første Orden.

Rovfugle (Accipitres).

Rovfuglene udmærke sig ved stærke, krogede, spidse Næb og Kløer, frygtelige Baaben, hvorved de blive farlige for de fleste øvrige Fugle og de svagere Pattedyr, Amfibier og Fiske, m. fl.

Næbbet, fordetmeste kortere end Hovedet, er tykt og sædvanlig noget sammentrykt; Overnæbbet er ved Roden beklædt med en Hud, Borhud (cera) og i Spidsen nedbøiet i Form af en Hage. **Næseboerne** ere aabne, snart nøgne, snart bedækkede med fremliggende, haaragtige Håre. **Fingernerne** ere store, Flugten hoi og hurtig. **Benene**, stedsse stærklædte nedenfor Knæet (egentlig Hællebet), undertiden lige til Kløerne, ere fordetmeste meget muskelfærke. **Tærserne** (de Dele, der ligge mellem Knæet og Tærne) ere trinde og i Almindelighed korte og stærke. Alle Rovfugle have fire adskilte Tær,

der paa Undersiden ere knortede og usævne, hvorved de desto lettere kunne fastholde Rovent, samt bevæbnede med stærke, hyaske, tilbagetrækkelige Kløer. **Salen** er lang eller middelmaadig.

Rovfuglens ydre Sandseorganer ere stærkt udviklede: Dinene ere store, Synet skarpt, Lugten og Hørelsen fin. Følesandsen synes at være koncentreret i den nervesulde Hud, der bedækker Næbroden.

Hjernen er i Forhold til Legemets Masse i Almindelighed mindre end hos Sangfuglene og Klattrerne, men større end hos de fleste andre. De udmærke sig heller ikke noget videre ved Konsidrist; dog flere kunne afrettes til Jagt. Rovfuglens Mod og List er noksom bekjendt. Deres Næring bestaaer af Nadsler eller levende varmblodige Dyr, eller Amfibier og Fiske; nogle faa fortære næsten alene Insekter. Tilligemed Kjødets nedsluge de i Almindelighed saavel Skindet med Haar og Hæere, som de mindre Knogler; disse fordøie de let men Hæarene og Hæarene, som de ikke kunne fordøie, opspyes siden i smaa runde Boller. De færreste drikke Vand; thi Blødet eller Saften af det Rov, de fortære, slukker deres Tørst. Blandt Fuglene ere de de stærkeste og modigste. De ere uselskabelige, leve parviis (i Monogami) og bygge Nester paa eensomme, steile og utilgængelige Steder. Hunnen er fordetmeste større end Hannen. Blot Hunnen ruger Eggene; men baade Han og Hun bringe Rov til Ungerne, som de lægge i Nedet. I Begyndelsen ere Ungerne blinde. Af denne Orden findes 26 Arter i Norge.

Man kan inddele Rovfuglene i tre Grupper: Gribbe eller Nadsselfugle, Falke eller høgeartede Rovfugle (*Accipitres falconini*) og Ugleartede eller Natrovsfugle (*Accip. strigini*).

Nadsselfugle (*Vulturinae*).

Hos Gribbene eller Nadsselfuglene staae Dinene høit oppe paa Hovedet. De have et langt ret Næb, der kun i Spidsen er krummet som en Page, og ved Roden for-

synet med en tynd Borhud. Fødderne ere af middelmaadig Høide; Kloernes Styrke svarer ingenlunde til deres Størrelse, og de bruge ogsaa oftere Næbbet til at gribe med. Vingerne ere saa lange, at de holdes halvt udstrakte under Flugtens Gang. En større eller mindre Deel af Hovedet og Halsen er nøgen eller beklædt med Duun og hos nogle besat med fjødagtige Lapper eller Kamme. Nedenfor Halsen have de en Krave af lange Fjær.

Fordetmeste ere Gribbene store, feige, døgne Fugle, der leve i større eller mindre Selskaber og nære sig fornemmelig af Nadsler. Naar de have ædt, danner Kroen en nøgen Knude eller Sæt ved den forreste Deel af Halsen, hvilket giver dem et meget ubehageligt Udseende. Af Næseborene udslyder en stinkende Vædske. Efter nyere Undersøgelser synes det rimeligt at de opdage sit Rov ved Synet og ikke, som man forhen har troet, ved Lugten. Deres Hjem er, med Undtagelse af Ryholland, de varme Lande i alle Verdensdele, hvor de gjøre megen Nytte ved at fortære Nadsler.

Hvidhovedet Grib.

(Vultur fulvus).

Henhører til den egentlige Gribbeslægt (Vultur), hos hvilken Næseborene sidde paa tværs ved Næbroden.

Den hvidhovedede Grib er slank af Skabning; dens Længde udgjør henved $3\frac{1}{4}$ Fod, Bredden mellem Vingespiderne 8 Fod. Farven er gulagtig graabrun, Dunene paa Hovedet og Halsen askegraae, Halskraven hvid, Hale- og Svingffjærene sorte, Næb og Kloer blaaagtige.

Dens Hjem er Bjergene i Asien, Afrika og det sydlige Europa, fornemmelig ved Middelhavet, hvorfra den undertiden forvilder sig til nordligere Egne.

Denne Grib spiser gjerne friskt Kød, som den med Næbbet let skiller fra Benene og Skindet. Hverken denne eller de øvrige Gribbe synes at nedsluge saadanne ufor-



Den hvidhovedede Grib.

døielige Gjenstande, som de øvrige Rovfugle og opfaste desaaarsag heller ingen Fjærboller. Dens Graadighed er meget stor; Udbrudet af dens Hunger skal undertiden ligne et sandt Raseri og overgaae alle Forestillinger. Naar den er mæt, er den saa træg og doven, at man kan gribe den med Hænderne, og naar den er alene, er den saa feig, at en Hare kan jage den paa Flugt.

Rondoren.

(Vultur (Sarcoramphus) Gryphus).

Slægten Kamgribbe (Sarcoramphus) har ægformige, langsstaaend Næseborer og Rjodskamme ved Næbroden. De findes i Amerika og indbefatte de største Fugle i hele Gruppen.

Til denne Slægt henhører Rondoren, en stor Fugl, hvis Størrelse dog af de fleste Reifende i Peru er bleven betydelig overdrevet. Man antog ogsaa at den fandtes i Asien og var den fabelagtige Fugl Roch, der

hyppig omtales i de arabiske Eventyr og hos Marco Polo, og som skulde kunne flyve afsted med de største Dyr, ja endogsaa Elefanter. Den er imidlertid ikke meget større end Lammegribben og tilhører kun Sydamerikas og det sydlige Nordamerikas højeste Bjergegne. Dens Længde er omtrent fire Fod, Bredden mellem Vingespidserne ni Fod. Dog gives der i det londonfke Museum et Exemplar, hvis Vingebredde er tretten Fod.

Hannen har en tyk Kjødudvært over Næbbet og Hovedet, en Kjødlap under Næbbet, og et kjødagtigt Anhang over Kroen. Bag Ørene hænges nogle snorformige Kjødudværter nedest for Længden af Halsen. Hjørnene ere fortblaae, Halskraven hvid, Vingernes store Dækflæde hvide med sorte Spidser. Hunnen mangler Kjødlapperne, og er graabruun med sortagtige Binger. I Ungdommen er Kondoren askefarvet og mangler Krave.

De leve paa de højeste Toppe af Andeshjergene i Sydamerika, til en Høide af over 12,000 Fod, og synes at trives bedst ved en Temperatur af 2 til 3° under Frysepunktet. Alexander v. Humboldt, som vi have at takke for de første videnskabelige Efterretninger om Kondoren, traf den kun ved Grændserne af den evige Sne i betydeligt Antal, og de viste sig her saa lidet sky, at man kunde komme dem paa nogle faa Skridt nær, før end de fløi op for atter at sætte sig nogle Skridt længre bort.

De have fine Næder paa Klippetoppe i Nærheden af den evige Sne og naar man der seer dem mod Himlen, see de uhyre store ud. Hunnen lægger sine tre til fire Æg paa den blotte Klippe og skal blive et heelt Aar hos Ungerne. Ved sin Kjødelhed, ved sin uhyre Styrke i Næb, Klør og Binger, vækker Kondoren mere Beundring end ved sin Størrelse og Vingebredde. I Levemaade har den meget tilfælles med Lammegribben. Den lever i Selskaber af 4 til 6 Stykker. Naar to af dem forene sig, styrte de sig ikke alene paa Hjorten i Anderne, den løveagtige Puma, eller paa Vicunja, men endogsaa paa Kjør og Ungtyr; de forfølge og saare dem saalænge indtil Dyrene styrte aan-

deløse ned og udstrække Tungen, som Kondoren er meget lystet efter. Denne afrikses strax; derpaa udhaffer den Dyrets Dine og aabner Underlivet bagfra, for at komme til Indvoldene. Menneſter angriber den ikke.

Naar Kondoren har gjort et godt Maaltid, bliver den, som alle Gribbe, træg, sætter sig paa en Klippetop og gidder neppe flyve op, førend man kommer den meget nær. I denne Tilstand fanges den let af de Indfødte med Slynger. Naar Kondoren er hungrig, stiger den til en uhyre Høide; ofte seer man den, fornemmelig paa solklare Dage, svæve over Toppen af Chimborasso, d. e. sex Gange høiere end Skyerne over Sletterne. I Fangenskab bliver Kondoren meget tam: En, der findes i Wiener-Menageriet, svinger sig paa sin Herres Befaling op paa Baglen, derfra sætter den sig paa hans Arm, kjæler ham med Næbbet og finder sig i alle Slags Pudserier.

Lammegribben.

(Gypaëtos barbatus)



Denne er af Nogle bleven henført til de Høgeartede, af Andre til Gribbene; men den staaer imellem begge, og danner rigtigst en Gruppe eller Slægt for sig selv, som man har kaldet Drnegrib (Gypaëtos), og hvis Na-

rakkeer bestaaer i et tykt Næb, som i Spidsen er hageformig boiet efterat det først er noget hvalvet opad. Næseborene ere bedækkede med stive fremadrettede Børster. og ved Roden af Undernæbbet findes der et stivt Stjæg af saadanne Børster. Fødderne ere korte og bedækkede med Hjære ligetil Tærne.

Lammegribben er den største Rovfugl i den gamle Verden, hvis høieste Hjerghjæder den, dog kun i ringe Antal, beboer. Den er omtrent fire Fod lang, men heraf udgjør Halsen næsten Halvdelen; Vingebredden udgjør ti Fod. Hovedet er hvidguult, med sorte Toiler, bedækket med korte Hjære. Halsen og de undre Dele af Legemet ere rustgule; forøvrigt er Hjærklædningen brunn eller sortagtig med hvide Hjærskaster. De Unge ere mørkere paa Hals og Bryst.

Den lever kun i Nærheden af den evige Sne. Dens Flugt er saa hoi, at den forsvinder for Diet i Skyerne. Ofte seiler den med næsten umærkelige Vingesslag om i Luften, speidende efter Bytte, og naar den opdager dette gjør den først nogle Kredse, styrter sig susende paa det i skjævt Retning, griber det i sine Kløer, og bringer det hen paa et sikkert Sted, eller styrter det ned i Afgrunden mellem Klipperne. Den angriber fornemmelig Gemser, Geder, Jaar, Harer, Mirmeldyr osv. De større Dyr anfalder den, naar de staae i Nærheden af en Afgrund og skrækker eller tvinger dem til at styrte ud og knuse sig; selv følger den da strax efter og æder først Dinene og Indvoldene; derpaa æder den Kjødet; det Tiloversblevne tager den til Takke med den følgende Dag. Om Vinteren, naar den har ondt for at faae friskt Kjød, gaaer den ogsaa paa Nadsel, som man udlægger paa Sneen for at skyde og fange den; paa den Tid kommer den ogsaa ned i Dalene, hvor den styrter sig paa Hunde og Ræve. En tog en Ræv og sloi op i Luften med, men blev saa heftig bidt af den, at den faldt død til Jorden, og Ræven løb sin Bei. At den angriber Mennekker er udenfor al Tvivl: i Kanton Schweiz styrtede en Lammegrib i Aaret 1778 en Hyrdebrendg udover en steil Klippe

og opaad ham; en anden fløi i Kanton Appenzel bort med et Barn i Forældrenes Paasyn. Thomas Platter fortæller ogsaa, at han som Hyrdedreng i Wallis's Bjerge ofte var udsat for Angreb af Lammegribben.

Følgende Begivenhed, der findes optegnet i Kirkebogen i Sognet Habern, fortælles af Schinz: "Anna Zurbuchen, fra Habern i Berner Oberland, blev som et treaarigt Barn medtaget af sine Forældre, der skulde bjerge Efterslotten, og lagde sig ned ved en Lade. Barnet indslumrede snart, Faderen bedækkede dets Ansigt med en Straahat, og gik til sit Arbejde. Da han kort efter vendte tilbage med en Høvel, var det forsvundet, og Forældrene og i Nærheden værende Folk søgte det forgæves. Ved den samme Tid gik Henrik fra Untersee paa en vild Fjeldsti til Wäggisbach, hvor han til sin Forbauselse hørte et Barn skrige. Hurtigt ilede han efter Lyden; opstrømmet hævde der sig da fra en liden Høide en Ornegrib, der svævede udover den dybe Afgrund. Ved Nænden af denne Afgrund, i hvis Dyb der bruste en rivende Bæk, hvori den ringeste Bevægelse have kunnet styrte det ned, fandt Henrik Barnet, der kun havde nogle ubetydelige Saar og Rifter paa den venstre Arm og Haand, hvorved Gribben sandsynligviis havde grebet det. Dette hendte den 12te Juli 1768. Den Høide, hvor Barnet blev funden, laae 1100 Skridt borte fra Laden, hvor det sov. Efter den Tid blev hun i Egnen kaldt Lammegrib-Anne og ægtede siden en Skrædder, Peter Trutiger i Gwaltswyl, hvor hun endnu levede i 1814." En lignende Begivenhed indtraf i Lauterbrunnthal i Aaret 1813.

Man har benægtet Muligheden af disse Kjendsgjeringer og sagt, at det har været Ornen; men kan Lammegribben, som Steinmüller fortæller et Exempel paa, flyve afsted med en Rævesar af henved tredive Punds Vægt om Halsen, generes den ei af Tyngden, og kan den flyve afsted med Gjeder, Lam og Ræve, er Alørnes Svagbed ingenlunde til Hindrer for at det samme kan skee med Born. Selv Borne staae undertiden fare for at styrtes ned i Afgrundene af Lammegribben, dog for-

nemmelig, naar de søge at berøve den dens Bytte eller fratage den dens Unger. Lammegribben fanges i Nævesfare og paa Nadsel. I Fangenskab bliver den velskaffet tam, aflægger sin oprindelige Vildhed og Blubsthed, lader sig haandtere efter Forgodtbefindende, og vover, selv naar den er hungrig, ei engang at angribe værgeløse Dyr.

Den bygger sit uhyre store Nede paa utilgjængelige Klipper, hvor den lægger to til fire Æg.

Høgartede Røvfugle.

(Falconinæ. Accipitres falconini).

De høgartede Røvfugle have stærklædt Hoved og Hals, og Dinene paa Siden af Hovedet. Næbbet er kort og Dvernnæbbet ved Roden beklædt med en stor nogen tyk, narvet Hud, hvori Næseborene ligge. Tæerne ere aldrig stærklædte; Yder- og Mellemtaaen ere ofte forenede ved Roden ved en Hinde. Vingerne ere kraftigt udviklede. Fjærbedækningen er fast og Flugten fordetmeste høi og hurtig.

Hunnen er ofte meget større end Hannen og undertiden af forskjellig Farve. Ungerne ere fordetmeste meget ulige de Gamle; sædvanlig ere de mere plettede og spraglede.

Alle have en Kro, hvori Rødet først opblødes, førend det kommer ind i den membranøse Mave, hvor det alene fordoies ved den kraftige Mavesaft. De ere næsten samtlige stærke Røvere, der, paa faa Undtagelser nær, leve af Vattedyr og Fugle, sjeldnere af Amfibier og Fiske, som mange gribe og dræbe i Flugten. Kun de mindre Arter fange Insekter, og nogle faae vædlere gaae paa Nadsel.

Jagtfalken.

(Falco Gyrfalco).



De egentlige Falke, Udselsfalke, ere i Forhold til deres Størrelse de modigste af alle Rovfugle, hvilket har sin Grund i Styrken af deres Baaben og Vinger. Næbbet er kroget lige fra Roden og forsynet med en skarp Tand paa hver Side ikke langt fra Spidsen. Vingerne ere lange og spidse; den anden Slagfjer længst. De nære sig kun af levende Rov, som de kaste sig paa med saadan en Hastighed, at det hviner i Luften. Af deres Lærvillighed har man søgt at drage Fordeel ved at afrette dem til Jagt.

Jagtfalken varierer meget i Farve; sædvanlig er Grundfarven hvid, med brune Pletter og Striber, hos Hunnen er det Brune mere fremherskende, og hos Ungerne findes der næsten intet Spor af den hvide Grundfarve. Halen er stedse længre end Vingerne og tegnet med 12—14 brune eller hvide Tverbaand; Næbhuden og Benene hos de Gamle gule, hos de Unge blaae.

Jagtfalkens Hjem er vilde Bjergegne i det nordlige Europa og Asien. Paa vore norffe Øøisselbe er den temmelig almindelig; unge Fugle vise sig undertiden saa langt Syd som i Christianiaegnen. Dens Flugt er lige-

faa ffjøn og udholdende som dens Syn er skarpt og dens Lugt fin. Naar den jager efter Fugle, søger den stedse at vinde Høiden, og styrter sig da i Buer ned paa sit Rov, som den helst griber i Flugten med saadan Fart, at man blot seer den som en Stribe i Luften. Den er ffy, forsigtig og listig.

Fugle og mindre Pattedyr udgjør dens Føde; især lever den af Harer, Aarfugle og Bildgæs og Rytter, blandt hvilke sidste den paa Hjelbene anretter utrolige Odelæggelser.

Sit Nede bygger Jagtfalken i steile og utilgængelige Klipper af Riis og Kvist, og lægger deri tre Æg.

Det var denne Art, der ansaaes for den fortrinligste til Falkejagt, der fordum var en meget almindelig Fornøielse for Fyrsterne og andre høie Herrer. Til Norge og Sverige kom der i de Tider, Falkejagten var i Brug (til for omtrent 80 Aar siden), aarlig Falfængere, der paa Dovre, Fjellfeld og flere Steder dreve deres Jangst. Jo yngre Falkene vare, desto lettere vare de naturligvis at tæmme og indøve til Jagt. De opsogte derfor helst deels selve Nedet og toge Ungerne deraf, deels fangedes de udfloine Unger om Høsten; men ogsaa de gamle hyide Falke, der fangedes, kunde tæmmes. For at fange Falkene brugte man følgende Fremgangsmaade: paa en Høide, hvorfra der var vid Udsigt til alle Kanter, grov man en Grav eller Hytte, som man bedækkede med Døv. Paa Taget havde man en levende Varsugl (*Lanius Excubitor*), som ved sit Skrig tilkjendegav Falkens Ankomst. Tæt ved den underjordiske Hytte stode to høie Stænger i Jorden, som i den øvre Ende var forsynet med en Trids, hvorigjennem der gik en Line, og ved det Stykke af denne, der var mellem Stængerne, havde man bundet en levende Due, som uophørligt slagrede. Ved denne var der desforuden bundet en anden Line, med hvilken Jægeren i en Hast kunde nedtrække Duen tilligemed Falken i et nedenunder, paa Marken staaende Falfebur, der var forsynet med Slagnæt. Foruden Jagtfalken fangede man ogsaa i samme Hensigt Pillegrims

falken, Slagfalken, Duehøgen og mange flere Arter. En til Jagt afrettet Falk kostede i ældre Tider 6 til 800 hollandske Gylde (250—300 Spb.).

Naar man vilde afrette en Falk til Jagt begyndte man med at underkaste dens Bidsked og betage den Lysten til at flyve bort. Først gav man den en Læderhætte, der gik ned over Dinene, paa Hovedet; derpaa fattedes den i et i en Snor frit hængende Tøndebaand. Saa snart man mærkede, at den vilde sove, gav man Tøndebaandet et Stød, hvorved den blev nødt til holde sig fast og følgerig ogsaa til at holde sig vaagen. Hermed afværgede nogle Jægere i tre Dage og Nætter, og Falken blev da ved denne vedvarende Vaagen saa svag, at den lod sig behandle, som man fandt for godt. Om dens Been anbragte man Læderremme, hvori der under Dresseringen fæstedes en Snor. Dinene vare bedækkede af den ovenomtalte Falkehætte, saa at Fuglen ikke kunde see sig om oftere, end man sysselsatte dens Opmærksomhed. Paa den venstre Haand trak man en tyk Læderhandske, hvorpaa man satte den, samt vante den lidt efter lidt til at æde af Haanden. Derpaa vante man den paa nogen Afstand til at flyve til Haanden og modtage det Rov, man viste den. Naar den flere Gange havde gjort dette med Lethed og uden at vise nogen Lyst til at flyve bort, tog man den (dog endnu stedsse bunden med en lang Snor) ud i den frie Luft, og øvede den paa længre Afstand og vante den, ligesom Jagthunden, til at lyde en vis Appæl, at komme, naar man sloitode. Endelig slap man Fuglen aldeles fri og fortsatte de samme Øvelser paa Darrer, Heirer, Narsfugle, Naphøns, Vender, Vildgæs osv. Gjorde den Mine til at flyve bort, loffede man den tilbage ved Hjørspillet, en med hyide Hæere beklædt Fugleskabning, som man fastede op i Luften.

Fordum var Falkejagten en af de almindeligste og mest udsøgte Fornøielsen for Tyrker og andre høie Herter. I Orienten har den været udøvet fra Oldtiden af, og er endnu meget almindelig hos de asiatiske Steppesfolk og i Barbarestaterne i Nordafrika, altsaa fornem-

melig hos velberedne Folk og i Egne, hvis øde Nogen-
hed gjør det meget vanskeligt at nærme sig Bildtet.

I Middelalderen var Fælkejagten en af de europæiske
Stormænds almindeligste Forlystelser, hvorpaa der ofte
anvendtes uhorste Befestninger. Nu drives den i Europa
kun af enkelte russiske og engelske Magnater*). Til Skan-
dinavien synes denne Kunst allerede at være bleven ind-
ført af de indvandrede Folkestammer; thi den omtales i
flere af vore ældste Sagaer som en paa de Tider almin-
delig bekjendt og ved Kyrsternes Hof dyrket Kunst. I
Sverige var den endnu i Brug i Frederik den Førstes
og Adolf Fredriks Tid**).

Steenfalken.

(Falco Lithofalco).



Dværgfalken eller Steenfalken er den mindste af de
europæiske Fælke; den opnaaer kun en Længde af ti til

*) Som en Mærkelighed kan anføres, at forrige Høst (1839)
en Hollænder paa Døvre fangede Fælke for at afrettes til
Jagt. Tre Individuer fangedes.

**) I anden Aargang af Skil.-Magaz. Nr. 93 og selsk. findes
en udførlig Afhandling om Fælkejagt, Falkenes Fangst, Dres-
sering m. m., af Forfatteren.

tretten Tommer. Dventil er Hjørklædningen blaa-graa med sorte Streges langs Hjørkflasterne; hos Hunnen og Ungerne mere mørkgraabrune end hos Hannen; Brystet og Maves rustgule med mørkere langsgaaende Striber. Halen længre end Vingerne med sorte eller guulagtige Øverstreges og hvid Spids.

Denne Falkeart tilbringer Sommeren i nordligere Egne, og bygger fornemmelig sit Nede i Bjergegane i Nærheden af Polarkredsen; men ogsaa i sydligere Egne; her i Landet er den saaledes ikke sjelden at see om Sommeren paa Ringerige. Dens Flugt er overordentlig raak; naar den søger sit Rov, der for det meste bestaaer af Smaafugle, Lærker, Finker osv. men undertiden ogsaa af Duer, Bekkasiners og Rødhals, fanger den afsted med Vilens Hurtighed og griber endogsaa Svælen i Flugten. Om Høsten følger den Hinterne og andre Træffugle til sydligere Egne. Dværgfalken bygger i Træer og Bjergrevner og lægger i den ene Ende af Nedet fem til sex kastaniebrunt marmorerede Æg.

Ogsaa denne lille Falkeart har været anvendt til Jagt. Der fortælles, at Catharina den Anden af Rusland morede sig meget ved at jage med Steensfalk, hvorfor der aarliges fangedes saadanne Falke, som afrettedes til Jagt, men om Høsten, naar Jagttiden var forbi, gav Keiserinden dem atter sin Frihed.

Foruden de tvende ovenanførte findes i Norge Pilgrimfalken (*F. peregrinus*), Lærkefalken (*F. subbuteo*), og Taarnfalken (*F. tinnunculus*), af hvilke den sidste er meget almindelig i Omegnen af Christiania.

Duehøgen.

(*Falco (Astur) palumbarius*).

Høgene (*Astur*) adskilles let fra Falkene; deres Næb mangler nemlig den spidse Sidetand, men har istedet

derfor en mærkelig uddragen hvas Flig i Midten af Dvernaabets Rand; Bingerne ere korte; den fjerde Slagflær længst; Halen og Benene ere lange. De ere bjærve og modige og staae i mange Henseender nærmest ved Falkene. Skjønt deres Flugt er rask, bevæge de ikke Bingerne hurtigt; ofte glide de frem næsten uden at bevæge Bingerne. Duehøgen og Spurvehøgen ere de eneste europæiske, de øvrige Verdensdele tælle over tredive Arter.



Duehøgen.

Due- eller Hønselhøgen er en af vore almindeligste og skadeligste Rovfugle. Dventil er den blaa eller brun-graa med en hvid Streg over Vinene; under er den hvid eller hvidagtig med mørkebrune, enten paa Længs eller paa Tværs gaaende Streger. Hos den unge Fugl er Hovedet og Siderne af Halsen hvidagtigt ruffarvede med langsgaaende brune Streger. Halen er lang, afrundet, med fire til fem brede graae og mørkebrune Tværbaand samt hvidagtig Spids. Benene ere gule. Kløerne korte. Fuglens Længde er 24 Tommer.

I hele Europa, det nordlige Amerika og Afrika samt i Asien lige til Persien er Duehøgen almindelig udbredt. Under Forplantningstiden opholder den sig i store og bjergrige Skove, hvor den fornemmelig bygger i høie Træer. I Slutningen af April eller Begyndelsen af

Mai lægger den 3 til 4 blaaagtigt eller grønagtigt hvide Æg, med brune Pletter og Streger. Skydes Hunnen under Ligningstiden, udruger Hannen Eggene og opføder Ungerne paa egen Haand.

Duehøgen er modig og dristig og man har derfor ogsaa afrettet denne til Jagt; men med sine kortere Vinger flyver den hverken saa høit eller saa hurtigt som Jagtsalken. Dog har den det Fortrin for denne, at den griber sit Bytte saavel paa Jorden, som i Luften, og at den med Lethed forfølger sit Rov mellem Grene og Buske. Den støder ikke, som Jagtsalken, lodret paa en flyvende Fugl, men angriber den enten i skraa Retning fra Siden eller vender sig om med ubeskrivelig Hartighed i Luften for med opstrakte Kloer og Been at gribe sit Offer nedenfra. Der gives Exempler paa at den undertiden har angrebet Heste, ja endogsaag Mennekker. Om Sommeren opholder den sig i Skovene, hvor den gjør stor Skade paa Harer og Fuglevildt; thi af Skovfuglene er ingen sikker for den fra Tiuren til Trosten; Høst og Vaar kommer den ikke sjælden frem til Gaardene, hvor den angriber og dræber det tamme Fjerkræ.

Paa de Steder, hvor man bruger Høgebure, fanges den ofte i disse. Ogsaa har man foreslaaet at opsætte i et Træ paa en Stang en udskoppet Due eller Harsfugl, med flere tilspidsede, og med Agnorer forsynede, Staaltraade i Ryggen, hvorpaa Høgen skal spiddes, naar den støder paa Fuglen.

Sos os, hvor man saagodt som intet gjør for at opmuntre til Rovfuglenes Ødelæggelse og derved frede det nyttige Vildt, skydes den kun leilighedsviis.

Spurvehøgen.

(Falco (Astur) Nisus).

Omtrent en Trediedeel mindre end den foregaaende. Hannen 12 til 13 Tommer. Hunnen 15 til 16. Næbbet er sort, Næbhuden grøngul; Benene gule, Kloerne sorte.

Oventil er Spurvehøgen blaaagtig, mørkegraa eller graa-bruun med hyide Pletter i Rækken; under hyid med langs-gaaende Linier paa Struben og paa tværs gaaende paa Brystet, Mavens og Laarene; Halsen lang, tver, afsegraae med faa fortagtige Tværbaand og hyidagtig Spids. Hunnen er betydelig større end Hannen, og oventil mere graabruun og mindre afseblaae, end den.



Spurvehøgen.

Spurvehøgen er udbredt over hele den gamle Verden og almindelig overalt paa den skandinaviske Halvøe. Om Sommeren holder den til i Skove, der grændse nær ind til Marker. Om Høsten forlader den Skovene og følger de store Spurve og Finkeskarer til sydlige Egne. En Deel blive dog tilbage hos os. Spurvehøgens Rov bestaaer fornemmelig i Smaaafugle, Lemmer og Markmuus, men den angriber og dræber ogsaa Narsugle, Duer og tamme Høns.

Spurvehøgen er forsigtig, modig og listig. Den flyver fordetmeste lavt nebe ved Marken, hvor den, frem-svævende med den største Hurtighed og uden mærkeligt at bevæge Bingerne, indjager de fleste Smaaafugle forser-delse. Ved Synet af Rovet forstummer deres Sang og de søge at skjule sig i de tætteste Buske og krybe ind i Kroge og Huller; men selv det yder dem kun ringe Beskyttelse; thi med den største Sikkerhed forfølger og griber Spurvehøgen sit Rov i disse Tilflugtssteder,

og kan den ikke faae det-fat paa anden Maade, saa hopper den efter paa Marken og trækker med Kloerne Smaa-fuglene ud af deres Gjemmesteder. Undertiden skal den tage Sangfugle ud af Buret og forfølge Spurveene under Taget. Ikke destomindre ere Svalerne og Linerlerne dristige nok til at forfølge den med Skrig og Spektakel.

Sit Nede bygger Spurvehøgen i høie Træer i Varskove. I Mai eller Juni lægger den tre til fem smudsig-hvide Æg med leverbrune Pletter. De ruges kun af Hannen, i hvilken Tid Hannen skal føde den.

Sanghøgen.

(*Falco (Astur) musicus*).

Denne er omtrent af Størrelse som Duehøgen. Dventil perlegraa, under hvid med blaaagraae eller brunnagtige Dværstriber; Svingfiærene ere sorte. Dens Hjem er det sydlige Afrika og fornemmelig nogle Landskaber i Kasserlandet i Øst for det gode Haabs Fjorbjerg. Den forfølger Harer og Ræbhøns. Det er den eneste Rovfugl, som man ved synger. Under Parringstiden sidder Hannen i Toppen af et Træ og synger Morgen, Aften og undertiden ogsaa om Natten i hele Timer.

Landørnen.

(*Falco (Aquila) fulvus*).

Ørnene have et meget stærkt, temmelig langt Næb, der kun i Spidsen er krummet til en lang Hage. Egnen mellem Dinene og Næbbet er belagt med Børster. Hovedet og Halsen bedækkede med spidse Fiære. Benene ere meget stærke. Mellemtaaen, som er længst, forenet med Ydertaalen ved en Hud;vingerne lange. Ørnene udgjøre de største Arter blandt de høgeartede Rovfugle. Med Kloerne gribe de levende Rov; men i Rødsfald kaste de sig ogsaa paa Aabsel. De fleste Arter leve for-

nemmelig af Pattedyr og større Fugle; andre leve fornemmelig af Fiske.



Landørnen.

Af denne Slægt have vi Landørne (*Aquila*) og Søørne (*Haliaetus*), der adskilles fra hinanden derved, at de første have Tarserne stærklædte lige til Tæerne, de sidste blot til Midten.

Landørnen eller Kongeørnen, som den ogsaa kaldes, er tre til tre og en halv Fod lang; Vingebredden mellem syv og otte Fod. Hoved og Hals ere paa Oversiden brungule, under sorte, Næbbet blaaagtigt, Næseborene stærtsiddende; Kroppen oventil mørkbrun, under sortagtig. Halen er afrundet, henved tre Tommer længre end Vingerne; til to Tredele fra Roden er den hvid eller graaspraglet, derefter sortagtig. Tæerne gule. Ungerne ere meget mørkere. Forøvrigt er dens Klædning af meget forskjellig Farve i de forskjellige Aldere.

Røngeørnen har sit Tilhold paa høie Bjerge og i vilde, bjergfulde Stovegne i Europa, Asien og Nordamerika. I Schweiz og Tyrol er den derfor almindelig og findes ogsaa i de fleste nordligere og mere bjergige Egne af Norge. I Bergens Stift, Thelemarken, Gudbrandsdalen er den temmelig almindelig og forekommer Høst og Vinter ogsaa paa Sletlandet. Den er en overordentlig modig, glubsk og grim Røvfugl. Dens Stilling er rank og majestætisk; dens raske Bevægelse røber en overordentlig Muskelkraft. Med stærke og firkle Slag og en vis Majestæt bevæger den Vingerne, og flyver saa høit, at den, uagtet sin betydelige Størrelse, aldeles forsvinder for det menneskelige Øie. Men dens Syn er saa skarpt, at den selv fra denne Høide opdager Hare og mindre Dyr paa Jorden og slaar med Lynets Hurtighed ned paa sit Rov. Derfor kaldtes den ogsaa af de Gamle Himmels Fugl og Jupiters Budbærer og afbildes af dem, førende Gudens Tordenkiler i sine Kløer. Ligesom man blandt Pattedyrene har givet Løven Røngenaavn, saaledes har man formodet dens majestætiske Ydre, høie Flugt og overordentlige Styrke kaldet Ørnen Fuglenes Rønge. Buffon bemærker, at Ørnen har mange Egenheder fælles med Løven. „Som den, er den høimodig, fordi den sjelden straffer Kragerne og Stærernes nærvise Forfølgelser; som den er den maadeholden; thi den levner fordetmeste noget af sit Rov til mindre Røvdyr og Fugle. Løven elsker Censomhed. Sjelden finder man tvende Ørnepar i Nærheden af hinanden. De holde sig steds i tilbørlig Afstand for at de steds kunne have tilstrækkelig Næring. Sine Nigers Fortrin og Størrelse vurderer de kun efter den Bildtmængde, de indeholde.“ Den skal opnaae en Alder af over hundrede Aar.

Ørnen fælder fornemmelig varmbloDIGE Dyr, som Hare, Ræve, Lam, unge GjeDer, Hjorte, Kener, Raadyr, Kalve og større Fugle, som Gjæs, Traner, Tiurer, Røvfugl osv. Med et Rov af nogen betydelig Tyngde er den ikke istand til at hæve sig fra Marken, ei fordi den

mangler Styrke til at føre det gjennem Luften, men fordi Venene ere for korte og Bingerne for lange. Naar Aløerne ere fasthugne i et Kov, kan den derfor ikke give Venene den Spændkraft, som udtræves for at hæve det saa høit fra Marken, at Bingerne noksom kunne udvickles eller faae tilstrækkelig Luft under sig. Den fortærer derfor paa Stedet saa meget, den formaaer, af de større Dyr, som den fælder, og afhugger derpaa store Stykker, hvilke den fører til sit Rede. Fordetmeste jage Han og Hun sammen, undtagen naar Hunnen ruger; thi da jager Hannen alene og bringer Føde til sin Mage. Drnen oplaster, som de fleste Rovfugle, hver Morgen Hjørhøller, hvorved Kroen renses og Appetiten skjærpes. Sin Dørst lædsker den fordetmeste i Blodet af de fældede Dyr. Naar den ei kan faae levende Dyr, gaaer den paa friskt Nadsel, hvilket især om Vinteren er Tilfældet, hvor der er udlagt Heste. Man skyder derfor ogsaa let Drn paa Nadsel om Vinteren, naar man indretter en passende Skydehytte i Nærheden. Den skal ogsaa uden Vanskelighed fanges i Slagjærn, som udlægges ved Aaten.

Hvilken betydelig Skade Drnen anretter, indsees let af hvad der ovenfor er anført om dens Levemaade og Fødemidler. Men man paastaar ogsaa, at den, i de Egne, hvor den har havt sin Rede, har bortført smaa Børn. Pontoppidan omtaler i sin Norske Naturhistorie (2den Deel Side 169) en saadan Hændelse, der skal have tildraget sig Aar 1737 i Norderhøngs Præstegjæld paa Ringerige. En toaars gammel Dreng laa nøgen og legede ude paa Marken, hvor Forældrene arbejdede i Nærheden. Pludselig slog en Drn ned fra Luften, hug Aløerne i Drengen og førte ham bort i Forældrenes Paasyn, der ei hurtigt nok kunde komme til, for at frelse Barnet. Professor Nilsen gjør imidlertid den Bemærkning herved, „at han tvivler om Muligheden af at nogen skandinaviske Drn kunde være istand til at flyve bort med et nyfødt Barn, end sige et toaarigt.“ Et lykkeligere Udfald fortælles et saadant Ran at have faaet paa en af de østafte Der: en Moder, der var beskæftiget med at

sanke Brænde, havde imidlertid lagt sit Svøbebarn fra sig paa Marken. En Drn slog ned, hug Kloerne i Svøbet og bortførte Barnet gjennem Lusten. Ved Moderens Skrig kom fire Karle til, som strax roede derhen, hvor de vidste Drnen havde sit Nede, og bragte Barnet uskadt tilbage. I nogle Egne vide Fattigfolk at trække Fordeel af Drnereder, der ere i deres Naboskab, idet de, naar Drnene ere ude at jage, borttage det første Bildt, der er hjembragt til Ungerne; naar disse ere blevne flyvesærdige fastbinde de dem til Nedet, for at faae Drnene til faameget længere at statte til dem. Paa en Klippe eller i et meget høit Træ bygger Drnen ei blot for et Aar, men for hele Livet, sit Nede. Det holder mellem to å tre Alen i Gjennemsnit og er sammenslettet af Rjæpper og tørt Mås, bedækkede med Lyng og Græstov. I Midten af Marts lægger Hunnen to, sjælden tre, smudsigbrude Æg med rødbrune Pletter. Efter en Maaned udflækkes Ungerne, der, naar de kunne flyve, uddrives for selv at jage, og saasnart de selv kunne føde sig, faae de ei Lov at opholde sig inden Forældrenes Jagtdistrikt. At tage Drneunger ud af Nedet, inden de Gamle ere dræbte, er meget farligt.

Søornen.

(Falco (Haliaëtus) albicilla).

Af Søorne (Haliaëtus) have vi her i Landet tvende, Søornen og den store Havørn (Falco ossifragus), hvilken sidste dog af mange Naturkyndige ikkun ansees for en Afart af den første. Foruden at Tærserne, som vi have anført, hos Søornene, blot ere fjærklædte til Midten, udmærke disse Fugle sig desforuden derved at Laarsjærene ere meget lange.

Søornene leve saavel af Fiske, som af Pattedyr og Fugle. Den opnaar hos os en Længde af noget over tre Fod og en Vingebredde af mellem syv og otte. Den gamle Fugl er graabruun; Hovedet og Halsen blegere

graae eller hvidagtige, Næbbet og Fødderne citrongulc, Halsen reent hvid, ei længre end Bingerne. Ungerne ere rustgraae med sorte Pletter; Hals og Hoved sortagtige, Halesjærene sorte i Spidsen og den ydre Kane, hvid i den indre; Næbbet sort.

Denne Fugl synes at være udbredt over hele Verden og opholder sig fornemmelig i Bjergene og Skove i Nærheden af Havet eller store Floder og Indsøer, men dog ogsaa ofte flere Mile inde i Landet, endskjønt de fra Havet hente sin vigtigste Næring. H. Rasch fortæller saaledes, at Præsten Mynster i Sætersdalen i en Ørnerede, der laae mellem otte og ni Mile fra Havet, fandt en frist Makrel. Den er hverken saa modig eller livlig som Landørnen. Den jager blot i nogle Timer af Dagen; den øvrige Tid sidder den sædvanlig stille og hviler sig i Toppen af et høit Træ eller paa en Steen eller Klipppe, hvorfra den har en vid Udsigt. Den angriber og fortærer især større Fiske og Søfugle. Af Vattedyr blive oftest Lam, Kid, Harer og Smaagrise dens Rov. Den angriber ogsaa unge Sølhunde, der svømme i Vandstørpen; ja undertiden slaaer den ogsaa sine Kløer i de gamle, men maa for denne sin Forbovenhed bøde med Livet; thi naar Sølen mærker, at den er angreben, sætter den ned paa Dybet, og Ørnen, som ikke hurtigt nok kan slippe Taget, maa mod sin Villie følge med. Dens Lugt maa være meget fin; thi i utrolig Afstand opveirer den Nabsler, hvormed den, naar den mangler anden Føde, tager til Takke, selv om de ere gaaede over i Forraadnelse. I Fangenskab bliver den meget tam, og man siger, at den da aldrig skal angribe det tamme Fjærkræ, selv om den gaaer løs blandt dem paa Gaarden, men tværtimod ved sin Nærværelse beskytte dem mod mindre Rovfugle. Ogsaa denne Ørn skal undertiden have rovet og bortført Børn til sine Unger.

I Begyndelsen af April lægger Søørnen to, undertiden tre hvide Æg, hvoraf dog sjelden flere end to, undertiden blot een Unge udklækkes. De Gamle bære flittigt Rov til sine Unger, for, som det synes, i Tide at

lære dem at myrde. Søørnen flydes som den foregaaende paa Nadsel, og fanger sig undertiden i Rævesaxen, naar den vil tage Loffebiden.

Fiskeørnen.

(Falco (Pandion) Haliaëtus).



Fiskeørnen, eller som den kaldes af den norske Almue, Fiskejohn, findes næsten overalt i Verden ved Kyster og Søer. Dens Røb ligner Søørnens. Aløerne ere halvcirkelformigt bøiede, næsten lige store, trinde iftedetfor at de hos de øvrige Røvfugle paa Undersiden fordetmeste have en Rende. Ibortaaen er en Bendetaa og mangler Pinde ved Roden. Den anden og tredie Vingefjær er længst. Halsen er kortere end de sammenlagte Vinger. Fiskeørnen er omtrent en Trebiedeel mindre end den foregaaende. Hovedet er oventil mørkebrunt med gulagtig hvide Fjærkanter. Fra Røbbet gennem Dinene løber der paa begge Sider af Halsen brede mørkebrune Bånd, der hos de unge Fugle ere sorte. Alle øvre

Dele af Legemet ere brune, med Undtagelse af Halsen og Halsryggen, der ere hvidgule med langsgaaende brune Streger. Alle undre Dele hvide; paa Overdelen af Brystet og Kroen rustgule Pletter. Halefjærene ere hvidagtige i Spidsen. Næbhuden og Fødderne ere blaae. Af denne Slægt (Pandion) kender man kun denne ene Art.

Den forekommer næsten i alle Egne af Norge, fornemmelig ved større Floder og Indsøer og den lever næsten udelukkende af Færkvandsfiske, som den opdager i Vandstørpen og angriber med Kløerne. Hvis min unge Læser ofte har faret over nogle af vore færste Bænde, har Du sikkert ogsaa seet, hvorledes Fiskejohr svævende spejder efter Bytte høit over Vandet, og hvorledes den, naar den med sit skarpe Syn har opdaget noget Rov, en Stund staaer slagrende over det og sigter med opadrettede Binger og nedstrakte Been, indtil den pludselig styrter ned i Vandet, der skummende sprøjter op og for nogle Diebliske bringer Dig til at troe, at Røveren er forbanden, indtil den ved nogle kraftige Bingeslag ryfter Vandet af, og hæver sig med sit Bytte, som fortæres i et eller andet Træ. Ofte floder den imidlertid feil og undertiden hænder det, at den hugger Kløerne i Gjedder, Ørreder og Karper, der ere den for tunge, og som da trække den med sig under Vandet. Man har nogle Gange fundet dens Kløer siddende i store Fiske. Hos os er Fiskeørnen en Træffugl, som forlader vore Ryster ved de Læder, da Floder og Indsøer fryse til, og kommer igjen om Vaaren ved Isløsningen. Sit Nede bygger den i høie Træer i Skovene og ved Midten af Juni finder man deri to til tre, sjelden fire, gunlagtig hvide, rødbrunt marmorerede Æg.

Af Gletterne (Milvus) have vi her i Landet kun een Art (Falco (M) Milvus), der hos os er meget sjelden.

Ormehøgen.

(Falco (B) Buteo).



Ormehøgene (Buteo) udmærke sig ved et stort Hoved, et svagt, lige fra Roden krummet Næb med en ubetydelig Sidetand, middelsmaadige Tarser, der hos Nogle ere stærklædte lige til Tærne, som ere korte og plumpe, De have meget bløde Fjære paa Legemet og kortevinger.

Ormehøgen findes meget almindeligt i hele Europa, det nordlige Asien og Amerika. I det sydlige Norge, hvor den paa nogle Steder kaldes Glente, Vaspig, er den blandt de almindeligste Rovfugle. Den varierer saa utroeligt i Farve, at man sjelden finder to, der ere hinanden fuldkommen lige. Længden er henved halvanden Fod, Vingebredden fire. Almindelig er den øventil mørkbrun; under snart mørkbrun, snart smudsig hvid med mange mørkebrune Pletter. Halen er ubetydelig længre end Vingerne, mørkbrun med ti til tolv Dværstreg; kun den øvre Deel af Tærserne ere stærklædte; Næbbet sort, Børhuden og Benene gule. Denne træge og døgne Fugl holder sig om Sommeren i Skove, der grændse til Enge og Marker. Dens Flugt er langsom og dørs, dog flyver den undertiden om Foraaret høit og svinger sig i vide Kredse om i Lufte. Ormhøgen er en Træfugl, der kommer hid om Vaaren og forlader os om

Høsten i spredte Skarer paa tyve til hundrede Stykker. Den har en klagenende Stemme (Gaah!). Ofte sidder den hele Timer sammenkroben paa et Træ eller Steen og lurar paa Amfibier, Snegle, Græshopper, Regnorme, dog fortærer den ogsaa Jordrotter, Markmuus, Hare- og Fugleunger. Den gaaer ogsaa paa Nadsel.

Paa et høit Træ bygger den sig et daarligt Nede, som den udsodrer med Uld. Den lægger fire grønagtigt hvide Æg med leverbune Pletter.

„Den Skade, den gjør paa Vildtet, opveies fuldkommen ved den Nytte, den yder ved at fortære flere for Menneffene skadelige Dyr.“

Foruden de anførte høgeartede Rovfugle findes i Norge: Gransfalken, *Falco Lagopus*, Høypsefalken, *F. apivorus*, der er temmelig sjelden, Sumpøglen, *F. rufus*, Sumpøglen med Halskrave, *F. cyaneus*.

Ugleartede Rovfugle.

(*Accipitres strigini*).

Uglerne have et stort rundt Hoved, store runde, fortil rettede Øine, der ere forsynede med Blinkhinde og omgivne af en vid Kreds af stive lange Hjære (Sløret), af hvilke de forreste bedække den, undertiden utydelige Børhud, ved hvis forreste Kant Næseborene ligge, de bagre bedække Dreaabningen. Næbbet er kroget lige fra Roden og for største Delen skjult mellem de fremliggende børstagtige Hjære. Tarserne ere altid og Tærerne for det meste beklædte med bløde Hjære. Tærerne ere adskilte lige til Roden; en rettet bagtil, tre fortil, af hvilke dog Ibertaaen er en Bendetaa. Deres Næve er mere muskuløs end Falkenes. Som disse opkafe de nedslugte Haar og Hjære i Form af Voller. En stor Deel af

Uglerne er bestemte til at færdes og søge sit Rov i Dæmringen og om Natten. Syns- og Hørelsesorganerne ere derfor, fornemmelig hos disse, fortrinligt udviklede. Næbne ere store og fremstaaende for at opsamle de svage Lysstraaler. Dreaabningerne, der kunne aabnes og lukkes ved en Klap, ere meget store samt omgivne af stive Fjære, der endnu mere udvide Aabningen og forstærke Hørelsen, saa at de fornemme den svageste Lyd i den stille Nat, og derved lede sig frem til Rovet. For at kunne bemægtige sig dette, fik de til Røvsangst udviklede Kloer og Næb, for lettere at overumple det, en myg og silkeblød Fjærklædning. Deres Flugt er saaledes let og stille men ikke meget udholdende. Blændede af Sollyset skjule de fleste sig om Dagen paa mørke og affides Steder; men antage, naar de paa denne Tid angribes eller blive forstrækkede, en fast og lige Stilling og gjøre derfor de forunderligste og latterligste Grimasser og Gestikulationer. Alle Smaaafugle have en naturlig Antipathi imod Uglerne; naar de komme frem om Dagen, forfølges de derfor med Skrig og Larm af Kræger, Skader, Spurve og allehaande Smaaafugle, hvorfor man ogsaa betjener sig af Ugler til Løkkefugle forat fange eller skyde hine. Uglerne gribe oftest sit Rov, der fordetmeste bestaaer af mindre Pattedyr, paa Marken; dog gribe ogsaa endeel Fuglen i Flugten eller i Trætronerne. De hæfte i Bjergkloster, hule Træer, paa Grenene og Marken og leve i Monogami. Hunnen ruger Eggene. Ungerne, der ere duunklædte og graae, antage fordetmeste allerede den første Høst de Gamles Dragt. Uglernes fæle og vilde Skrig har givet Anledning til mange overtroiske Fortællinger, naar det er bleven hørt i den mørke Nat, uden at man har seet Fuglen. Uglerne har man indbeelt i Dagugler og Natugler.

Sneuglen.

(Strix nyctea).

Daguglerne (Surnia) have en oval Dreaabning, der er af middelmaadig Størrelse og uden Klap. Dien-

kredsen er mindre og afbrudt ovenil. Legemets Form er mindre og undersættigt; Hovedet mindre; Fjærklædningen stivere. De jage om Dagen uden mærkeligt at generes af dens Lys, og deres Flugt er hurtigere og rasere end de øvriges.

Sneuglen, der paa Norst og saa kaldes Dvitorn, Læmensgris, er to Fod lang og har en Vingebredde af fem Fod. Hele Fjærklædningen er snehvid, mere eller mindre tegnet med brune eller sortgraae Pletter og Tværfreger; Ansigt og Fodder ere uplettede. Benene og Tærne ere bedækkede med yppige haaragtige Fjære, som skjule de sorte Kløer saa at kun Spidserne synes. Den øvrige Fjærklædning stivere. Halen afrundet, længre end Vingerne, Næbbet sort.

Europas, Asiens og Amerikas Polaregne er Sneuglens Hjem. I Norges nordlige og indre Egne forekommer den om Sommeren parvis hist og her paa Fjeldhederne, hvor den fordetmeste sidder paa Stene og Bjergknabber. Den er da overmaade sky og flyver høit og med raske Vingeflag, omtrent som en af de store Høge og hviler alt imellem paa høie Stene. Under sin Flugt lader den undertiden høre et gennemtrængende Skrig: Kræ-u, Kræ-u.

Mod Vinteren gjør den Udvandring fra Fjeldene, og den viser sig da undertiden i sydligere Egne. I Vinteren 1831—32 kom flere saavel til det sydlige Norge og Sverig som til det nordlige Tydskland.

Paa Fjeldene skal den fornemmelig leve af Ryper, Harer og Læmen. Sneuglen skal ofte anfille sin Jagt i Tusmørket, men jager undertiden ogsaa om Dagen. Den skal lægge sine Æg i Klipper og Bjergkløfter.

Bjerguglen.

(Strix Bubo).

Hos Almuen her i Landet heder den ogsaa Subro, Roper. Bjerguglen er omtrent to og en halv Fod lang, Vingebreden er fem og en halv Fod; har lange sorte

Hjærbusse paa Panden. Øventil er den fortspraglet med rustgult og graat, under rustgult med sorte langsgaaende Pletter og tværgaaende Bølgelinier. Fødderne ere lodne ligened til Aløerne, der ere store og skarpe.



Bjerguglen.

Bjerguglen forekommer temmelig almindelig næsten over hele Verden ligesaa Polarlandene til det gode Haabs Fjorbjerg. I Norge forekommer den næsten overalt. Den holder fornemmelig til i bjergige og klippefulde, saavel nøgne som skovbevorte Egne. Den besværes ikke meget af Dagslyset; man seer den ofte jage for Skumringen og naar den sidder om Dagen og bliver vaer noget Menneſke, flyver den op paa betydelig Afstand og støder ikke an selv i den tætteste Skov. Ligesom de fleste Nørfugle er den kun lidet selftabelig, og et Par taa-ler almindelig ikke, at et andet opholder sig i dets Jagtdistrikt, der dog er temmelig vidtløftigt. For Bildet er

den en af de fladeligste Rovfugle. I Tydskland betales der Præmier af en Gylden for dens Fangst, et folgebærdigt Exempel, som man imidlertid neppe kan haabe efterlygnet her i Landet, hvor Menneffene, istedetfor at frede det nyttige Bildt ved at ødelægge Rovfuglene, tage Parti med dem og gjøre sig al mulig Umage for at udrydde Bildtet. Alle Fugle, især de af Krageslægten, vise Bjerguglen deres Had og Afsty. Saa snart en Krage, Skjære eller dsl. faaer Die paa en Bjergugle, begynder den strax at straae og larme af alle Kræfter. Alle øvrige Krager, Kaiser, Kørpe o. s. v., som befinde sig i Nærheden, komme strax til og trænge sig frem saalangt de vove for at haane den forhadte Røver. Seer man derfor en Mængde Krager flyve i en Kreds i Luften med Strig og Varm over en bestemt Plet og derpaa slaae ned og atter hurtig flyve op, saa kan man være temmelig vis paa, at det er en Bjergugle tæt ved, og man bør da ile med at faae den fældet. Dens Føde bestaaer fornemmelig i Særer, Muldvarpe, Rotter og Muus; dog med de sidste tager den kun tiltakke i Nødsfald, naar større Bildt mangler. Derimod gjør den mere af Storfugl, som Tiur, Arthane, Hjarpe, Wender o. s. v., ligesom Kalve af Hjorte og Hensdyr ofte blive dens Bytte, ja Røven selv er ikke sikker for den, og det hændte mere end een gang, at Mikkil, naar den var ude for at stjæle sig en Læfferbidsten, selv maatte tjene til Aftensmad for Bjerguglen. Man har endog seet den om Vinteren seile ud paa Isstykker efter Særer, der ogsaa streife om paa denne Aarstid. Ett Nede bygger den i Bjergkloster, hvor Eggene, 2 — 3 (meget sjelden 4) i Antal, næsten runde og hvide af Farve, udbruges i 3 Uger. Ungerne blive længe i Nedet og ere meget glubste, hvorfor de Gamle netop paa denne Tid gjøre allermeest Skade paa Bildtet. Man kan fange Bjerguglen med Sæ eller Slagjern, som, skjult under Mos og Græs, opstilles i Nærheden af Nedet; til Ate bruges Kjød, helst af saadanne Dyr, som den selv har fanget og bragt til Nedet.

Bjerguglen har en gyfelig Stemme; dens Hyl om Ratten høres vidt og bredt omkring og har paa Afstand Lighed med et Menneskes Rødraab, som er fædt i Livsfare, eller et Barns Skrig. Den har derfor givet Anledning til mange Spøgelsehistorier og uidentivl er det dens Skrig, som i Tydskland har foranlediget Sagnet om den vilde Jæger, som ved Midnattstider skal fare gennem Luften. Ogsaa hos os findes lignende Fortællinger og Almuen omtaler endog Hestenes store gloende Dine, der hvis det ikke er et fuldkomment Hjerneskind, noksom karakteriserer Hubroen. Paa det nordlige Norges Der og Kystbygder omtales en "Gast" eller et Spøgelse, som man kalder Røperen, der undertiden om Ratten lader sig høre fra de klippefulde Der, i det den angsteligt raaber til de Forbiseilende: "Baat - Baat." Dette formeente Spøgelse, som Jisserne holde for en druknet Kammerat, er ingen anden end — Bjerguglen.

Søguglen, *Strix funerea*, og Spurveuglen, *Str. passerina*, høre ogsaa til de norske Dagugler.

Natuglen.

(*Strix Aluco*).

Natuglernes (*Ulula*) Dreaabning er stor, halvmaaneformig, forsynet med en Klap. Niekredsen er stor og heel. Af Legemsbygning ere de undersættige; Hovedet er meget stort, Hjarbedækningen blød. De herhen hørende Ugler blændes af Dagslyset, hvorfor de om Dagen skjule sig paa mørke Steder.

Natuglen mangler Hjarbustene ved Ørerne. Den er fjorten til femten Tommer lang og har en Vingebredde af 2 Fod og 10 Tommer. Hjarflækningen er spraglet med Brunnt, Graat, Rustgult og Hvidt, med

langsgaaende mørkbrune, i Kanterne bølgeagtigt sprag-
lede Streger, samt en stor langsgaaende hvid Plet paa
Skulderen. Benene og Tærne ere til Yderenderne be-
klædte med smudsigthvide Duunskiære. Næbhuden er grøn-
agtig, Næbbet guulagtigt. Hunnen og Ungerne ere mere
rødbrunne end Hannen.



Natuglen.

Denne Ugle har hjemme i hele Europa og i Sibirien;
af vore er den den almindeligste. Om Sommeren op-
holder den sig fornemmelig i gamle Løvskov med gamle
hule Træer, hvori den skjuler sig om Dagen. Kun i
Dæmringen og Skumringen eller i snee- eller maanelyse
Nætter er den ude paa Jagt. Om Vinteren viser den
sig ofte i Haver og ved Huse, ja selv i de større Stæ-
der; i Udkanterne af Christiania har jeg flere Gange
hørt og seet den. I Lader og Køhuse træffes den ofte
om Vinteren, hvor den fortærer en Mængde Røtter og
Maus, der udgjøre dens fornemste Føde. Den æder og-
saa Muldvarpe, Hiirbeen og Skarnbasser. Herved bli-
ver denne Ugle, ligesom de fleste af dens Slægtninge,
mere nyttig end skadelig. Undertiden tager den vel en
og anden sovende Smaafugl eller en Due, men det ind-

træffer vist ikke ofte. Under Parringsstiden har Hannen en tudende Lyd, der næsten klinger som en hylende Lat-ter: Huh - huh - huh - huhuh. Hunnens Lyd er mere strigende.

Til Rede vælger Natuglen fordetmeste et forladt Navne- eller Krage-Rede, undertiden hule Træer, Bjerg-
buller o. s. v. Dens 3 — 4 hvide næsten runde Æg
finder man i Begyndelsen af April.

Norste ere desforuden følgende Natugler; Hornug-
len (Str. Otus), Kortøret Ugle (Str. Brachyotos), Lap-
uglen (Str. lapponica), der er meget sjelden, og Perle-
uglen (Str. Tengmalmi).

Anden Orden.

Spurvefugle (Passeres).

Benene ere fordetmeste stærklædte til Knæleden; **Tarsen** er trind; **Tæerne** oftest 3 fortil og 1 bagtil. Bagtaaen er fæstet paa Tarsen i samme Plan, som For-
tæerne; disse ere fløvede ligetil Roden, eller den ydre
er mere eller mindre sammenbygget med **Mellemtaaen**,
(hos Ratteravnene forenede med en Hinde ved Roden),
Kløerne ere almindelig sammentrykte, tandre, noget
retraktile.

Næbbet er kort eller middelmaadigt, fordetmeste
mere eller mindre tegelformigt. **Halen** bestaaer oftest
af 12 Fjære.

Hunnen er ialmindelighed mindre, og mindre smuk
end Hannen. De sælde Fjære om Høsten; men en stor

Deel fælde Hjærkanterne om Vaaren, hvorved Sommerdragten bliver forskjellig fra og ofte smukkere end Vinterdragten. De fleste holde til i Skove, Lunde, Bøtte og Træer, andre paa Marker og Sletter og atter andre paa Klipper og Stjær. De ere ikke saa heftige som Røvfuglene, og have ikke nogen saa bestemt Levemaade som Hønsfuglene eller Sumpfuglene. Insekter, Frugter, Korn udgjør de flestes Næring. Korn og Frø æde de desto mere udelukkende, jo tykkere Næbbet er, Insekter jo tyndere det er. Nogle dræbe og fortære ogsaa mindre Pattedyr, Fugle og Amfibier. Deres Mave er muskuløs. I denne Orden findes Sangfuglene, og hos dem den mest sammensatte Bygning af det nedre Luftrørhoved. Hos den vorne Fugl har Brystbenet almindeligviis kun et Udsnit paa hver Side af den undre Rand. Imidlertid findes der ogsaa hos Fiskfuglen, Viaderen og Blaaraaken to saadanne, medens de mangle aldeles hos Colibriterne og Tagvalen. De leve i Monogami. Begge Mager bygge Nedet, ruge Eggene og mæde Ungerne, og bære endogsaa Børne i Næbbet til dem en Tid efterat de have forladt Nedet. Eggene ere 5—6, undertiden flere eller færre. Nedet bygges af nogle med beundringsværdig Konstruktionsfærdighed. Her findes saavel de største Bygmestere som de bedste Sangere.

Den første og talrigste Orden indbefatter de Slægter, hvis Ydertaal er forbunden med Mellemtaalen ved et eller to Led. Den første Familie kaldes:

Tandnæbber (Dentirostres).

Hos disse har Næbbet et Udsnit ved Siden af Spidsen. Det største Antal insektædende Fugle findes i denne Familie. Alle æde imidlertid ogsaa Bær og andre Frugter.

Varfleren.

(*Lanius Excubitor*).



Næbbet er hos **Tornskaderne** (*Lanius*) kogleformigt eller sammentykt efter hele sin Længde; og bagefter den stærktbøiede Spidsen forsynet med en skarp Tand. Tornskaderne danne en talrig Slægt (omtrent 100 Arter), hvoraf der hos os kun findes to Arter. De udmærke sig ved Mod og Rovgjærrighed og ere i Leve-maaede sande Rovfugle. De ere hæffe og trættekære, angribe og dræbe mindre Fugle, og forsvare sig med Dristighed mod større. De gribe Rovet med Næbbet og spidde det paa Tørne. Mange, hvoriblandt den rødbrugede Tornskade (*Lanius Collurio*), som er temmelig almindelig ved Christiania, have den Egenhed, at de efterabe andre Fugles Stemmer. Varfleren bliver hos os om Vinteren, medens den anden drager til sybligere Egne.

Varfleren er af Størrelse som en Trost, 10 Tommer lang; oven til lys askeblaa; under hvid. Har et sort Baand gennem Vinene. Vingerne sorte med en dobbelt hvid Plet. Halen sort, hvid paa Siderne og i Spidsen; det mellemste Fjærpar for det meste aldeles sort.

Denne Fugl findes i hele Europa, Rusland og Nordamerika, ja endogfaa i Afrika. I Norge synes den fornemmelig at findes i de nordligere Egne, undtagen Høst og Vinter. Man seer den ikke sjelden sidde paa Toppen af et Træ og speide efter Rov, den udbreder da ofte Halen og slaaer den op og ned. Dens Flugt ligner Hakke-spetteens. Varsleren har et ubegrændset Mod; selv de største Rovfugle bortjager den fra sit Opholdsted. Naar den mærker en Høg eller Falk tilfjendegiver den det ved et eget skarpt Skrig og varsler derved Smaafuglene om at redde sig. Denne Egenkab har givet den Navn og gjort den stikket til at anvendes ved Falkfangst (se foran Side 11). Selv er den i Levemaade en Rovfugl og hvis dens Styrke og Raahed svarede til dens Mod og Dristighed, skulde den vist være en af de farligste for de mindre Fugle. Foruden større Insekter nærer den sig af Markmuus, Spurve, Finker o. s. v. Undertiden angriber den ogsaa større Fugle, men det lykkes den sjelden at bemægtige sig nogen. Sit Rede bygger Varsleren i Træer og Buske. Det er stort og bestaaer af Rins, Vinde, Straa og Mose, og indvendig fodret med Uld og Haar. Eggene, 6 — 7 ere grønagtigt hvide, mørkere med brune og graae Streger.

Sort og hvid Bluesnapper.

(*Muscicapa atricapilla*).

Bluesnapperne have et temmelig **kort, stærkt, trekantet Næb**, der ved Roden er nedtrykt og bredt. **Overnæbbet** er i Spidsen lidt nedbøiet og forsynet med et **Hak**. **Mundvigerne** ere kantede med stive Børster. De ere trættekjære og modige Fugle, der fange Insekter i Luften. De findes over hele Jorden, men de fleste i varmere Lande og mange af disse have smukke Farver.

Den sorte og hvide Bluesnapper har paa Vingen en større hvid Plet. Hannen er oventil sort med hvid



Kort og hvid Bluesnapper.

Vande; under er den hvid. Hunnen er oventil gråbrun. De to eller tre yderste Halefjære ere hvide i den yderste Fane. 5 Tommer lang. Denne Fugl er temmelig almindelig i Skove og Lunde baade i Sverige og Norge. Som Trækfugl kommer den, i Begyndelsen af Mai, til Omegnen af Christiania, hvor den er meget hyppig i Haverne. Almindelig opholder Bluesnapperen sig paa Træernes laveste Grene, hvorfra den flyver ud, naar den bliver vaer et forbisflyvende Insekt, og vender oftest tilbage til samme Green. Siddende paa Luur efter Insekter løfter den tidt og hastigt paa Vingerne ligesom for steds at være færdig til Insektjagt. Dens Sang bestaaer af nogle rene velsklingende Toner. Den lever kun af Insekter. I Redet, som den lægger i hule Træer eller mellem Trærødder, finder man i Juni 4—5 meget lyse blaae Egg.

Sidensvandsen.

(Bombycilla Garrulus).

Sidensvandsernes (Ampelis) Næb har megen Lighed med Bluesnapperens, men er forholdsmaæssig kortere, temmelig bredt og let

bøiet. De fælde een Gang om Naret. Slægten tæller omtrent 30 Arter, af hvilke kun een tilhører os.



Sidenfvandsen.

Sidenfvandsen er en af Europas smukkeste Fugle. Med Undtagelse af Bingerne og Halen, er hele Fjærklædningen slin, silkeblød og yppig. Hovedets Fjære ere lange og danne en Top af $1\frac{1}{2}$ Tommes Længde, som almindelig hænger ned over Næffen, men som ogsaa kan opreises. Dens øvre og nedre Legemsdele ere aftegraae med et Anstrøg af Rødbruunt, der er mørkest paa Ryggen. Bingerne ere sorte med hvide og gule Pletter; de 9 første Vingefjære ere i Spidsen kantede med Guult, de følgende syv have i Iderfanens Spidse en hvid Plet med en zinnoberrød Tilsætning. Halen er ved Roden aftegraa, mod Spidsen fort og ender med et bredt guult Baaud. Hos meget gamle Fugle have ogsaa Halefjærene lignende zinnoberrøde Tilsætninger, som Bingerne. Den er 8 Tommer lang. Dens Opholdssted er de arktiske Egne af Europa, hvorfra den mod Vinteren gjør Udflugter til de sydligere Egne af Scandinavien; til de sydligere Egne af Rusland, til Tydskland, England, Frankrig, Italien o. s. v. kommer den kun i visse Mellemrum og spaaer

da gjerne om Sne og Kulde. Ved Christiania synes den omtrent hvert andet Aar at vise sig talrig. Almindeligen viser den sig her i Slutningen af Oktober. Paa samme Tid indfinder den sig ogsaa i store Stæder ved Stockholm og Petersburg. Saavel om Høsten, som midt under Vinteren træffer man dem i uhyre Flokke paa de Steder, hvor der er Overskud af Rognebær, der er dens fornemste Føde, hvorfor den ofte fanges i Doner, der ere udsatte for Kramsfugl. Naar Rognebærrene findes i Mængde, er dens Reiser ei saa vidtloftige og den kommer da sjelden langt. Om Sommeren lever den ogsaa af Insekter, hvilke den fanger paa samme Maade som Bluesnapperen. Den er en af de største Storædere blandt Fugle, thi den skal daglig fortræde en Portion Føde, der veier ligesaameget som den selv. Sidenhvandfen er dum og træg i sine Bevægelser, dog er den om Vaaren, i Marts, temmelig fly og vanskelig at komme paa Skud. Mod Vinterens Slutning vende de tilbage til de nordlige Egnes Barstove, hvor Flokkene opløses og sprede sig parviis til Forplantningen. Fuglen hækter i Skandinavien i de tætte Barstove mellem den 60 og 70° nordlig Bredde. Ligesom sin amerikanske Frænde iagttager den en beundringsværdig Tavsbed, hvilket i Forening med de øde tætte Stove, hvor den vælger sit Opholdssted, har været Aarsag i at man kun tvende Gange vides at have fundet dens Rede med 2 Unger i en huul Kubbe. Man har antaget, at den klækker to Gange om Sommeren. Dens Kjød er meget velsmagende og sundt. Den fanges derfor i Doner og skydes om Vinteren i Mængde i Rognetræerne, og man kan uden Vanskelighed faae en 20 til 30 Stykker i Skuddet, naar man indretter sig Skydehytter af Bar ved saadanne Træer, afplukker de nederste Barklaser og skyder naar Fuglene styre mod Toppen af Kronen for at sætte sig. Naar Sværmen løfter sig igjen, er det ogsaa fordeelagtigt at skyde.

Tanagraerne.

(Tanagra).

Danne en Slægt af Spurvefugle fra det varme Amerika, der tæller omtrent 50 Arter. De have et næsten trekantet Ræb. De have nogen Lighed med vore Spurve og æde ligesaagjerne Korn som Insekter. De fleste udmærke sig ved levende Farver og have en behagelig Sang.

Duetrosten.

(Turdus viscivorus).

Robbet-Trosten



Trosterne (Turdus) udmærke sig ved et næsten ret udad sammentrykt Ræb, hvis Spidse er nedbøiet og paa hver Side forsynet med et Hul. Ræseborene ere halv tillukte med en nogen Hud. De danne en talrig Slægt (over 70 Arter), ere udbredte over hele Jorden og yndede for den

behagelige Sang og det velsmagende Kjød. Samtlige ere Fugle af middelmaadig Størrelse, og Duetrosten er den største i Europa. De opholde sig i Lunde og store Skove og bygge der spredt og parviis, med Undtagelse af en Art, Graastrosten, der bygger i Kolonier. Sine Neder bygge Trosterne med megen Omsorg; forbedmeste er det halvfugleformigt, konstig sammenslettet af Mos og Vinde, og desforuden sammenlignet med Jord, Leer og Gjødse og indeni saa glat som om det var dreiet. I Mai og Juni finder man i dette 4 til 6 Uge. Trosterne leve om Sommeren af Insekter, Dime og Larver, om Høsten og Vinteren af forskellige Slags Bær. Deres Kjød er velsmagende og sundt og man fanger dem derfor om Høst og Vinter med Rognbær i Doner eller Snarer^{*)}.

Duetrosten kaldes ogsaa Dobbeltrost, Blaatrost. Er tolv Tommer lang og veier omtrent 10 Pund. Dventil er den graabruun med et Anstrøg af Olivengrønt. Under er den hvid med fortagtige Pletter, som paa Halsen ere spidse, paa Brystet ovale. Denne Art skal findes næsten overalt i Europa. Hos os er den almindeligst i Landets mellemste og nordlige Dele, og holder gjerne til i Kanterne af store Skove. En Deel forlade os seenhøstes, men størstedelen bliver her selv i de strengeste Vintre i Selskab med Graastrosten. De øvrige komme tilbage i Marts og April. Den synes at være fredelig og melankolsk. For det sølende Menneske er dens Sang, som den tidligst af alle vore indenlandske Sangere, undertiden i Slutningen af Februar, lader høre fra en høi Gran eller Fyr, den mest indtagende af alle Fugles; den bestaaer af korte afbrudte Strofer i Mol, hvorved den let adskilles fra Maaltrostens, der er en klingende Durtone.

*) Om Kramsfuglesangsten see Skild. Mag. 4de Aargang af Beret.

Graatrusten.

(*Turdus pilaris*). *Birk=Trøsten*



Denne, som ogsaa kaldes Fjeldtrøst, er noget mindre end den foregaaende, med hvilken den ogsaa har nogen Lighed i Farven, kun er Hovedet og den øvre Deel af Halsen graa, Ryg og Skuldre kastaniebrune, med eller uden sorte Pletter. Den forekommer i hele Europa, ja endogsaa i Syrien, men hæfter alene i Norden, og det er kun som Trækfugl den besøger sydlige Lande, som Italien og Sardinien, hvor den tilbringer Vinteren i utrolig Mængde. I Ostpreussen anslaaer man den aarlige Fangst af Graatrust til en Million. Dette Tab mærkes imidlertid ikke synderligt i vore Skove; thi under Vinteren vrimle de ofte af Graatrust. De ere egentlige Strøgfugle, der Høst og Vinter i utallige Stæder stryge om i Landet fra Egn til Egn, og forekomme da fornemmelig der, hvor der er Rogn og Enebær, som i denne Tid udgjør deres fornemste Føde. Under Varrings-tiden leve de ofte Kolonivis i Gran- og Birkeskovene, hvor ofte flere hundrede Par have sine Nester i en liden Omkreds. Ofte hæfte fire til fem Par paa et Træ. Graatrusten er mindre sky end de foregaaende; men

naar Jægeren nærmer sig en Flok og først en stemmer i og tager til Vingerne, straalet de øvrige med og følge Exemplet. Denne Jugl slaaes og stændes stedse med sine Lige og de Kragesugle, der nærme sig dens Gebet.

Maaltrosten.

(*Turdus musicus*).

Dventil er denne olivenbrun, under rustgul; den forreste Deel af Halsen, Brystet, Siderne og Maven ere tegnede med ovale sortbrune Pletter. Dens Længde er 9 Tommer.

Maaltrosten er temmelig almindelig i de fleste af Europas skovrige Bjergegne, og Norges Furuskovs gjenlyde i de lyse Sommernætter af dens Sang. Nogle faa blive over hos os under milde Vintre; de fleste drage til sydlige Lande, men alt i Marts hører man baade Morgen og Kvæld igjen dens muntre Sang. I det høie Norden opliver den i de stille, men lyse Nætter, de tause øde Skove med sine herlige Toner, og det er denne Egenskab, hvorved den har tiltrukket sig Folkets Opmærksomhed, der har givet den de betegnende Navne Taltrost, Sangtrost, Maaltrost, Natvake, Nordens Nattergal. Blandt Juglene gives der neppe nogen større Graadsfer end denne og Sidenhvandsen; thi Vægten af af det, den fortærer om Dagen, skal, naar den efter Behag kan tilfredsstille sin Appetit, overgaae dens Legemes Tyngde. Maaltrosten finder meget Behag i at opholde sig ved Vandet, ikke saameget forat drikke eller bade sig, som for at bruge det til Speil. I halve Timer kan den staae og betragte "sit Jeg" i Vandet. Den antager forskellige Stillinger, ligesom for at undersøge i hvilken den tager sig bedst ud. Derhos hopper og springer den omkring og synes at more sig kosteligt ved dette Tidsfordriv.

Rodvingen.

(*Turdus iliacus*).

Er omtrent 8 Tommer lang. Øventil er den olivenbrun. Siderne og de undre Vingeffære ere rødbrune; over Vinene har den en bred hvidagtig Streg. Den forreste Deel af Halsen er tegnet med sortagtige, Bryftet og Siderne med graabrune aflange Pletter. Næbbet er sort eller mørkebrunt.

Den rødvingede Trost, som er den mindste af vore indenlandske, tilhører blot Europas nordligste Egne. Som de øvrige Troster hæfter den hos os, men forekommer blot Høst og Vaar og selv da mindre talrigt end de foregaaende i sydligere Egne af Landet. I Ost-Preussen fanges ogsaa denne Art under fine Reiser om Høsten i utrolig Mængde. I Levemaade og Udseende har den meget tilfælles med Sangtrosten. Efter Natskylde de sig om Vaaren sammen i store Flokke og opføre et Slags Koncert. „Enkelte høie og rene Fløitetoners udstødes af een eller to Forsangere raast efter hinanden, hvorpaa den hele Skare falder ind med en raast Kvinden.“

Ringtrosten.

(*Turdus torquatus*).

Dens Længde er omtrent 11 Tommer. Af Farve er den sortagtig, med en stor halvmåneformig hvid Plet, der hos Hunnen er rustgraa paa den øvre Deel af Bryftet. Næbbet er bleggult med sort Spids. — Ringtrosten skal findes paa Alperne, men dens egentlige Hjem er den subalpinke Region paa Bjældene i det høiere Norden. Den besøger saaledes kun Vaar og Vinter sydligere Dele af Landet, som Christianiaegnen, naar den færdes til og fra varmere Lande. Den er overordentlig fly og har i Væsen og Levemaade nogen Lighed med



Ringtrosten.

Svarttrosten. Ringtrostens Sang er faatonig og melan-
kolsk og ligner næsten Skriget af en Kylling, der er kom-
men fra Hønen.

Svarttrosten.

(Turdus Merula).



Svarttrosten eller Solsorten er fulsort med guult
Ræb og gule Been. Hunnen er fortrubruun. Længden
er noget over ti Tommer. Denne Fugl findes i hele
Europa og hos os mest i de sydlige Egne af Landet.
Paa de Steder, hvor den opholder sig, er dens Tilhold

tætte Buske i Skovkanten i Nærheden af Bække og skælvede Enge. Som de øvrige Troster er den meget sky og færdes tyft og stille mellem de tætteste Grene. Om Vinteren er den dristigere. Dens Sang er forskjellig, undertiden slæbende og melankolsk, undertiden munter og meget fortræffelig. Den holdes i Buur og kan lære at sløite forskjellige Melodier. Den er meget lærvillig og skal kunne lære at udføre enkelte Ord.

Spottetrosten.

(*Turdus polyglottus*).



Er af Størrelse som Solsorten, men slankere; askegraa; under Bugen lysere med en hvid Strihe paa Vingerne. Denne findes næsten i hele Nordamerika og paa nogle af de vestindiske Øer, samt er overalt bekendt for sin Sang, hvori den bringer megen Afverling ved at efterligne andre Fugles Melodier og gjengive dem skjønnere, end disse selv synge dem. Den er meget almindelig i fugtige Skove og hæfter paa Træer, selv i Nærheden af Plantagerne, men er meget sky og forlader sit Rede, naar man nærmer sig det. I sit Hjem holdes den for Verdens bedste Sanger, og sættes endogsaa over

Nattergalen. Ligesom denne og Maaltrosten synger den om Natten, stidende paa den høieste Top af et Træ eller en Skorsteenspipe, fra Marts til August. Den begynder med fine egne Kompositioner, efterligner siden mange andre Dyr's og Fugles Toner og repeterer og varierer til Slutning disse Toner saa kunstigt og behageligt, at det vækker ligesaamegen Fornøielse som Beundring. Desuden spiller den paa en Maade Komedie. "Ligesom fortryllet af sin Sang, hæver den sig med udbredte Vinger op over det Sted, hvor den sad, falder paa Hovedet ned igjen paa det samme Sted, dreier sig om med udbredte Vinger og ledfører sine Melodier med de besynderligste Bevægelser." Den efterligner ogsaa andre Lyd: en, som man holdt i Buur, miaavede som en Kat, snaddrede som en Skade og knirkede som en Beirrhane. Spottetrosten lever af Bær og Insekter. Dens Kjød er velsmagende.

Fossekallen.

(*Cinclus aquaticus*).

Denne Slægt har kun 2 til 3 bekjendte Arter, der have et tyndt, ret, stærkt sammentrykt Næb, og udmærker sig ved en tæt fast Hjærtslødning.

Fossekallen eller som den ogsaa kaldes Båndstærren er fortagtig, foran paa Halsen og Brystet hvid. Længden er omtrent $7\frac{1}{2}$ Tomme. Den findes i hele Europa og Rusland i Bjergegne ved stærktstrømmende og fوسفende Bække og Aaer. Om Sommeren opholder den sig paa Fjeldene i det høiere Norden, hvor man næsten bestandig seer den paa Stene og Klipper i Bække og Fosse, hvis Bulder og Stum den synes at ynde. Ved Vinterens Begyndelse drage de til sydligere Egne, hvor de opholde sig ved Fosse og Kværndamme, eller andre Steder, hvor Vandet ikke fryser til. De ere der i bestandig Bevægelse, løbe og jage hverandre paa Isen, flaaes,


kvibbre og synge. Fra Siden af det aabne Vand dykke de ned, løbe paa Bunden mod Strømmen og komme efter en Stund op igjen med en eller anden Krustacee Vandinsekt i Næbbet, uden at det synes paa deres Fjære, at de have været i Vandet. Undertiden svinge de sig høit op i Luften, styrte sig atter ned i Vandet, dykke og komme op igjen paa et andet Sted; undertiden styrte de sig midt ud i de mest flummende Fosse og komme op igjen. De leve af Vandinsekter, Krustaceer og Fiskerogn. Den har en temmelig behagelig Stemme, som man hør os ofte faaer høre midt om Vinteren. Mod Slutningen af Vinteren drage de igjen mod Norden. Fossefalken hæfter i Kløster, Brokister og under Sangbrug og Møller. Redet er fegleformigt og meget kunstigt sammensat, med en rund Nabning paa den ene Side. I Marts eller April lægger Hunnen 4—6 hvide Æg. Fossefalken forener altsaa Sangfuglenes Bygning med Vandsuglenes Levemaade og adskillige af deres Egenheder.

(Rosendrosselen.)

(*Gracula rosea*).

Drosselslægten har et langagtigt, fegleformigt, sammentrykt spidst Næb, hvis Ryg skyder ind i Panden; Gabet er bredt og kløvet til lige under Pinene. I Levemaade ligne de Stærrene; de streife om i store Skarer, følge Kreaturene paa Græsgangene og fortære Insekter, sætte sig ofte paa Kreaturenes Ryg og plukke Utsi. I Sydlandene gjøre de megen Rytte ved at fortære de ødelæggende Græshoppeværme. De hæfte i Mur- og Klipperevner og lægge 5 — 6 Æg.

Rosendrosselen er rosenrød; Hoved, Vinger og Hale sorte med blaa-violet og Purpurglands. Raffen er forsynet med en Duff lange, spidse, nedhængende Fjære. Dens egentlige Fædreland er det sydlige Afiens Orkener, hvorfra den aarlig gjør regelmæssige Strejftog til



Mosendrosselen.

det sydlige Europas Lande. Meget sjelden viser en enkelt sig i Tydskland, Frankrig og England og endnu sjeldnere i Sverige. Hos os er den hidtil ikke seet.

(Guldtrosten.)

(Oriolus Galbula).



Næbbet ligner hos Pirolslægten (Oriolus) Trosternes, kun er det noget tykkere. Han og Hun ere for-

fiellige i Udseende. Alle Arter af denne Slægt tilhøre den gamle Verden. De opholde sig i Skove og Buskadsfer, om Sommeren parviis, om Høsten i Flokke. De ere overordentlig skye og de, der beboe nordligere eller tempererede Egne, drage mod Vinteren til varmere Himmelegne. Nedet bygges med megen Konst.

Guldtrosten, Kirsebærfluglen eller Pirolen er omtrent saa stor som Sorttrosten, men slankere. Den er skinnende gul; Bingerne, den midterste Deel af Halsen og en Streg gjennem Vinene sorte. Hunnen er ovenil gulgrøn, under hvidagtig med sorte Smaapletter. Den findes paa mange Steder i Europa. I Norge har man endnu ikke, saavidt der vides, fundet den. I det sydligere Sverige er den sjelden, i det nordligere og i Finland skal den være almindeligere. Den er overalt en Træfugl og skal overvintre i Afrika. Guldtrosten er livlig og sky, opholder sig stedse i de bladrigste Trætroner og flyver fra den ene Egn af Skoven til den anden. Dens Sang ligner Trostens, men er ei saa melodisk. Om Baaren og Sommeren lever den af Insekter, om Høsten af Bær og gjør i den Tid stor Skade ved at opæde en uhyre Mængde Kirsebær. Den bygger et meget konflikt Nede, der er sammenslettet af fine Græsstraa, Rødder, Mos, Uld m. m. I Form ligner det en Pung eller dyb Kuro, og er befæstet i en Kløft af en Green paa et Træ eller en Bust, og fastbundet med Bast eller Græs. Udvendig er det bedækket med lav og tynd Næver og seer hvidagtigt ud. I Nedet findes 4 — 5 hvidagtige Æg, der ved den tykkere Ende ere bestrøede med sorte brune Pletter og Punkter.

Steendulpen.

(*Saxicola Oenante*).

Næbbet er hos denne Slægt (*Saxicola*) noget nedtrykt og temmelig bredt ved Basis. De ere temmelig

høibenede og livlige Fugle, der alene leve af Insekter og lægge sit Nede paa Marken eller i Huller mellem Stene.

Steendulpen, Steensmækken eller Steenskvætten er paa Ryggen graa; Dvergumpen og en Streg over Dinene hvide. Gjennem Dinene gaaer et sortagtigt Baand; Halsen er hvid med sort Spids. Steendulpen er en af de almindeligste Fugle i Skandinavien og forekommer saavel i de sydligste som de nordligste Egne, saavel i de lavere som i de høiere Regioner, ja selv i Nærheden af den evige Sne, og paa Island og Grønland. Steendulpen er en munter og urolig Fugl, som meget hurtigt løber om for at fange Insekter. Naar man nærmer sig dens Nede, viser den sig meget urolig, flyver fra en Steen til en anden, bukker sig, udbreder Halsen og skriger hit - aftak tak, hit. Som Træffugl kommer den almindelig til Christiania mellem den 15de og 25de April. I September drager den igjen bort.

(Bustskvætten.)

(*Saxicola rubetra*).

Denne, der er den anden Art af denne Slægt, som findes i Skandinavien, er ligeledes en munter og urolig Fugl, som almindelig opholder sig i Træer og Bustadser. Dventil er den sort med rustgraae Hjærkanter; et Baand over Diet og en Plet paa Bingen, samt under Hagen og Siderne af Struben, hvide; Halsen er foran rustgul. Dens Sang, som man almindelig hører tidligt om Morgenen eller seent om Aftenen, samt efter mild Regn, er ikke ubehagelig.

Mattergalen.

(*Sylvia Luscinia*).

Sangerne eller Sylvierne (*Sylvia*) have et tyndt, spylformigt tilspidset Næb, hvis Overdeel sædvanlig er lidt nedbøiet i Spidsen og indskaaret bag samme. Af

denne Slægt findes der hos os ikke mindre end ni Arter, alle ere smaa med mere eller mindre langstrakt Krop. De opholde sig fordetmeste i Skove og Lunde paa løvrige Træer og Buske og komme sjelden paa Jorden; nogle beboe Siv og Rør ved Aaer og Indsøer. De ere alle livlige og muntre Fugle og en stor Deel af dem udmærke sig ved en skøn og melodisk Stemme. Naar de ei blive forurosligede, ere de kun lidet stye. Deres Føde bestaaer fornemmelig af Insekter, nogle fortære ogsaa Bær. De ere alle Træfugle, som klække en eller to Gange om Aaret og bygge et mere eller mindre kunstigt Nede.

Nattergalen er omtrent saa stor som en Spurv; oventil graaagtig rødbrun, under hvidagtig med askegraat Anstrøg paa Brystet og Siderne; Halsen rødbrun, Benene brunligt rødbrøde.

Nattergalen findes i de fleste Egne af det tempererede Europa og holdes for Verdens bedste og herligste Sanger. Den opholder sig fornemmelig i Haver, Lunde og Løvskove, der ere gjennemskaarne af Agre, Enge og Bække. Den elsker mest det dunkle Halvlys i løvrige Buskader; der bygger den sit Nede. Derfra lader den ogsaa om Natten høre sin fortryllende Sang, der bestaaer af en Mængde Strofer, der snart lyde melankolsk, snart stige, snart ende svingende, snart douce. Bechstein har adskilt 25 saadanne Strofer og søgt at udtrykke disse ved Stavelser, der alle indeholde Vokaler og en Mængde Konsonanter; hvorfor allerede de Gamle sagde om Nattergalen, at den talede Græsk og Latin. Ligesom blandt andre Sangfugle, saaledes findes der ogsaa blandt Nattergalene bedre og flettere Sangere. Den ene udmærker sig i en Henseende, den anden i en anden, og der gives ogsaa blandt dem Virtuoser, der i sin Person besidde alle Stemmens og dens Modulatio-ners Fuldkommenheder. Man har ogsaa hos disse smaa Sangere opdaget Spoer af Alvindsyge og Egenhæderlighed. Den ene vil ei lade sig overgaae af den anden. Naar flere synge i samme Egn, strige de sig ofte hase og det

hænder undertiden, at de under denne Bæddekamp anstrænge sig saaledes, at der springer et Blodkar og de falde døde ned, ligesom rørte af et Slag. Goeze fortæller et mærkværdigt Exempel herpaa: En af hans Venner i Brunswig havde i flere Aar eiet en Nattergal, der var en af de mest udmærkede Sangere. Paa samme Sted boede en Jøde, der paa det mest Skuffende formaaede at efterligne Nattergalens Sang. Af Juglens Eier blev denne Jøde anmodet om at synge omkaps med Nattergalen. Det gik for sig eengang, da Nattergalen sang med fuldkommen Munterhed. Jøden begyndte. Nattergalen stemte i, Jøden hævede Stemmen; Nattergalen ligesaa. Jøden tog endnu høiere og Nattergalen forsøgte, men kunde ei komme over ham. Da den mærkede, at den var overvunden, taug den stille med et, og efter et Par Dage var den død.

(Den nordlige Nattergal.)

(Sylvia Philomele).



Denne Nattergal, der forekommer i de østligere og nordligere Egne af Europa, medens den foregaaende fornemmelig findes i de sydlige og vestlige, er oventil

mørk graabruun med rødbrun Hale; Struben hvid med graabruun Indfatning. Brystet er graabruunt. Denne Fugl forekommer i de sydlige og østlige Egne af Sverige. Hos os findes ingen Rattergal. De, der have hørt Anledning til en nøiagtig Sammenligning mellem denne og den sydeuropæiske Rattergals Sang, have fundet den sidste renere, mere afværlende og sammenhængende, den førstes bestaaende af mere afbrudte Strofer, hvoriblandt der forekommer nogle høie herlige Slag, men ogsaa en og anden skvattrende Lyd. Den sydeuropæiske Rattergals Sang er saaledes lifligere, jævner og mere behagelig i Længden; den nordliges er høiere, i visse Henseender mere tonesuld, men ogsaa ustadigere og trættende i Længden. Som Trækfugl kommer Rattergalen til Skaane omtrent i Slutningen af April. Hannerne komme steds en otte Dages Tid før Hunnerne; de opsoge da sine almindelige Opholdssteder og synge da hele Natten forat lokke de ankommande Hunner til sig. I August forsvinde de atter ubemærket. Rattergalen lever af Insekter og Larver; om Høsten fortærer den ogsaa Bær. Anviisninger til Rattergalens Fængst og Behandling i Fangerskab findes i Bechsteins og Dens Naturhistorier.

(Den europæiske Skrædderfugl.)

(Sylv. cisticola).

Den er meget liden; kun tre og en halv Tomme lang; paa Ryggen rødguul og fortleppet, under lysere. Halen er kileformig med hvid Spids; under er en sort Plet paa hver Hjør. Denne Fugl, der har hjemme i Italien, ubmærker sig ved sit Rede, som den former af Græs eller Siv, hvis ydre Blade knækkes i Toppen og trækkes sammen, saa at de danne Redets Bund. Men det forunderligste herved er, at de ikke, som ved andre Reder flækkes, men virkelig syes sammen. Med Næbbet

gjør nemlig Fuglen Huller i Randen af Bladene og forener dem ved Spindelbævertråde eller Planteuld. Den flækker to Gange om Aaret, i April og August, og bygger hver Gang et nyt Rede, af hvilke det første er grovere forarbejdet, fordi Spindelbæverene da mangle.

(Den indiske Skrædderfugl.)

(Sylv. sutoria).



Er neppe tre Tommer lang, lysgul overalt og udmærker sig ligeledes ved sit Rede, som den danner af tvende Blade. Den syer nemlig et visnet Blad fast til et grønt ved Enden af en Green, og forener Randene

ved en Traad, saaledes at de danne en Pung, der er
aaften ved Spidsen. Indeni udfores det med Duun.
Paa denne Maade siffrer den sin Afkom mod Albernes
og Slangernes Forfølgelse. Eggene ere ikke større end
Myrepupper.

Munken.


(Sylv. atricapilla).



Oventil aftegraa med olivengrønt Anstrøg; Hals,
Bryst og Sider lyse aftegraae. Hætten hos Hannen
sort, hos Hunnen rustfarvet. Den skal, sjønt temmelig
sparsomt, forekomme over hele Skandinavien. Ved Chri-
stiania viser den sig Baar og Høst. Dens Sang, som
er smuk og afværlende, har megen Lighed med Havesan-
gerens, og Fuglene ligne hverandre ogsaa meget. Naar
Munken synger, sidder den fordetmeste paa Toppen af et
høit Træ, medens Havesangeren fordetmeste skjuler sig
blandt de tætteste Blade, naar den synger.

(Havesangeren.)

(Sylv. hortensis).



Hovedet og Ryggen ere eensfarvede graabrune med olivengrønt Anstrøg; Bryst og Sider lysgraae med gulagtigt Anstrøg; Dielaagene hvide; Benene blyfarvede.

Denne er meget almindeligere end den foregaaende og forekommer i Løvskov og haver langt mod Norden. Nilsen har skudt den indenfor Polarcirkelen. Fra Mai til Juli hører man dens muntre udholdende og smukke Sang hele Dagen. Til Christianiaegnen kommer den i de sidste Dage af Mai. Saavel denne som den foregaaende bygge sine Neder i Tornebuste.

Rodhjælken.

(Sylv. Rubecula).

De forreste Dele af Brystet og Halsen ere gullrøde; de øvrige Dele af Legemet mørkt olivengrønne;vingerne og Halefjærene ere sortbrune med olivenfarvede Kanter.



Rødkjælken.

Denne er en af de almindeligste Sangere paa vor Halvø og i hele Europa. Som Trækfugl forlader den os sjelden førend Kulden indfinder sig, og kommer allerede tilbage ved Christiania mod Midten af April. Dens Sang er sørgelig, lav og i afbrudte korte Strofer. Rødkjælken er livlig, munter og rast i alle sine Bevægelser; bestandig flyver den fra Bust til Bust eller hopper fra Green til Green, eller springer i Hævegangene, nisser, slaaer Halen op og raaber sit: sits eller fisri. Naar man har flere i samme Bærelse, slaaes de ofte og bide hyerandre undertiden ihjel. — Rødkjælernes Rød er velsmagende og sundt. — Naar man holder den som Stuefugl, renser den Bærelset for Fluer og andre Insekter.

Blaakjælken.

(Sylv. Svecica).

Oventil er Blaakjælken mørkt graabruun; Halsens indre Halvdeel er rustød, dens ydre sort; det mellemste Hjørpar brunt. Struben er hos Hannen himmelblaa med en brunnrød eller hvid Plet; hos Hunnen hvid med sort Indfatning. Denne saavel som de fleste af dens




BlaaTjælken.

Slægtninge er temmelig vidt udbredt og forekommer næsten overalt i Europa, hvor der er et passende Lokale. Den opholder sig helst i saadanne Egne, som ere rige paa tætte Buske, ved Floder, Bække eller andre Bande. Denne Fugl forekommer her i Scandinavien i de nordligere Fjeldbegne og i de svenske Lapmarker. I de sydligere Egne forekommer den yderst sjelden eller aldrig, selv ikke paa sine Vandringer Høst og Vaar. I Leve- maade har denne smukke Sanger meget tilfælles med Rødstjerten. Bechstein beskriver dens Sang meget karakteristisk paa følgende Maade: "Den har nogen Lighed med Lyden af en Pire, d. v. s., dens Grundtone er en uafbrudt Surren, hvori der blandes nogle høie, behageligt klingende Strofer; saaledes synes det som om Fuglen gav to Slags Lyd fra sig paa een Gang. Dens Sang ligner saaledes mere Linerlens og Stærrens end Rattergalens."

Rødstjerten.

(Sylv. Phœnicurus).

Dens Hale er rustrød; det mellemste Fjærpar brunt. Hos Hannen er Halsen foran sort, Brystet rustrodt, Pan-



Rødsjerten.

den hvid, Ryggen askegraa. Sunnen er oventil rustigraa, Halsen foran hvidagtig, Bryttet rustrødagtigt. Den er omtrent $5\frac{1}{2}$ Tomme lang. Rødsjerten beboer hele Europa, en stor Deel af Asien og findes i alle Landskaber af den skandinaviske Halvø, hvor den opholder sig mellem Buske og Smaaskov i Nærheden af Vandet. Under sine Reiser findes de talrigt i Haver og Lunde. Hannerne komme gjerne en Uge før Hunnerne. Rødsjerten er en munter og lidelig Fugl, som bestandig er i Bevægelse, flyver og hopper. Naar den sætter sig, ryster den hurtigt paa Halen. Dens Sang bestaaer af korte Strofer og har nogle smukke, men ogsaa nogle skærende Toner. Denne ligesom den foregaaende lever fornemmelig af Larver og Insekter; men ofte fanger den som Bluesnapperen forbiflyvende Insekter i Luften. Den fortærer ogsaa Ribb og Hylbeær. Sit Rede lægger den i hule Træer, Revner i Mure, Steenrøse o. s. v. Eggene 6 — 7, undertiden 9, ere lyst blaagrønne uplettede.

Den grønne Løvsanger.

(Sylv. Sibilatrix).



Hødderne ere smudsfigt rødgule og Bingerne bedækkte to Trediedele af Hælen. Denne lille smukke Sanger, der ikke er funden hos os, synes mere at tilhøre Europas sydlige og østlige Egne. I Sverige forekommer den dog ligetil Stockholm. Dens Sang er raft og høi. "Den ligner næsten Lyden af en Søldaler, som man lader løbe omkring paa Kanten og dirrende falde ned paa et Bord." Om Sommeren synger Hannen næsten bestandig i den Egn, hvor den har sit Rede, og tier sjelden, uden naar den fanger Insekter.

Bastardnattergalen.

(Sylv. Hyppolais).

Denne herlige Sangfugl er oventil grønagtiggraa, under lysgul; de indre Bingesjære og Halsens Sidesjære med hvidgraae Kanter; Næseborene rundagtige; Benene blygraae.

Bastardnattergalen forekommer næsten overalt i Europa. Til Christianiaegnen, hvor den kun findes sparsomt, kommer den i de sidste Dage af Mai og anmelder da strax sin Ankomst ved en raft og afvejlende Sang,

hvori den paa den mest skuffende Maade efterligner flere andre Fugles Synge- og Lokketoner; "snart troer man at høre Larkens Triller, snart Starrens og Svalens Kvadder, snart Toner, der tilhøre Torniristen, Larkesalten o. fl." Den er en overordentlig munter og livlig samt meget fly Fugl. Blandt alle Sangere bygger Vastardnattergalen det smukkeste Rede og lægger de smukkeste Egg. Redet finder man i Juni, i en Busk et Par Alen fra Jorden, bygget i en Klost mellem 3 — 4 Grene. Det er omvendt kugleformigt og sammensat med megen Kunst af tørre Græsstraae og Rasker af Vidiearter m. m., samt udvendig prydet med den tynde hvide Birkenæver eller Papirstrimler og indvendig redet med Hestetagel. De fem bleggrøde eller rosenrøde Egg ere befrugtede med større og mindre sorte Punkter og Streger.

Fuglekongen.

(Regulus cristatus).

Denne Slægt har et tyndt, sylformigt, kort, udad sammentrykt, spidst, med en smal, Nygkant forsynet Næb; Mundvigerner ere kantede med børsteagtige Haar. Alle Arter ere smaa og herhen høre de mindste af alle europæiske Fugle. Hos os findes kun een Art.

Fuglekongen er tre Tommer og 6 Linier lang; den har safranguul Isse; Kinderne og Egnen om Dinene ere bleggraae. Øventil er den olivengrøn; under Iysgraa med olivengrønt Anstrøg. Hos Hunnen er Isfen citronguul. Denne lille Sanger skal findes i den hele bekjendte Verden. Saameget er imidlertid vist, at den findes saa langt mod Nord, som der voxer Barskov, ja endogsaa ved Nordkap. Seenhofes slaae flere Familier sig sammen og stryge omkring; en Deel drage ogsaa til sydligere Egne. I Væsen, Sang og Lokketoner har den overordentlig Lighed med Kulmeisen.

Gjærdesmutton.

(Troglodytes europæus).



Gjærdesmutslægten har middelmaadig langt temmelig tyndt, sammentrykt, spidst og noget bøiet Næb. Halsen er kort og bæres opret. De herhen hørende Arter opholde sig i tætte Buskadsfer, gamle hule Træstubber, Skigjærder m. m. Næb og Been ere mest uddannede hos dem. Den eneste norske Art bliver her baade Sommer og Vinter.

Gjærdesmuttonen er kun 4 Tommer lang. Øventil brunn med mørkere Tværlinier; de yderste Vingefjære have i den ydre Fane afverlende hvide og brune Pletter. Gjærdesmuttonen er en munter Fugl, som bestandig er i Bevægelse, hopper og kryber gennem alle Huller og Buste, Gjærder og mellem Stene. Den bærer stedse Halsen opad og lader de korte Vingefjære hænge lidt ned. Den forekommer fornemmelig i det nordlige Europa og Amerika og er temmelig almindelig i alle Egne af Skandinavien, fra de sydligste ligetil Lapland. Om Sommeren opholder den sig i tætte Skovsnar, men indfinder sig om Høsten i Haverne, ved tilfrosne Bække med Isalb, hvor den bliver Vinteren over. Dens Sang, som i Sammenligning med den lille Sanger er meget stærk,

hører man baade Sommer og Vinter, selv naar der er falden dyb Sne, naar blot Solen skinner. Almuen kalder den Tømmeliden, Peer Ronsmat. Dens Rede er meget fast og kunstigt bygget; det er kuglerundt og har paa Siden en rund Abning, der er saa stor, at Fuglen let kan gaae ud og ind.

Linerlen.

(*Motacilla alba*).



Erleslægten (*Motacilla*) udmærker sig ved en meget lang og tvær Hale. Næbbet er ret, meget tyndt, sylformigt, trindt og Undernæbbets Kanter ere sammentrykte udad. Erlerne opbolde sig fordetmeste paa aabne Marker. De bevæge bestandig den lange Hale op og ned, og løbe raaskt paa Marken efter Insekter, der tilligemed Orme og Larver udgjør dens eneste Næring. Om Baaren og Sommeren ere Hannerne forskjelligt fra Hannerne; men om Høsten faae de alle, selv Ungerne, lige Dragt. Hos os findes to Arter.

Linerlen er askegraae paa Ryggen; de to yderste Halefjære ere hvide til over Halvdelen. Bagkloven er kortere end Taaen.

Til Christiania ankommer Linerlen i de første Dage af April; 1836 kom den alt den 30te Marts. Fordet-

meste hører man dens kvibdrende Loffetone i Luften før end man seer den; men man gjenfjender snart den Fremmede fra Syden paa dens buesformige Flugt og lange Hale. Den er udbredt over hele den gamle Verden. Hos os findes den til i Nærheden af Polareirkelen. Om Vinteren skal den forekomme i stor Mængde i Senegal og i Egypten. Overalt er den ligesom Svalen Almuens Indlingsfugl; Linnerlerne fredes og formere sig betydeligt især i sydligere Lande, hvor de flække to til tre Gange om Aaret. Uforklarligt synes det derfor, at Antallet paa de fleste Steder aarlig aftager. Linnerlen er en munter Fugl, der elsker at opholde sig i Nærheden af Mennesker og Kreaturer. Naar den bliver vaer en Rovfugl, forfølger den den strax med Skrig, og bliver undertiden, skjønt sjelden, et Offer for dette Instinkt. I Oktober forlader den os.

Gulerlen.

(Mot. flava).

Gulerlen eller Saaerlen er oven olivengrøn, under gul; de to ydre Halefjære til over Halvdelen hvide, Bagfloen er længere end Taaen og kun lidet kroget. Denne lille smukke Erle viser sig i Omegnen af Christiania kun om Vaaren 3 til 4 Uger tidligere end Linnerlen. I Slutningen af September drager den til sydligere Egne. En og anden bliver Vinteren over i Schweiz og Italien, men de fleste tilbringe Vinteren i Persien. Efter Rask har den sine Klækkesteder i Videregionen omkring Vandene paa de lavere Fjelde. I Slutningen af Juni d. A. saa jeg den paa Krogsfjorden. I Flugt, Opholdsstet, Lyd o. s. v. har den ikke ubetydelig Lighed med Piplærken.

(Træ-Piplærken.)

(*Anthus arboreus*).



Piplærkeslægten har et ret, tyndt, sylformigt mod Spidsen sammentrykt Næb; Kanterne ere for det meste indbøiede i Midten. De til denne Slægt hørende Fugle bleve i lang Tid henførte til Lærkerne, med hvilke de kun have den graaspragtede Farve tilfælles. De adstille sig fra dem ved en tændere Form af Legemet, ved en længere Hale, mere kroget Bagklo, spidsere Hoved og forskjellig Næbform. De leve kun af Insekter og opholde sig paa aabne Marker og ved Vandet. Kun een Art beboer Skovene. Paa Marken løbe de hurtigt ligesom Erlerne og bevæge den lange Hale op og ned. Under forplantningstiden stiger Hannen syngende op i Luften, svinger sig der i Buer og daler for det meste ned igjen paa det samme Sted, hvorfra den sløi op. Dette gjentages ofte. Af denne Slægt forekommer hos os tre Arter. Skærpiplærken (*Anth. rupestris*), Engpiplærken (*Anth. pratensis*) og Træpiplærken, der oven er olivengrønagtig graa med mørkebrune Pletter; Brystet er offerguult og tegnet med sorte Pletter; den ydre Halefær er hvid paa skraa i den ydre

Salvdeel; den anden har en spids hvid Plet; Vagfloen er kortere end Taaen og kroget. Denne Piplærke beboer Skovene og forekommer overalt i Europa lige til indenfor Polartræfsen. Hos os er den almindelig og opliver vore Skove ved sin smukke Sang. Træpiplærken kommer almindelig som Træffugl til Christiania i de første Dage af Mai.

Manakin.

(*Pipra manacus*).



Tandmeiserne (*Pipra*) eller Manakinerne have et kort keglesformigt, sammentrykt Næb, der fortil er forsynet med en Tand. Halsen er kort. Det er smaa Fugle, af Udseende som Meiserne, fra hvilke de dog adskille sig ved glimrende Fjære; deres Hjem er det varme Amerikas Skove.

Den almindelige Manakin er ikke mere end fire Tommer lang, kort. Halsen, Tindingerne, Struben, Bugen og et langt Skjæg under Hagen ere hvide; Hunnen er sidstengrøn. Den findes, som det synes, i hele Sydamerika, hvor den i talrige Selskaber drager om i Urskovene nær ved Jorden med en snurrende Flugt, der næsten lyder som et snurrende Rostehjul, og en knirkende Stemme, hvorpaa der følger en Brummen, som man skalde troe kom fra et meget større Dyr. Dette har i Forening med dens Skjæg foranlediget, at Hollænderne have kaldt

den Manneken (Männchen), hvilket er bleven forbandstet til Manafin. Den snurrende Lyd frembringes ved Al-bueledets Bevægelse og kan endog frembringes efter Dø-den.

Anden Familie.

Spaltnæbbede (Fissirostres).

Denne familie er ikke meget talrig. Den ud-mærker sig fornemmelig ved et meget kort Næb, der ved Roden er meget bredt og nedtrykt samt Fløvet til lige under Øiet, hvorfor Gabet er overordentligt stort. Benene ere meget korte; Kløerne spidse og frogede. Vingerne fordet-meste lange og spidse.

Disse Fugle bleve dannede til at fange i Luften omflagrende Insekter. Nogle fange dem, der flyve om Dagen, andre de natlige. Dertil behøvede de intet Næb, men kun et stort klæbrigt Gab. De behøvede ingen Been, men stærke spidse Vinger, for at kunne bevæge sig hastigt i Luften. Til denne Levemaade svarer deres Organisation; Næb og Been ere traadte tilbage; Vin-ger og Gab ere overordentlig udviklede. Benene tjene sjelden til Gang; dertil ere de for korte; men til at sidde eller holde sig fast med. Naar de jage Insekter i Luf-ten holde de Næbbet aabent. De leve i Monogami, sælde een Gang om Aaret og ere samtlige Træffugle.

Taarnsvalen.

(Cypselus apus).

Taarnsvaleslægten har en fløvet Gale, der bestaaer af ti fjære. Vingerne ere meget lan-

ge, sabelformige og spidse. Alle Tærne ere rettede fremad.



Taarnsvalen.

Taarn- eller Kirke- og saa Fjeldsval, er foribruun med hvidagtig Strube. Til Chriftiania kommer Taarnsvalenen smuk Mainat i den sidste Halvdeel af Maaneden og tilkjendegiver sin Ankomst strax den følgende Morgen, ved sit skarpe, hvinende, gjennemtrængende Strig og ved sine piilsnare Kredse i Luften. Den er udbredt næsten over den hele Verden og findes i Nord til henimod Polar-kredsen. Ved Kirker, Taarne og andre høie Bygninger lever den almindelig i større eller mindre Selskaber. Taarnsvalen flyver baade saa høit og saa hurtigt, at det hviner i Luften, og der gives neppe nogen Fugl, som i Forhold til Størrelsen flyver hurtigere. For det meste flyver den om i større eller mindre Selskaber og lader under Flugten høre sit gjennemtrængende Strig. Den

høiler i sit Nede og paa Tagene; aldrig seer man den sætte sig paa Marken; thi dens lange Vinger og korte Been gjør det vanskeligt, ja næsten umuligt for den at flyve op igjen.

Tagsvalen.

(*Hirundo urbica*).



Svaleslægten har en fløstet Sæle, der bestaaer af tolv Fjære samt lange og spidse Vinger. Tre Tæer vende fortil, en bagtil. Næbbet er trindt udad, indad er det trekantet, nedtrykt og bredt, og fløvet lige under den forreste Deel af Biet. Svalerne tilfredsstille ikke alene sin Hunger idet de under sin lette svømmende Flugt fange Insekter; men de slukke endogsaa sin Tørst og bade sig under Flugten. De hække i Kolonier og bygge fine Neder af vaad Jord, Leer o. a. dsl. og udfodre dem indeni med Fjær. En Deel bygge Neder i Jordbakker og Klipper.

Tag- eller Muurvalen er ovenil fort med blaa Glands; under og paa Dvergumpen er den hvid; Sæle-fjærene ere uplettede. Den forekommer i de tempererede og nordlige Egne af Jorden og findes om Sommeren i

de fleste Egne af den skandinaviske Halvø til i Naboskabet af Polarcirkelen. Til Christianiaegnen, hvor den er almindelig, kommer den fordetmeste i den sidste Halvdeel af Mai. Ofteft bygger den sit Nede udenpaa Huse under Tagstjægget, Bjælkehoveder o. s. v., men paa mange Steder bygger den ogsaa i stor Mængde i steile Klippevægge med fremragende Rand.

Foruden denne findes hos os Ladesvalen eller Huusvalen (*Hirundo rustica*) og Sand- eller Strandsvalen (*H. riparia*) som i Mængde hæfter i Huller, som den graver i steile Elvebredder.

Man har fordm troet, og hos os troe mange endnu, at Svalerne ligge i en Slags Vinterdvale paa Bunden af Søer o. s. v.; men Sagen synes i den Grad urimelig og stridende mod Naturens Love, at man idetmindste har Ret til at tvivle derom, indtil det bekræftes ved flere Kjendsgjerninger end man nu har. See mere herom i Skill. Mag. 5te Aarg.

Salanganen eller den indiske Svale.

(*Hirundo esculenta*).

Denne Svale er mindre end Gjerdesmatten; ikke fuldt 3 Tommer lang. Dventil er den brunn, under og paa Spidsen af den sarformige Hale hvid. Den findes i hele Ostindien ligetil China, Japan og paa de philippiniske Øer, og hæfter fornemmelig i Huller ved Kysten, men dog ogsaa 7 à 8 norske Mile inde i Landet. Det er denne, der forfærdiger de berømte kostbare, spiselige Svalereeder, som nu temmelig hyppig komme til England og derfra til alle europæiske Samlinger. Man har antaget at den byggede disse af en Art Sotang; nyere Jagttagelser synes imidlertid at godtgjøre, at de næsten



Salanganen eller den indiske Svale.

alene ere dannede af Fuglens Spytt eller Mavesaft. Et saadant Rede ligner en liden paa Midten overfskaaren Staal, der ved sin lige Rand er befæstet til Klippevæggen. Denne Rand er noget over 2 Tommer lang. Redet er $1\frac{1}{2}$ Linie tykt, seer aldeles ud som lys Liim, er halv gjennemsigtigt og sprødt, saa at det let brydes son-
der. Hst og her seer man enkelte Slimtraade, og hele Massen synes at være dannet ved et Ræt af saadanne. De indiske og kinesiske Gurmander ansee disse Reder opløst i kogende Sønse- eller Lammekjødssuppe, for de

største Lækkerbidstener, som langt foretraktes for Østers, Champignoner og andre Delikatesser. De skulle ogsaa være meget nærende.

Crawfurd, den grubbigste Kjender af det indiske Archipelagus, beretter om denne Materie følgende: "De bedste Neder ere de, som findes i dybe, fugtige Klippebuler, og som tages, førend Fuglene have lagt Æg; fordi de da ere smukt hvide og ikke tilsmudsede af Ungerne. De samles to Gange om Aaret. Afdgangen til flere af de Huler, hvori Salanganen hæfter er overordentlig besværlig og Indsamlingen kan kun udføres ved Følk, der fra Barndommen af have været vant dertil. Nogle af de mærkeligste og rigeste Huler ere Karang-bolang, der ligge paa Sydøsten af Den Java. Indgangen til dem er i en flere hundrede Fod høi Klippevæg, og til denne maa man stige op paa Bambus- eller Rattan-Stiger, svævende over det brusende Hav, der bryder sig mod Klipperne dybt nedenunder. Har man naaet Hulerens Aabning, tør man kun vove sig ind ved Fakkelfin; thi det mindste Feiltrin vilde føre Vovehalsen sin Undergang imøde i de gabende Afgrunde. Naar Nederne ere blevene tørrede i Skygge, sorteres de i tre Klasser og nedpaffes i smaa Kasser, som almindelig indeholde $\frac{1}{2}$ Pikul (62 $\frac{1}{2}$ Pd.). 3 Canton koster 1 Pikul (125 Pd.) af bedste Sort 3500 Spd." Heraf indsees let at Svalerederne ere en af de største Luxusartikler, der blot kunne nydes af de Store. Den største og bedste Deel gaaer til Peking til Keiserens Hof. Crawfurd anslaaer det Kvantum af Neder, som aarlig udføres fra det indiske Archipelagus, til 242,200 Pund til en Værdi af henimod 1,500,000 Spd. og regner at Produktions eller rettere Indsamlingsomkostningerne kun udgjøre 11 Procent af denne Sum.

Natteravn.

(Caprimulgus europæus).

Blandt alle Svalerfugle have Natteravnene det største Gab og de længste og fiveste Veirhaar



Natteravnen.

eller Børster, der endnu mere udvide Indgangen til Gabet. Næbbet er meget kort, nedtrykt og fløvet til bagenfor under Øinene. Salen er afrundet og bestaaer af ti Fjære, Vingerne lange. De ere natlige Fugle, der blot i Skumringen og Dæmringen ere paa Færde. Som Uglerne blændes de af Dagslyset og have som disse store Pine og store Dren. De have ogsaa den samme bløde, lette, graabrunne plettede Fjærklædning, der udmærker alle natlige Fugle, og deres Flugt er derfor let og stille. Hannerne adskilles fra Hunnerne ved hvide Pletter paa de yderste Halefjære. Man kjender henved 40 Arter, af hvilke kun een forekommer hos os.

Den europæiske Natteravn eller som den af Almuen kaldes: Kvelknarren er oven graaspraglet med langsgaaende sorte Pletter og Streger; paa Underdelen af Legemet har den rustgule og sortbrune Tverstriber. Natteravnen opholder sig i Skovene fornemmelig paa saadanne Steder, hvor der er megen Lyng og faa Træer. Om Dagen ligger den fordetmeste mod Sydsiden paa Stene og Klipper; thi den elsker Varmen. Under smukke Mai og Juni-Aftener hører man i Skovene ofte deres forunderlige Sang: irrrrr eller urrrrr, som har nogen

Lighed med et surrende Rottesjul. Den findes temmelig almindelig i Europa, Asien og Afrika. Hos os er den meget almindelig selv i de nordligere Egne. Ratteravnene lægger sine Æg blandt Lyngen paa den blotte Jord. Den fortærer en Mængde for Skovene skadelige Insekter. Dens Kjød er overmaade velsmagende.


Tredie Familie.

Keglnæbber (Conirostres).

Denne familie indbefatter de Slægter, der have et tykt, mere eller mindre kegelformigt Næb med hele Kanter. Jo tykkere og stærkere deres Næb er, desto mere udelukkende leve de af Frø, Korn og Kjerner.

Lærken.

(Alauda arvensis).



Lærkerne (Alauda) udmærke sig ved et middelmaadigt, ret, kegelformigt, trindt Næb, der ved Roden er mere bredt end høit, men fornemmelig ved Bagtaagens Nægl, som er meget lang og ret.

De fleste Arter opholde sig paa Marken hele Aaret igjennem. Under Parringstiden stiger Hannen syngende næsten lodret op i Luften, samt opholder sig der med slagrende Vinger i længere Tid. De ere hos os Træffugle.

Lærken er paa Overdelen af Legemet rustgraa med sortagtige Pletter, under gulhvid med mørkere Pletter paa Brystet; de yderste Halefjære ere hvide til over Midten, den følgende er hvid i Spidsen og den ydre Kane. Denne almindelig bekjendte Fugl, hvis Sang i Vaar- og Sommermaanederne opfylder Luften, er meget almindelig i alle tempererede Egne af den gamle Verden og gaaer næsten heelt op til Polarkredsens. Hos os savnes den dog i Kystegnene og de trange Dale i det Indre af Landet. Til Christiania kommer den ialmindelig i Marts; undertiden endogsaa i Februar. Den lægger sit Rede mellem Gæden eller Græsset paa Marken. Kjødet er velsmagende og sundt; og i andre Lande f. Ex. Tydskland, hvor Lærkejagten drives i det Store, fortæres der en ubyre Mængde Lærker; paa een Maaned skal der til Leipzig være indført 401,304 Lærker. Foruden denne findes hos os:

Trælærken.

(*Alauda arborea*).

Den er noget kortere og tykkere og udmærker sig ved et hvidt Baand, der gaaer over Dinene og omkring Halsen, ved en kort tvær Hale, hvis tre yderste Fjære have hvid Spids.

Den adskilles fra Sanglærken ved sin buesformige Flugt og korte Hale. Om Sommeren opholder den sig i Skovene.

Kulmeisen.

(*Parus ater*).

Meiserne have et kort, ret, smalt, feglsformigt Næb, hvis Rod er bedækket med fremadliggende,



Kulmeisen.

haaraagtige Fjære. De herhen hørende Fugle ere alle smaa af Væxt og mere eller mindre brogede. Naar de puste sig op eller sove, træde deres fine, silkeagtige og lasede Fjære frem over Bingerne og Fuglen seer da ud som en rund Hjarbold. De opholde sig alle i Skove, Bustadser og Træer. De ere smaa, meget livlige og kun lidt flye. Bestandig ere de i Bevægelse, hange sig ned under Kviste og Blade og undersøge dem paa alle Kanter og i alle Retninger. De leve deels af Insekter og Pupper, deels af Frø, Bær og Frugter, men æde ogsaa Kjød, Talg o. s. v. og undertiden angribe de syge Smaafugle, som de gjerne hugge Hjernen ud af, eller Fugle, der ere komne i Snarer. De klække fordetmeste i hule Træer og lægge et stort Antal Æg, almindelig 8 til 12. De ere Strogfugle, der efter Forplantningstiden stryge om fra en Skov til en anden, fra en Hauge til en anden.

Kulmeisen er sort paa Hovedet og den forreste Deel af Halsen med en stor hvid Plet paa Siderne og en mindre i Nakken; Ryggen er askeblaa, Brystet hvidt. I de nordlige Egne af den gamle og nye Verden forekommer Kulmeisen, og findes hos os fornemmelig i Naale-skovene og de mellemste og nordligste Egne af Landet.

"Om Høsten og Vinteren træffer man temmelig almindelig i Haverne ved Christiania saavel denne som Sumpmeisen i Kompagni med Fuglekongen og Tagmeisen, hvilken sidste synes at være det blandede Selskabs Ansører; dens Kommandoraab, en trillende Loffetone, holder Skaren samlet." Af Almuen benævnes saavel denne som Sumpmeisen med Navnene: Tite, Hængetite.

Blaameisen.

(*Parus cœruleus*).



Isfen er blaa, Panden hvid; Kroppen oven olivengrøn, under gul.

Blaameisen ligner sine øvrige Slægtninge i Leve-maade. Den forekommer, skønt sjældnere, i Skandinavien, Tydskland, Rusland og skal i December undertiden endogsaa vise sig i Persien.

Langhalet Meise.

(*Parus caudatus*).

Halen er fiskeformig og meget længere end hele Legemet; Hovedet, Halsen og Brystet hvide, Ryggen sort, Naturhistorie. II. Deel.




Langhalet Meise.

Skulbrene og Undergumpen rødagtige. Denne Meise findes i hele Europa, i Rusland og Siberien. "Den er den uroligste af Meisearterne og opholder sig mest i Åsp. og Drestove. Om Høsten streifer den meget omkring og forekommer da almindeligere, ogsaa i Havenne. Foruden disse findes endnu hos os følgende Meiser: Rjødmeisen eller Talgoren (Par. major), Sumpmeisen (Par. palustris), Topmeisen (Par. cristatus) og den fiberiste Meise (Par. sibericus).

Pungmeisen,

(Parus pendulinus).

hvis Hjem er det sydlige og østlige Europa, udmærker sig ved sit kunstige Rede. Det har Form af en Pung og bestaaer af Græsstraa, Trævler af Rælder og Planteuld, der er sammenvævet til et tæt Filt. Oven-til har det en halsformig Indgang; det hænger frit ned



Pungmeisen og dens Nede.

fra et Nor eller en Bidiegreen, hvortil det er befastet ved en ordentlig Snor, et Par Fod over Vandet og indeholder 6 sneehvide Æg. Pungmeisen er rødbrunn; Hoved og Hals ere aftegraae, Struben hvid, Tindingerne sorte; Spring- og Halesjærene ere fortagtige med hvide Baand.

Gulls spurven.
(*Emberiza citrinella*).



Spurvene ere temmelig store og føre Fugle, som fornemmelig udmærke sig derved, at Overfjæven er smalere end Underfjæven. Næbbet er kort, Fegleformigt, sammentrykt; Gansen er forsynet med en Beenknude. Spurvene nære sig fornemmelig af megede Plantefrø, men fortære ogsaa Insekter. De fleste opholde sig i Skove, især blandt Buske, i og under hvilke de bygge sine Neder; nogle faa beboe dyrkede Marker og besøge aldrig Skovene; nogle opholde sig paa Fjeldene blandt nøgne Klipper. De ere alle Sangfugle; men deres Sang er kort og faatonig. En Deel Arter af denne og den følgende Slægt myte kun een Gang om Aaret, men fælde om Vaaren Hjærkanterne, hvorved de mere livligt farvede Hjære komme tilsyne. De fleste ere Træffugle.

Gulls spurven. Hovedet er hos Hannen gult, hos Hunnen olivenfarvet, fortplettet; Struben og Mæven ere gule; paa de to yderste Halefjære er der i den indre Kane ved Spidsen en hvid kileformig Plet.

Gullspurven er udbredt over hele Europa og det nordlige Asien og er hos os fornemmelig hyppig søndenfor Dovre. Om Sommeren opholder den sig fornemmelig i Lunde, Buskadser og Kanten af Skovene, men flytter om Høsten ud paa Marke og Enge, indfinder sig paa Gaarde og Gader, hvor den lever i Selskab med Hunsf spurven. Skjønt dens Sang er saatonig, er den dog velklingende. Man hører den fornemmelig mod Aftenen om Sommeren; den bestaaer af følgende Toner: titti - titti - titti - ty - y!

Dens Rjød er som de fleste øvrige Spurves overmaade velsmagende. Saavel denne, som flere andre Spurve- og Finkearter skyder og fanger man i Mængde om Vinteren. Naar Marken er bedækket med Sne, blotter man en Plads ved en Lade eller paa en Gaard og udstrøer derpaa Avner og Korn. De samle sig da i stor Mængde og man kan fange et betydeligt Antal med Slagnæt eller ved at skyde blandt dem med de fineste Spurvehagel (Dunst). Over det udstrøede Korn kan man ogsaa opstille et Sold, som man opstiller med en Vinde, hvori man har bundet en Snor, hvorved Soldet kan nedtrækkes, naar der har indfundet sig et tilstrækkeligt Antal under det. Paa udlagte Limpinder fanges de ogsaa let.

(Sivspurven.)

(Embr. Schœniclus).

Oventil fort med rustgule Hjørkanter, under hvid med brune Streger paa Siderne; Hovedet og den forreste Deel af Halsen hos Hannen om Vaaren sorte. Hos Hunnen er Hovedet sortagtigt med rustgraae Hjørkanter. Denne har omtrent samme Udbredning som foregaaende; men opholder sig om Sommeren mere i de mellemste og nordlige Egne af Norge. 3 Hjeldegnene



Ziofspurven.

findes den talrigt til op i Virkeregionen. Om Høst og Vaar er den temmelig almindelig i Christianiadalen.

Sneespurven.

(Embr. nivalis).



De mellemste Vingefjære og de tre yderste Halefjære hvide, hos Hannen med en sort Plet i Spidsen. Snees-

spurven er en artstiff Fugl, der tilbringer Sommeren paa vore Højsfelde og i Lapland. Mod Vinteren i Novemb. og December indfinder den sig i sydligere Egne af Scandinavien i store Skarer, og træffes da paa Marker og Veie ofte hele Vinteren over. Undertiden komme de i kolde Vintre til Tydskland og vise sig i Thüringen og Østerrige. I milde Vintre viser den sig sjelden i sydligere Egne. I Marts drager den tilbage til Fjeldene. Dens Sang skal have megen Lighed med Larkens.

Foruden de anførte Spurve findes her i Landet Drusulanen (Emb. hortulana) og Lapspurven (Emb. lapponica).

Væverfuglen.

(*Fringilla Textor*).



Finkerne (*Fringilla*) have et kort, fuldkommen fegelformigt Næb. Overnæbbet er bredere end Undernæbbet. De ere smaa kraftige Fugle, af hvilke de fleste beboe Skove, som grændse til Marker, andre opholde sig i Nærheden af Menneſter, i og ved deres Boliger. De myte om Høsten, men sælde om Vaaren

Fjærbræmmerne. Deres fornemste Føde er Plantefro, som de iforveien affalle med Ræbbet. En Deel fortære desforuden om Sommeren Insekter og opføde sine Unger dermed. De hække i Træer, Buske eller Huller og bygge ofte fine Neder med overordentlig Konst. De opføde almindelig flere Kuld Unger om Aaret. Om Høsten samle de sig i store Flokke og stryge mere eller mindre vidt omkring. De lade sig let tæmme, og de fleste synge smukt. Man kjender over 150 Arter.

Væverfuglen er gul med brunpletet og sort Hale. Den har tillgemed flere af sine Slægtninge faaet Navn af den Maade, hvorpaa den bygger sit Rede, idet den nemlig sammenfletter forskellige Gjenstande. Den samme Trang til at væve viser sig ogsaa, naar de ere fangne. Have de da ingen Traade eller Haar, indflætte de fældede Fjær eller Duun; have de derimod Traad eller a. dsl., saa tillukke de inden faa Dage deres Buur ved en tæt og uigjennemtrængelig Væv. Denne Fugl findes i Senegal.

Niistypen.
(Fringilla Qviscala).



Niistypen er ti Tommer lang, sort med blaa Glands. Den findes i Vestindien, Cayenne, Brasilien og Paraguay.

hvor den i uhyre Skarer herjer Riismarkerne. Ved at ødelægge en utallig Mængde Insekter gjengjælder den imidlertid for en Del den Skade, den ellers stifter.

Kirsebærfuglen.

(*Fringilla Coccothraustes*).



Denne Fugl, der fornemmelig har hjemme i de sydligere tempererede Lande, er meget sjelden hos os. I Sverige synes den at være almindeligere. Ved Christiania er den skudt en eneste Gang i Tøienhaven. Kirsebærfuglen er meget undersætsig og har et Ræb, der i Forhold til dens Størrelse er tykkere og stærkere, end hos nogen anden europæisk Fugleart. Paa Ryggen er den brunn. De mellemste Vingefjære ere i Spidsen

brede og kantede, Vingefjærene have indbyenbig og Halefjærene i Spidsen en hvid Plet. Den er især skadelig for Haverne, hvor den ødelægger en Mængde Kirsebær.

Graaspurven.

(*Fringilla domestica*).



Den træffes fordetmeste altid i Nærheden af Menneskers Boliger og har derfor ogsaa faaet Navn af Huusspurv, Huuskal. Hos Hannen er Hovedet ovenil askeblaat, hos Hunnen bruingraat; over Bingerne have de et hvidt eller hvidagtigt Baand. Fra Alperne og Pyrenæerne saalangt mod Nord, som Agerbruget trives, findes Graaspurven ved Byer og Gaarde. I det nordlige Asien forekommer den ligeledes overalt, hvor der drives Agerbrug. I de nordlige Egne er den dog mindre talrig. Om Vaaren fortærer Graaspurven fordetmeste Insekter og føder ogsaa dermed sine Unger. Om Sommeren æder den forskellige Haveplanter, som Græster, Bønner m. m. fl., saasnart de komme op af Jorden, og desforuden mange Slags Bær, f. Ex. Kirsebær, Ribes o. s. v. Naar Kornet begynder at modnes, indfinder den sig paa Agrene og fortærer i Mængde de modne Korn. Om Vinteren nærer den sig af Korn og Frø, som den

opføger paa Gaarde, Gader, Lader o. s. v. Skjønt nu Spurbene fortære en Mængde nyttige Væxter, gjøre de dog ogsaa nogen Nytte ved at rense Frugttræerne og Marken fra en Mængde skadelige Insekter og Larver, og det tør vel hændes, at denne fuldkommen opveier den Skade, de gjøre; thi paa flere Steder, hvor man aldeles har ødelagt dem, har Følgen været, at man ingen Frugt har faaet, da Insekterne ubindret har formeret sig og angrebet Træerne, og man har igjen maattet sætte Spurve paa. Den forstandige Landmand bør imidlertid søge at forhindre deres altfor stærke Formerelse. Foruden de under Gnukspurven anførte Stykke- og Gangemaader, kan man fange Spurve ved følgende Fremgangsmaader. I Lader og Stalbe, hvor man veed, de have Tilhold, stiller en Person sig om Natten i en Krog med en Lygte, som kun har Glas paa den ene Side; en anden driver med en Stang Graaspurvene frem af sine Gjemmesteder. De flyde da efter Lysskinnet, og en tredje Person griber dem. Paa Liimpinder skal man efter Professor Nilsson kunne fange dem i stor Mængde: Man tager et Træ eller en Green af tre til fire Alens Længde med mange udstaaende Smaagrene og Kviste. Disse affjærer man en Tomme fra deres Udspring og tilspidser Stubbene. Derpaa tager man nogle Nærskud af Hylb eller et andet Træ, som har stor Mark, skjærer dem i Stykker af en Tommes Længde, og sætter et Stykke paa hver af de tilspidsede Ender efter de bortskaarne Kviste. Siden fastsættes det hele Træ paa en Gaard eller et andet Sted, hvor Spurbene pleie opholde sig. Derpaa tager man rette tynde Pilekviste af 10 til 12 Tommers Længde, tilspidser dem i den tykkere Ende, bestryger dem med stærk Fuglelim*) og sætter dem meget fast i de omtalte Hylbetræstykker. Nu driver man Spurbene sagte mod Træet, og det lykkes fordetmeste at faae en eller anden til at sætte sig derpaa. Der behø-

*) Anvisning til at lave Fuglelim findes i Skill. Mag. 1ste Hæft. Ny Række.

ves ei mere end een; thi saasnart denne vil hoppe fra den Kvist, hvorpaa den har sat sig, og mærker at den sidder fast, striger den strax af alle Livsens Kræfter og slagrer med Bingerne. De øvrige Spurve, som høre dens Rødraab ville vide hvad der mangler Kammeraten, og samle sig om ham paa Træet. Enhver som sætter sig bliver siddende fast og begynder strax ilige Maade at strige af fuld Hals. Inden saa Minuter samles alt, hvad der findes i Naboskabet af Graaspurve, Gnuulspurve o. s. v. Det græsselige Strig, lotter og saa Krager og Skjærer til, der efter Gyne bidrage til at forøge Spektaklet. Naar Uimpinbetræet er saa fuldt af Spurve, at der ei rummes flere, tager man det ind og vrider Halsen om paa Straalerne. Kjødet, især af de yngre Spurve, er velsmagende.

(Bjergfinken.)

(Fring. montifringilla).



Struben, Brystet og Skuldbrene ere rustgule; Dyrkumpen, Maven og en skraa Streg over Bingerne, hvide. Bjergfinkens Hjem er i Virkeregionen paa de skandinaviske Fjelde. Om Høsten og Vinteren streifer den om og tilbringer Vinteren i Tydskland og Frankrige fornemmelig paa saadanne Steder, hvor der findes Bøgølden i

Mængde. Høst og Vaar vise de sig undertiden i Christia-
niadalen i store Skarer. Dens kvækkende Stemme har
skaffet den Navn af Kvækkeren.

Dogfinken.

(Fring. Coelebs).



Dogfinken kendes paa en dobbelt hvid Plet over
Vingen; Overgumpen er grønagtig. Den beboer hele
Europa, forekommer paa Madeira og i de nordlige Egne
af Afrika. Paa den skandinaviske Halvø findes den for-
nemmelig i de mellemske og sydligere Egne, hvor alle
Skove, Lunde og Haver i Vaarmaanederne gjenlyde af
dens muntre og raske Sang. Formedelst denne hører
den til de mest yndede Vaurfugle og kan om Vaaren fan-
ges paa Lømpinde med Løkkefugl. Den lægger almin-
delig ligesom den følgende to Kulb om Aaret.

Cornirishen.

(Fring. cannabina).

De ydre Vinge- og Halefjære ere sorte med hvide
Kanter; hos den gamle Han er Brystet blodrødt, hos
Hunnen graabruunt med sortbrune Pletter. Dens Hjem



Tornirise.

er største Delen af Europa, Rusland og Nordamerika. I Norge træffes den neppe længer mod Nord end til Dovre. Ved Christiania er den hyppig og sees i milde Vintre hele Aaret rundt.

Graafisk. *in sk*

(Fring. Linaria).



Isfen er karmosinrød, Struben sort; Brystet og Dvergumpen hos Hannen rosenrøde; hos Hunnen smud-

figt gulagtige, brumplettede; over Vingerne har den to hvide Tverstreger. Graasfiken har egentlig hjemme i de nordligste Egne af Europa, Asien og Amerika, men drager om Høsten og Vinteren til sydligere Egne i uhyre Flokke. Her i Landet har den mange Navne: Moirist, Sneefugl, Rødfop.

Sifik.

(Fring. Spinus).



Denne almindelige Fugl er oventil grønagtig med mere eller mindre mærkelige sortagtige Pletter; Hannen har sort Hue. Sifiken findes i hele Europa ligetil nordenfor Trondhjem. Om Sommeren opholder den sig parviis i Naalestovene, om Høsten og Vinteren stryger den om i store Skarer. Det er en hjælpen og lærvillig Fugl, der let bliver tam og er derfor af den norske Almue yndet som Huurfugl; dens Sang er kun et behageligt Kvibder. Den er en af de Fugle, som man om Høsten og Vinteren kan fange paa Liimpinde med Loffefugl. Undertiden slaar da en heel Flok ned paa Liimpindene. Om Vaaren drives denne Fangst her, men man faaer da kun enkelte.

Stilitsen.

(Fring. Carduelis).



Panden, Kinderne og Struben ere karmosinrøde. Vingerne sorte med en stor hvidgul Plet over Midten. Stilitsen findes i de fleste Egne af Europa ligetil Dovre, ja den skal endog forekomme i Finnmarken. Ligeledes findes den i Sibirien ved Aleppo og paa Madeira. Det er en stjern, munter Fugl, som bestandig er i Bevægelse og let lader sig tæmme og bliver fortroelig med Mennesker. Den kan uden synderlig Møie oplæres til mange artige Kunststykker. Dens Sang er høj, fyldig og behagelig og fortsættes i Vuur under alle Aarstider, undtagen naart den sælger. Man kan ogsaa lære den at fløite Bisemelodier o. dsl., dog ei med den Lethed, som Kanariefuglen og Graasifiken. I Vuur underholdes den med Balmue og Dampes-Jær, hvorhos man undertiden giver den lidt Grønt, som Salat, Kaal, Karse, Veblesiver. Med Kanariefuglen frembringer Stilitsen frugtbar Afkom. De Unger skulle blive bedst, der frembringes af Kanariehun med Stilitsen. De ere ofte overmaade smukke og synge meget godt. Om Vinteren fanger man Stilitsen paa Liimpinde med Lokkefugl. Man fanger den ogsaa paa Liimpinde, som udlægges paa Burer og Tidsele, hvor denne Fugl pleier indfinde sig, samt i al-

mindelige Fuglesælver med Burre- og Lidselhoveder til
Loffemad.

Toruben de her som norffe anførte Finter findes hos
os Piilsinken (Fr. montana), Svensken (Fr. Chloris) og
den guulnæbbede Trist (Fr. flavirostris).

Kanariesuglen.

(Fring. canaria).



Denne bekjendte Buurfugl er i vild Tilstand oventil
graagrøn, under guulgrøn; men i Fangenfkap er den
guul, hvid med mangfoldige Afændringer. Dens egent-
lige Hjem er de kanariske Der og fornemmelig Madeira,
hvorfra den alt for flere Aarhundreder tilbage bragtes
til Europa formedelft fin herlige Sang. Her forplante
de sig meget let i Fangenfkap, og frembringe atter med
mange beflægtede Arter, Bastarder, der igjen for en
Deel kunne forplante sig, f. Ex. med Hannen af Stilit-
fen, Siftken, Torniriffen, Svensken, Dompapen, o. fl.
De fynge eller flaae, fom bekjendt, hele Aaret rundt. De

funne ogsaa lære at eftersynge Rattergalens, Trælærkens og andre Fugles Sang, samt Stykker efter Fløite og Orgel. Ogsaa lære de allehaande Konster, at lægge sig bød, at affsyde Piftoler og selv at sammensætte Bogstaver til Ord. Man føder dem fornemmelig med det saakaldte Kanariefrø, men dette bør blandes med Balmuefrø, Vinterrapsø, Hampfrø, Straet Havre, og desforuden bør de stedsse have noget Grønt, som Kaal, Salat o. a. dsl. Hannen samler Materialierne til Redet, Hunnen ordner dem og lægger hver Dag et grønagtigt Æg med brune Prikker og Streger. Sædvanlig lægger den sex Æg 3 — 4 Gange om Aaret og ruger dem i 13 Dage. Efterat Ungerne ere udkrøbne, giver man de Gamle blandt Føden smaa hakkede haardkogte Æg tilligemed noget i Melk opblødet Hvedebrød, hvormed Ungerne mades. Først efter fire Uger æde de alene. Men førend Ungerne ere fjorten Dage gamle, lave alt de Gamle til et nyt Redet. Naar Ungerne ere flyveborne, afretter man dem til at synge. De ere underkastede mange Sygdomme, men skulle ved omhyggelig Behandling kunne blive over tyve Aar gamle. I mange Egne, fornemmelig af Schwarzwald, i Schweiz og Tyrol udflækker og oplærer man en Mængde Kanariefugle, der som Handelsartikel affættes paa mange Steder, fornemmelig i England, Rusland og Konstantinopel.

Dompapen.

(*Pyrrhula vulgaris*).

Denne Slægt (*Pyrrhula*) har et meget kort og tykt Næb, der er trindt, fegleformigt og hvælvet paa alle Sider. Overnæbbet er noget længere



Dompap.

og nedadboiet i Spidsen. Gunnerne ere meget forskellige. De leve af Frø og Kærner, som de fordømte alle med Ræbbet. I sin Levemaade have de meget tilfælles med de foregaaende. Hos os findes kun den anførte Art.

Dompapen har sort Hoved, Ringer og Hale; Ryggen er askegraa, de underste Dele af Legemet hos Hannen røde, hos Hunnen graae. Den forekommer i Bjergene i hele Europa og Rusland. Om Sommeren opholder den sig hos os i de bjergige Barstove, men kommer om Høsten og Vinteren ved Sneefald og Kulde ned i Haverne og ind til Husene. Dompapen er ikke meget sty. I Fangenskab bliver den let tam og lærer let at slette Melodier efter. Den fanges paa almindelig Liimpinde med Loffefugl, men i Mangel af denne kan man lokke dem ved at efterligne deres Loffetone, som man let kan slette med Munden. I Sverige stodes de med Pusterør, et Instrument, hvormed man kan sælde mange Smaafugle.

Grankorsnæbben.
(*Loxia curvirostra*).



Næbbet er hos Korsnæbbene (*Loxia*) middelmaadigt, stærkt, paa Siderne sammentrykt, oven-til og under hvælvet. Saavel Over- som Under-næbbet ere boiede, saaledes at Spidserne krydse hinanden. Hannerne ere meget forskellige fra Hunnerne og Ungerne ulige de Gamle. De fælde ei mere end een Gang om Aaret, men undergaae betydelige Farveforandringer uden Fælding. De opholde sig om Sommeren saalangt mod Nord, som der vorer Barstov. Om Høsten og mod Vinteren fryge de familievist omkring i sydligere Egne. De leve næsten alene af Furu- og Granfrø. De hæfte paa ubestemte Tider, saavel midt om Sommeren, som midt om Vinteren. Grankorsnæbben, den mindre Korsnæb, den norske Papagøie ere Navne, man har givet denne Fugl. Næbbet er ikke saa høit, som Undernæbbet er langt; dettes opadboiede Spids staaer ialmindelighed høiere end Overnæbbets Ryg. I Farve varierer den betydeligt i forskellige Aldere og Køn. De unge Hanner ere rødagtige, de gamle grønne eller grøngule. Hunnen er ovenpå graabruun med grønne

Fjærkanter paa Hoved og Ryg; de undre Dele af Legemet ere graae med gulgrønt Anstrøg. Den er almindelig i Europas, det nordlige Asiens og Amerikas Grænsfloer. I Christianiaegnen, hvor Granen er almindeligst, er den ikke sjelden. Den lever fornemmelig af Granfrø.

Den større Korsnæb, Furuforsnæbben (*Loxia pytiopsittacus*), som ogsaa findes her i Landet, lever af Furufrø.

Drehakkeren.
(*Buphaga africana*).



Drehakkerne danne en liden Slægt, der have et Næb, som er opsvulmet i Spidsen, hvormed de sammentrykke Byldeerne paa Hornkvægets Hud og flemme Bremselarverne ud deraf.

Den almindelige Drehakker er saa stor som en Trost. Den er brunagtig og har zinnoberrodt Næb, hvori den har en overordentlig Styrke. De findes ved Senegal, ved det gode Haabs Fjorbjerg og i Namakernes Land, hvor de gjerne i et Antal af 6 — 8 indfinde sig ved

Kvæg- og Gazelhjordene, og befrie Dyrene for de besværlige Bremselarver, som de udflemme saa at Blødet udflyder derefter.

En anden mindre Art (*Buphaga erythrorhyncha*) findes i det hele østlige Asien, ledsager regelmæssig Karavanerne, og befrier Kamelerne fra *Hypopopus*-Fluerne og deres Larver. Den har foraltrødt Rødt og Dieringe (Iris).

Maistypen.

(*Cassicus Qviscala*).



Maistæderne eller Trupialerne (*Cassicus*) have et stort kugleformigt Næb, der ved Roden er meget tykt og i Enden skarpt tilspidset. De ere amerikanske Fugle, der i Levemaade have megen Lighed med Stærrene. De bygge deres Nester i Nærheden af hverandre og vise derved megen Konstfærdighed. De leve af Insekter og Korn og anrette stor Skade paa Agrene. Deres Kjød er slet.

Denne Plyndrer er enhver Landmand i de nordlige og mellemste Stater af Nordamerika bekendt. Den er en Fod lang, Hoved og Hals glindsende sorte med violet og grøn Glands, Ryggen, Overgumpen og Bugen

kobberrøde, Bingerne og Halen staalblaae, Hale og Vingedækkerne rødviollette. Den har et stærkt en Tomme langt Næb, der indvendig er forsynet med en skarp Fremstaahen, hvormed den knuser sin Føde. I Marts Maaned komme de fra Syden til Pensylvanien i smaa Flokke og ødelægge da en utroelig Mængde Insekter og Larver, ligesom de i Forveien ville erstatte den Skade, de siden gjøre. I April hække de 10—15 Par paa Træer i Nærheden af Gaarde og Agre, som de da begynde at plyndre. Maismarkerne er det fornemmelig de hærje. Saasnart Maisen begynder at spire, oprykke de under fornøiet Strigen Hjertebladene. I August, naar den skyder Ar, gjøre de i Selskab med en anden nærbestaaende Fugl (*Cassicus phoeniceus*), det andet Angreb; i umaadelige Skarer styrte de sig som sorte Uveirfyer ned over Agrene og plyndre dem. Den Larm, de gjøre, ligner et stort Vandfalds Brusen. Godseierne ved Flokkerne Delaware og Schuylkill regne en Fjerdedeel af deres Høst for de stærktige Fugle, og blandt disse tage Maistypene det meste. Under Plyndringen anrette vel Bøsserne et stort Blodbad iblandt dem, men dette har ikke nogen anden Virkning end, at de flytte sig til en anden Ager; den næste Dag komme de igjen. Hærjningen vedvarer ligetil November, da Fuglene drage mod Syden for at tage Vinterkvarteer i Virginien, Carolina og Georgien. Der forsamle de sig i Skarer paa Millioner, der formørke Luften ved deres Mængde. Ved Bredderne af Roanoka høve de sig fra Klipperne med en Larm, der ligner Tordenens Rullen. Ligesaa talrige finder man dem i Kentucky og Mississippi.

Stærren.

(*Sturnus vulgaris*).

Næbbet er hos Stærslægten (*Sturnus*) ret, langagtigt, feglsformigt, nedtrykt fornemmelig i

Spidsen; Mundvigerne ere nedadboiede. De ere selskabelige Fugle, der ofte hække kolonivits i hule Træer, Mure, under Tage o. s. v. Efterat Ungerne ere udfloine, samle de sig i store tætte Skarer, som sværme omkring og drage til sydligere Lande.



Stårren.

Den almindelige Står er fortagtig med purpurrod, grøn og blaa Metalglands; ovenil bestrøet med smaa blegt ruffarvede Pletter. Ungerne ere før Fældingen graabrune uden Pletter. Stårren synes at være udbredt over hele den gamle Verden; thi den forekommer lige fra det gode Haabs Fjorbjerg til Salken og Jæland. Den findes i de fleste Egne af Norge og fornemmelig i stor Mængde paa Vestlandet. Man freder dem der paa flere Steder ligesom Svalen og Linerlen og opfatter „Hølster,“ hvori de klække. I Juli, naar Ungerne ere blevne voksne, sværme de om i store Skarer paa Markerne, og man seer dem da ofte hele Dagen søge sin Føde blandt Kreaturerne. Stårren er livlig og munter, bliver i Fængselskabet let tam, og kan lære at efterligne Ord og fløite Melodier. Af sig selv efterligner den ogsaa andre Dyrs og Fugles Stemme og Sang. Dens naturlige Sang bestaaer af adskillige surrende og fløitende Toner. Stårrene gjøre megen Nytte ved at fortære en Mængde skadelige og besværlige Insekter.

Korpen.

(Corvus Corax).



Ravneslægten (Corvus) indeholder en Deel store Fugle med et stærkt og hvælvet Næb, hvis Næseborer ere bedækkede med Børster. De leve næsten alle i store Flokke, undtagen i Forplantningstiden, og mange hæfte ogsaa i Kolonier. De ere altidende, thi de fortære baade Dyr- og Planteføde, saavel Korn, Frugt, Grønt, som Insekter, Orme, mindre Pattedyr og Fugle. De have en overordentlig fin Lugt, hvorved de paa lang Afstand opdage Nadsler. De fleste have det besynderlige Instinkt, at gemme alt hvad som glimrer; endogsaa gloende Kul bære de hen til sine Gjemmesteder. De udmærke sig ved List, Klogskab og Lærvillighed, hvilke Egenstaber ogsaa gjøre dem stikke til at modtage en Slags Opdragelse. Nogle Arter kunne ogsaa temmelig tydeligt lære at fremstige Ord.

Korpen eller Ravens er purpurglindsende sort; Halsen er stærkt afrundet; Dens Sideflæde kortere end Vingerne. Der gives ogsaa Korpe, der for en Deel eller ganske ere hvide; men disse er som hvide Spurve og andre Albinosvarieteter meget sjældne. Naar undtages det sydlige Asien, findes Ravens i de fleste Egne af den

gamle Verden og i Nordamerika. I Norge forekommer den overalt, saavel i Skovegne som paa de nøgne Klippeer. Af alle Ravnefugle skal den have den fineste Lugt. Dens Flugt er høi, seilende og skøn. Saavel unge som gamle kunne lære at udtale forskjellige Ord. Man underholder undertiden tamme Korper paa Bærtshusene i Tydskland for at more Gjæsterne med Prat og stielbe dem Huden fuld. Man har mange bekjendte Anekdoter om tamme Korper, som have kunnet tale. Følgende er maasse mindre bekjendt. Paa en Amtmands Gaard etsteds i Tydskland var der en Korp, som ofte tog sig en Spadseertour i det lange Græs i Haven for at samle Regnorme. Hønsenhunden kom ogsaa engang ind i Haven, mærkede, at der var noget Levende i Græsset og begyndte at følge dens Spoor. Da den kom nær ved Ravnens stød den, efter Sædvane, ligesom for en Flok Røphøns. Men Korpen, som kjendte den, traadte hurtigt frem og sagde: „Wer bist Du? Schelm! Spitzbube!“ Hunden blev saa forskrækket over at høre Ravnens tale, at den løb bort, saa hurtigt den kunde. Mod Røvfuglene fører Korpen en bestandig Krig, og naar flere Korper i Forening gjøre Angreb, maae selv større og modige Røvfugle vige. Selv er den ogsaa af rovgjerrig Natur og tager ofte Duer, Kyllinger, Hareunger o. s. v. Man vil paastaae, at denne Fugl skal blive over hundrede Aar gammel.

Kragen.

(Corv. Cornix).

Denne almindelige Fugl er aalegraar; Hoved,vinger og Hale ere sorte. Kragen er almindeligst i de nordligere Egne af Asien og Europa og skal ogsaa findes i Nordamerika. Her i Landet er den en Størfugl, og vel ogsaa for en Deel en Træfugl, der om Sommeren hyppigst opholder sig i det Indre af Landet, om



Kragen.

Vinteren famler sig ved Stæderne og Søtysterne. Kragen lever ialmindelighed af alle de Ting, hvoraf Dyr og Mennesker tage sin Føde. Nadsel og raadden Fist synes at være dens lækkreste Kost. Paa Agre og i haver gjør den vel nogen Skade ved at æde Bær og Hæfrugter samt Æg og Ungfugl, men ødelægger ogsaa en Mængde skadelige Larver og Insekter. Kun sjelden oplukker den det udsaaede Korn.

Blaakragen.

(*Corvus frugilegus*).

Den er sort med stærk staalblaa Glands; Næbbet er tilspidset og næsten ret; paa Halsryggen ere ingen Fjærstafter synlige. Dens Hjem er Europa; dog gaaer den ikke længer mod Nord end til de sydlige og maafee mellemste Egne af Scandinavien. Ved Christiania viser den sig Høst og Vaar. Den hæfter i Kolonier, opholder sig helst paa aabne Marker og slaaer sig om Høsten sammen med andre Kragesugle.



Blaafragen.

Rajen.

(Corv. Monedula).



Den har sort Kalot; Halsen og Tindingerne ere aftegraae. Rajen findes i Siberien, Persien og i Europa lige til Doyre. Den lever almindelig hele Aaret i Kolonier i Taarne, i Lunde og Bygninger. Paa nogle Steder her i Landet er den i stor Mængde. Ligesom sine Slægtninge er Rajen en fly og forsigtig Fugl, men

ialmindelighed er den meget livligere end visse og hurtigere i alle sine Bevægelser. Næsten bestandig hører man dens klagende: jaah, jaah; og der, hvor mange boe sammen, istemme de ofte paa een Gang et forfærdeligt Skrig. Naar en Røvfugl viser sig i Nærheden af deres Dyholdsted samle de sig og forfølge den langt bort. Rajen har det Instinkt fælles med alle Kragefugle, at opsnappe og gjemme alt glindsende, som den kan bære bort. Man har saaledes i Tydskland ofte fundet ældgamle romeriske Mynter i Rajereder. Rajen bliver let tam og fatter Hengivenhed for den, som måder den. Man kan lære den at udtale visse Ord, at komme, naar man kalder den ved Navn o. s. v.

Skjæren.

(Corv. Pica).



Er oventil sort med blaa og grøn Glans; Skulderne, Nederdelen af Brystet og Maven hvide; Halen lang og fiskeformig. Skjæren eller Skaden er en af de smukkeste og almindeligste europæiske Fugle. Den forekommer overalt i det beboede Europa, fra det nordligste Asien til Japan og i Nordamerika. Ogsaa Skaden kan blive meget tam, viser sin Herre megen Hengivenhed og kan lære at efterligne Ord. Dens sladdrende Stemme er noksom bekendt; dens Flugt er tung og langsom,

hvilket kommer af Bingesjærenes eiendommelige Befæst-
senhed og den lange kileformige Hale. Alt i Februar
begynder Skaden at bygge sit Nede, som den oventil
beskytter mod Uveir og Nøvfugle ved et Tag af tagget
og tornet Nis. Om Vinteren lever Skjæren af alle-
slags Affald, Aadsel, Gjødsel, Rogn- og Gnebar o. s. v.
Insektpupper, Rotter og Smaafugle. Om Sommeren
fortærer den Larver, Jordfrugter, Korn, Kirsebær, Veb-
ler, og naar den finder mere Føde, end den kan fortære,
gjemmer den det Overskødige til den atter bliver hung-
rig. Skjent Skjæren næsten altid opholder sig i Nær-
heden af Mennesker, er den dog sky og mistroisk, saa
at den sjelden lader Skytten komme i Hold, hvis han
ei skjuler sig. For at formindste Skjærenes Antal paa
de Steder, hvor de gjøre Skade, bruger man flere Mid-
ler, der ogsaa kunne anvendes mod Krager, Korpe og
Ræver. Man udbænger i de Træer eller paa de Steder,
hvor de pleie sidde, smaa Fiskekroge med Kjødstykker paa.
Man fanger dem ogsaa i Doner, da man bruger Kjød
til Loffemad. Naar man om Vinteren udkaster Lervin-
ger af slagtede Dyr, samle de sig derpaa, og man kan,
da de ofte sidde tæt sammen, fra et passende Skjul skyde
mange. Ved at blande Alvegift (*Strychnos Nux vomica*)
blandt de ovennævnte Læfferbidstener, kan man ogsaa
dræbe dem. Man bruger ogsaa paa de Steder, hvor
de pleie indfinde sig, i Sneen eller Jorden at nedstikke
Krammerhuse, som indvendig ere bestrøgne med Fugle-
liim; paa Bunden af dem lægges et Stykke raat Kjød.
Naar Fuglen med Næbbet vil optage dette, bliver Kram-
merhuset siddende fast paa dens Hoved, saa at den ikke
kan see. Den flyver da fordetmeste lige op og falder ret
ned igjen, samt findes fordetmeste død.

Noddeskrigen.

(*Garrulus glandarius*).

Sos fuglene af denne Slægt (*Garrulus*) er
Næbbet fortære end Hovedet, aslangt fegleformigt;



Rødbestriden.

i den ydre Spidse er Overnæbbet lidt nedbøiet. Hele Hjørklæbningen er yppig og silkeblød. Strigerne opbolde sig om Sommeren parvis i tætte og vilde Skove, De ere ikke Træfugle, men fryge under Forplantningen om i Skovene med sine Unger i Skarer. De ere livlige og urolige Fugle, som bestandig ere i Bevægelse. De leve saavel af Olden og Bær, som af Insekter, Orme, Fugle og mindre Pattedyr og synes i det hele at være mere rovgjærrige end foregaaende Slægt.

Rødbestriden er rødbrunnagtigt graa med sort Hale, hvid Over- og Undergumpe samt blaae Vingedækker med sorte Dværstreg. Den forekommer i hele Europa og under samme Bredegrader i Asien. I Skandinavien er den almindelig i de sydlige Skove, sjældnere nordensfor Dovre. Den har noget Eiendommeligt i sit Udseende, hvorved den adskiller sig fra Kragerne. Dens Flugt er svævende og stille. Naar man nærmer sig den, flyder den bort med et sturrende Skrig, men sætter sig snart igjen. Den kan tæmmes og lærer da ligesom Skærerne at efterligne Ord.

Noddekraaken.
(*Caryocatactes guttatus*).



Næbbet er hos denne Slægt (*Caryocatactes*) længere end Sovedet, ret, næsten trindt og ender med en nedtrykt stump Spids. Som Haffespætterne sætte de sig paa Træerne og flaae og bore i Barken med Næbbet. De leve af Insekter, Nodder, Kærner og Frugter, og bygge i hule Træer. Om Høsten streife de ligesom Skrigerne om i Skovene i større Skarer.

Noddekraaken er brun, bestrøet med hvide draabeformige Pletter;vinger og Hale ere sorte; Halespidsen og de nedre Dækflæde hvide. Hele Fjærklædningen er pypig og silkeblød. Den findes i Europa ligetil Throndhjem og maaskee endda nordligere, i det nordlige Asien og Nordamerika. Om Sommeren beboer den de tætte Varskove, om Høsten streifer den flokvis omkring fornemmelig i Ege- Bøge og Hasselskove. Om Sommeren æder den Insekter og Larver, om Høsten forstjellige Slags Frø, Olden og Nodder, hvilke den først svælger hele og opfylder Kraaen med; derpaa flyver den hen med dem til et sikkert Sted, hvor den atter kaster dem op og gemmer dem enten til Vintersøde eller knækker dem, opæder Kærnerne og svælger Skallene, der tjene til Anusningsmiddel. Den skal fortære Fugleunger

og Æg og opæde Fugle, der fide i Snarer. Man faaer den ligesom foregaaende undertiden i de for Kramsfugl udsatte Doner.

Blaaraaken.

(*Coracias garrula*).



Denne Fugleslægt (*Coracias*) har et stærkt sammen- trykt, ret, Næb; Overnæbbet er i Spidsen nedbøiet ne- denfor Undernæbbet. Mundvigerne ere kantede med stive Børster. De hertil hørende Fugle op- holde sig parvis i gamle Skove og ere vilde og rædde. Deres Føde bestaaer fornemmelig af store Insekter, som Skarnbasser. De lægge sine Æg i hule Træer. Deres Hjaeres Farver ere smukke og lysende.

Blaaraaken er blaagrøn, med bruunrød Ryg og sorte Vingeffære. Denne smukke Fugl tilhører fornem- melig det mellemste Europa, men forekommer ogsaa i Sverige; hos os er den meget sjelden. Den drager i September til Italien og Barbariet. Blaaraaken har lange og spidse Vinger; dens Flugt er derfor hurtig og har nogen Lighed med Duens. Ofte tumler den sig omkring i Luften med sine Kammerater og lader da be- standig høre sit stærke og sturrende Skrig: Rakk, Rakk, Rakk.

Den almindelige Paradiisfugl.

(*Paradisea apoda*).

Paradiisfuglene (*Paradisea*) have et lige sam- mentrykt Næb, og udmærke sig ved sine Hjaeres



Den almindelige Paradiisfugl.

Blødhed, Rigdom og Skjønhed. Næseborene ere bedækkede med bløde fløielsagtige fjære. Fjærene paa Legemets Sider ere overordentlig lange og fine og skjule ofte Halsen; desuden have de forskjelligtformede Halefjær og Topfjær. I andre Henseender have de Overeensstemmelser med Ravnene. De leve paa Nyguinea og de tilgrændsende Der, i Skovene og nære sig af aromatiske Frugter, Insekter o. s. v. De skulle leve i Polygami, og bygge Nester paa Trærne. Naar de flyve, udspændes de talrige fine Sidefjære, og de faae saaledes Stikkelse af en Fjærbold. Imidlertid er det kun Hannerne, der have denne prægtige metalglindsende Dragt; Hunnerne have meget uanseelige Farver. Forresten ere de kun lidet bekendte. I Størrelse variere de mellem en Lærke og en Skrige.

Den almindelige Paradiisfugl er bekendt fra Oldtiden af. Af Størrelse er den som en Trost; den er gulbrun; Hovedet og Halsen citrongult; Panden og Struben ere smaragdgrønne; de korte, slagrende Sidefjære ere gule, de lange hvide. Kun Hanner af denne Art har de lange gule slagrende Halefjære, som Damerne og de indiffe Sultaner bruge til Pynt. De hække kun paa Nyguinea, men forekomme som Træfugle i Storer paa 30 til 40 Stykker paa de østlige Moluffer. De Ind-

fødte fange dem med Liimpinde og skyde dem med stumpe Pile. De flaae dem og tage Fødderne af dem, hvorfor man i lang Tid i Europa troede at denne Art manglede Been, og at Fuglen bestandig holdt sig svævende i Luften ved de lange Sidesjære. De opholde sig paa Træerne; Hannerne ere sjældne og enkelte, medens man ofte paa et Træ træffer tyve Hunner. Nagtet de lange Sidesjære er Flugten hurtig og bølgeformig og Lesson, Naturforskeren paa den Dupereyffe Reise, blev saa henrykt, da han saa den første flyve, at han glemte at skyde; han sammenligner den med et glimrende Meteor. Lesson saa tvende levende hos en kinesisk Kjøbmand, hvilke bleve fodrede med kogt Riis; de havde alt været 9 Maaneder i Fangenskab; de aad ogsaa orientalske Kafferlatfer.

Fjerde Familie.

Tyndnæbber (*Tenuirostres*).

Disse indbefatte de øvrige Spurvefugle af den første Afdeling, med et tyndt, langt, snart lige snart mere eller mindre bøiet Næb uden Skaar eller Tand.

(Nøtvækken.)

(*Sitta europæa*).

Denne Slægt har middelmaadigt langstrakt, fegleformigt Næb, som oventil og under er lige tilspidset. Nøtvækkerne eller Spærmeiserne flatter paa Træerne i alle Retninger. I Levemaade nærme de sig dels til Haffespætterne, dels til Meiserne. De leve i Skovene, hække i hule Træer og lægge et stort Antal Æg. Hos os findes kun een Art. Nøtvækken er oventil graablaa med en sort Streg gennem Dinene, under

hvidagtig. Halefjærene ere sorte med en hvid Plet baggenfor den graa Spidse; de to mellemste ere blaagraae. Den er saa stor som en Værte. Dens Hjem er det nordlige Europa og Asien. Den bliver hos os hele Aaret og opholder sig om Sommeren fornemmelig i gamle Løvstove; om Høsten og Vinteren er den almindelig i Haverne. Denne Fugl er aldeles ikke sty. Den samler sig Forraad af Olben og Nødder i hule Træer. Som Spætterne op søger den Insekter i Trærnes Bark. Sit Nede bygger den i hule Træer og tilklæber Indgangen, naar den er for stor, saa tæt med Leer, at der kun bliver en ganske snæver Abning, hvorigjennem den kan passere.

Trækryberen.)

(*Certhia familiaris*).



Trækryberne (*Certhia*) have et temmelig langt og tyndt Næb, som er mere eller mindre bøiet. Tungen er noget bruskagtig og udeelt. Salen bestaaer af 12 stive spidse Fjære. De ere alle temme-

lig smaa Fugle, hvoraf mange have smukke Farver. I de varme Lande findes en Mængde herhen hørende Smaa-fugle, der ere bekendte under Navne af Honningfugle, Blomstersugere o. s. v. fordi mange have en rørdannet Tunge, hvormed de udsuge Honningsaften af Blomsterne; dog leve de fordetmeste ogsaa af Insekter.

Trækryberen er oven plettet af Bruunt, Rustguult og Hvidt; under er den hvid eller sølvgraa; over de udbredte Vinger er et guulagtigt hvidt Tværbaand. Den har omtrent samme Hjem, som den foregaaende, og skal kun opholde sig i Egne, hvor Vønnen voxer og Hveden bliver moden. Som den foregaaende indfinder den sig om Høsten i Haverne. De fleste blive hos os om Vinteren. Den klatter med overordentlig Lethed og er saa lidet sky, at man kan gaae lige hen til det Træ, hvorpaa den kryber om. Denne lille Fugl fortærer mange for Skovene skadelige Insekter.

Den almindelige Kolibri.

(Trochilus colubris).



Kolibrierne (Trochilus) ere smaa, lette og hurtige Fugle med et langt, tyndt og spidst Næb og en dybt spaltet Tunge. De flyve med hurtige og stærke Bevægelser som Svalerne, og have som disse lange og spidse Vinger, korte og svage Fødder og en bred Hale. Til denne Slægt høre de mindste og sjøn-

nefte Fugle. Nogle ere ikke større end Humler; og medens de ligesom disse sværme om Blomsterne og udsuge deres Safter, see de ud som funkende Edelstene; de nære sig ogsaa af smaa Insekter. Kolibrierne ere modige og hidfige Fugle, der i den Tid, de sørge for Æg og Unger, angribe enhver Fugl, der nærmer sig deres Rede, og saare dem farligt i Diet med det spibse Næb. Med Fugle af sin egen Art kjæmpede i Parrings- og Rugetiden med stor Hidfighed og megen Larmen, og vedblive uden at lade sig forstyrre selv af Pladskregn, saalænge til den ene eller begge styrte udmattede til Jorden. Naar de ere yrede eller bange, blive deres Bevægelser saa heftige og deres Flugt saa hurtig, at man neppe formaaer at følge dem med Diet. De danne et meget stærkt halvfugleformigt Rede af Bomuld eller deslige og lægge to Æg, der omtrent ere af Størrelse som Urter. Man kjender omtrent 100 Arter af Kolibrier, som alle findes i den nye Verden.

Den almindelige Kolibri findes fra Mexiko lige til Georgien i Nordamerika. Hals, Ryg og Halebæjere ere guldgroenne; Struben ildfarvet rubinrød; hos Hunnen hvid. Den bliver 3 Tommer lang. Om Sommeren ere de meget hyppige i Skovene, og man træffer ofte hele Dufin sammen. De ere ikke flye og komme selv til Blomster, der staae i eller udenfor Vinduerne. Om Sommerastnerne seer man dem flyde ud fra en Green og snappe de i Luften dansende Insekter.

Hærfulgen.

(Upupa Epops).

Denne Slægt (Upupa) udmærker sig ved en Fjærkam paa Jovedet og et langt, tyndt, noget buetformigt, trekantet sammentrykt, spidst Næb og en kort Tunge. Hærfulgene opholde sig mere paa Jorden end paa Træerne; paa fugtige Enge i Skove søge de sin Føde, som bestaaer af Insekter og Larver. Om

Sommeren leve de parviis i Skovene, om Føsten træffes de familieviiis under sine Reiser til sydligere Lande.



Hærfuglen.

Hærfuglen har en rustgul Hærfam med sorte Spidser. Ryggen og Vingerne ere sorte med gulagtig hvide Tverbaand; Halsen er sort med et hvidt Tverbaand. Hærfuglen findes i Europa, Asien og Afrika. I Norge er den meget sjelden. Den er urolig og fly. Paa Marken løber den meget hurtigt, og naar den bliver vred eller bange, slaaer den Hærfammen op. I Tydskland, England og Sverige, hvor den er hyppigere, hører man ofte i Skovene dens Lyd: Opp - opp - opp, som den tit gjentager, og da man sjelden faaer see Fuglen, som, naar man nærmer sig, flytter sig bort og lader samme Lyd høre fra en anden Kant, saa har denne Fugl undertiden uskyldigviis givet Anledning til Spøgelsehistorier, og er ei sjelden bleven regnet blandt onde Forbud for Krig og Dyrtd. Herfra skriver sig ogsaa dens norske Navn Hærfugl.

Syndactyli.

Dette er den anden Afdeling af Spurvefuglene, der indbefatter dem, hvis Øbertæer ere ligesaa lange som Mellemtaaen og som ere sammenvorne med denne lige til det næst yderste Led. Af disse dannes kun een Gruppe, der indbefatter fem Slægter, af hvilke vi her kun anføre tre.

(*Biæderen.*)

(*Merops Apiaster.*)




Næbbet er hos denne Slægt (*Merops*) temmelig langt, bøiet, fløvet til under Øiet, spidst og forsynet med Rygkant. De leve af Bier, Hvepse og andre Insekter, hvilke de ligesom Svalerne fange i Luften.

Biæderen har brunrød Ryg og Vingedækker; Strubben er gul og omgivet med Sort; Kroppen under blågrøn. Den er saa stor som en Trost. Denne Fugl tilhører egentlig de varmere Lande i Europa, Asien og Afrika. I Syd for de store Bjergkjæder, Alperne o. s. v. er den almindelig. Mindre almindelig er den i Sydland og Frankrig. I Sverige hører den til de sjældneste Fugle, og her i Landet er den kun seet een eneste Gang, i Løienhaven ved Christiania. Overalt i Europa

er den Træffugl, der mod den kolde eller regnsfulde Aars-
tid drager til sydligere Lande. Dens Flugt er høi og
meget rask, og har nogen Lighed med Taarnsva-
lens. Den flyver fordetmeste i Flok og lader under Flugten
høre en skarp pibende Lyd. Ligesom Strandsvalen gjør
den for sit Rede horisontale Huller i Brinker ved Aaer
og Elve.

Jisfuglen.

(Alcedo Ispida).



Jisfuglenes (Alcedo) Næb er langt, ret, næsten
firkanteret, fløvet til lige under Øiet, udad stærkt
samentrykt, i Spidsen skarpt. Dens Been ere me-
get korte.

Langs Ryggen er Jisfuglen skønt asurblaa; de
nedre Legemsdele og et Baand gennem Vinene rustbrøde.
Den er almindeligst i det sydlige Europa og Rusland,
men forekommer ogsaa i England, Holland, Tydskland
og de danske Hertugdømmer. Saavidt man veed er den
hverken skudt i Sverige eller Norge, men kun seet der nogle
faa Gange. Jisfuglen lever af smaa Fiske, som den
griber med sit lange Næb, i det den svæver over Vandet.

Næshornfuglen.

(Buceros Rhinoceros).



Næshornfuglene (Buceros) udmærke sig ved det uhyre tykke, randede Næb, der hos de gamle Fugle har en Udvæxt ligesom Begyndelsen til et andet Næb. Saavel Næbbet som denne Udvæxt er let og af en celled Substants. Medens Næbbet bringer dem i Forvandtskab med Tusanerne, nærme de sig i Væsen og Ydre Ravnene, men deres Fodder ere Viæderens og Jisfuglens. De leve i Afrika og paa Sydøerne og nære sig af Nadsler og Frugter.

Den almindelige Næshornfugl (B. Rhinoceros), Calao, er saa stor som en Kalkunshane; Næbbet er henvdet en Fod langt. Hærene ere sorte; Halsen hvid med sorte Baand; Næbbet er ligeledes hvidt, og det uhyre opad krummede 8 Tommer lange og 4 Tommer brede Horn, er snart sort, snart rødt. Den findes paa Molukterne

og Philipinerne, stinker og seer affskyelig ud, fordi den fornemmelig lever af Aadsel.

Tredie Orden.

Klattrefugle (Scansores).

Klattrefuglene udmærke sig derved at deres **Yder-
taa** ligesom Tømmeltaaen er rettet bagtil; herved sæt-
tes de istand til lettere at holde sig fast paa Træstam-
merne, hvorpaa mange af dem klattre. Undertiden er
den en Bendetaa. **Næbbet** er meget forskjelligt i Form
og Udseende. Hos nogle er det hageformigt, hos nogle
frummet fra Roden af, deels ret, mangelantet eller trindt,
deels bøiet og sammentrykt, deels fileformigt.

Fuglene af denne Orden hæfte sædvanlig i Guller i
gamle Træer; deres Flugt er middelmaadig; deres Næ-
ring bestaaer, ligesom Spurvefuglenes i Insekter og Frug-
ter. Mange af de herhen hørende Fugle klattre uagtet
de have Klattrefodder, meget slet eller aldeles ikke, me-
dens mange andre Fugle, der have Gangfodder, som
Notvæffen og Trækryberen, klattre meget godt. Forre-
sten ere de indbyrdes meget forskellige og inddeles i
mange mindre Grupper.

Sortspætten.

(Picus Martius).

Spætterne (Picus) have et langt eller middel-
maadigt, ret, kantet mod Spidsen fileformigt til-
spidset Næb. Næseborene ere bedækkede med frem-
adliggende Børster. Tungen er ormformig, i Spid-
sen hornagtig, forsynet med haarfine Agnorer.



Hattespætten.

Hattespættterne opholde sig fordetmeste parviis i store Stove, hvor der findes gamle omstufne og raadnende Træer, opad hvilke de klattre, forat bortplukke og fortære Insekter og Larver, og hertil synes deres hele Bygning at være bestemt; Næb, Fodder og Hale ere fornemmelig udviklede. *Salen*, der bestaaer af ti stive elastiske, noget nedboiede og tilspidede Fjære, er dem et sikkert Støttepunkt, naar de klattre paa Træerne og forøger ved sin Elasticitet Styrken af deres Slag med Næbbet. Næbbet er stærkt, skarpt og dannet til at hugge i mørke Træer. Den tynde, spidse og klæbrige Tunge, der ved en egen Indretning kan udstrækkes meget langt, bruges til at fange Insekter med. Benene ere korte; Kløerne spidse

og stærke. De hugge runde Huller paa Siden af mørke Træer. Naar de mærke, at der er noget Insekt under Barken, hugge de med Næbbet til Insektet enten kommer ud, eller til de have haffet Hul paa Træet. Insektet gjennebores da med den spidse Tunge, eller bliver klæbende fast derved. Haffespætterne leve i Monogami, lægge sine Æg i de Huller, de haffe i Træerne, og ruge dem verelviis. Ved at hugge hurtigt paa en tør Green, frembringe Hannerne under Parringstiden en surrende Lyd, der har nogen Lighed med en Hvirvel paa Tromme. Spætterne have megen Lighed med hinanden i Form, skjønt de afvige betydeligt i Farven, og man kender dem igjen ved første Dietast. De fleste have rød Hue. De ere ikke Træsfugle, men mod Vinteren streife de fleste vidt omkring. Da de kun haffe i forårbeede Træer gjøre de ingen Skade, men ødelægge derimod en Mængde for Skovene skadelige Insekter.

Sortspætten er den største af de europæiske Spætter. Den er henved 18 Tommer lang, sort; hos Hannen er hele Huen, hos Hunnen blot Raffen karmosinrød. Det er denne, der kaldes Gjertrudsflugt. Dens Hjem er Europas og det nordlige Asiens Naalestove. I fort Tid hugger den store Huller i Træerne, forat søge Insekter, forat lægge sine Æg deri eller for at have et Tilflugtssted om Ratten og i Uveir. Naar den flyver fra et Træ til et andet eller fra en Skov til en anden lader den ofte høre en knirkende Lyd: tirr, tirr, tirr; og siddende paa en Træstamme, raaber den undertiden ængstligt: kli-æh, kli-æh, kli-æh; eller klih, klih, klih. Om Vinteren haffer den undertiden Hul i Myretuerne, forat faae fat paa Myrerne og deres Pupper. Den er den stejeste af alle Haffespætter og meget vanskelig at komme i Skud. Undertiden lyffes det dog at losse den til sig, naar man skjuler sig mellem Buskene og banker med en Kniv eller Nøgle paa Bøsseskotten. Dog bør man ikke skyde den uden til videnskabeligt Brug.

Grønspætten.
(*Pic. viridis*).



Den er omtrent tretten Tommer lang, grøn med karmosinrød Hue og sort Dieregrøn; paa de undre Dele af Legemet er den graagrøn. Denne forekommer mere i Løvskovene og ved enkeltstaaende Træer paa Marken end den foregaaende og er især almindelig i Aspekskov. Hos os er den almindelig i Dalene til langt mod Norden. Den flyver hurtigt i lange Buer. Om Høsten freiser den familiebtiis omkring og forekommer da ogsaa i Haverne. Af Almuen bruges den som Middel mod Gnuksot og er i stor Anseelse som Veirprofet, da man vil paastaae, at den skal spaae Veiret indtil tre Døgn i Forveien. Har den en lav eenstonig Lyd, bliver det smukt Veir; skriger den stærkt, kommer der Regn og Uveir; kommer den ind til Husene og skriger, bliver det endda værre. Ved Romernes Auspicier havde Grønspæt-

ten den første Rang. Kjødet af de Unge er spiseligt og smager som Kyllingsteg. Denne Fugl gjør undertiden Skade ved at ødelægge Birkuberne.

Flagspætten.
(Pic. major).



Er sort og hvid broget; Ryggen og Overgumpen sorte; en stor hvid Plet paa hver Skulder. Hovedet er øventil sort, Nakken hos Hannen karmosinrød. Brystet og Maven hvidagtige, uplettede. Længden 10 Tommer. Den skal her i Landet være den almindeligste af hele Slægten og forekommer i alle gamle saavel Løv- som Naalefjove. For at aabne Nodder eller plukke Frøet ud af Kongler, sætter den dem fast i en Sprække i et Træ.

Foruden de anførte findes hos os den lille Grønspæt (P. canus), hvidrygget Haffespæt (P. leuconotus), den lille Haffespæt (P. minor) og tretaact Spæt (P. tri-dactylus).

Vendehalsen.
(Jynx Torquilla).



Sos denne Slægt er Næbbet noget Kortere end Sovedet, ret, trindt, spidst, nedtrykt ved Roden, sammentrykt udad. Tungen er lang, spids og flæbrig, men mangler Agnorer. De herhen hørende Fugle ligne Spætterne, men have en tilrundet Hale med bløde Fjære. De flattere ikke saameget og søge fordetmeste sin Føde paa Jorden. Den hos os forekommende Art er Træffugl.

Vendehalsen er oventil graa med sorte, hvide og rustfarvede Streger og Punkter; under er den rustgullagtig med sorte Tværlinier og trekantede Smaapletter. Længden er 7 Tommer. Europa og Asien er dens Hjem. Paa det sidste Sted skal den findes ligesaa Kamtschatka til Persien og Indien. Til Christianiaegnen kommer den i Slutningen af April eller Begyndelsen af Mai og er der meget almindelig. Under Parringstiden lader Hannen ofte høre sit gjennemtrængende Strig: gi, gi, gi! Denne Fugl har en besynderlig Vane, som har givet den det latinske Navn Torquilla. Den bestaaer deri at Fuglen forlænger Halsen, vender Hovedet om, saa at det kommer til at ligge bag paa Ryggen og vender ud og ind paa Pinene. De lange Fjære paa Hovedet kan Fuglen reise som en Top.

Gjægen.

(*Cuculus canorus*).



Denne Slægt (*Cuculus*) har et Næb, der er fortere end Zovedet, udad er det sammentrykt, noget nedbøiet og har buesformig Ryg. Tungen er kort, glat og uden Agnorer. Benene ere korte; Bagtaerne aldeles adskilte; den yderste en Vendetaa. Gjægene leve adspredte i Skovene samt ere meget vilde og flye. Deres Flugt er hurtig og let, de klatre ikke, men hoppe mellem Grenene, og leve af Larver og Insekter. Hos dem finder man en egen Markværbighed, nemlig den, at de aldrig selv bygge Rede eller udklække Unger. Gjægen har gule Been; Brystet og Maven ere hvidagtige med sorte Bølgelinier. Halen fortagtig med hvid Spids og hvide Pletter. Gjægen forekommer næsten overalt i Europa og i Asien. I Skandinavien træffes den i alle de Egne, hvor der vorer Skov og Buske. Til Christianiaegnen kommer den mod Midten af Mai og hannen tilkjendegiver snart Ankomsten ved sin bekendte Sang eller Galen. De Gamle forlade os i Slutningen af Juli, de Unge først i Begyndelsen af September. Hunnen lægger sine Æg i fremmede Smaafugles Reder og overlader Om sorgen for at udklække Æggene og opføde Ungerne til Eierne af disse Reder. Den lægger

ialmindelighed et Æg i hvert Rede. Man har gjort sig megen Umage for at udfinde Grunden til at Gjøgen lader sine Æg udbruge af andre Fugle og man har antaget at det er den, at Fuglen i 6 til 8 Uger kun lægger 4 til 6 Æg, altsaa er der et Mellemrum af otte Dage eller derover mellem hvert Æg; det første vilde saaledes være raaddent naar det sidste blev lagt. Blandt de Fugle, der overtage Udbrugs- og Opfostringsomsorgen for Gjøgen, kunne anføres Erlen, Buftkvættten, Sangerne o. fl. Undertiden formaae ikke to at tilfredsstille Gjøgungens umættelige Hunger, og de faae da undertiden Hjælp af andre Smaaafugle. Føsterforældrene vise den samme Omsorg og Omhed, som om den var deres egen Afkom; ja de lade sine egne Unger tilintetgjøres, de udmadre sig selv, og døe undertiden af Anstrængelse og Hunger, for at kunne opfoede en fremmed Uнге, der er langt større og glubkere end de begge ere tilsammen. Denne sidste Omstændighed har sikkert givet Anledning til den feilagtige Tro, at Gjøgen skal dræbe og opæde sin Føstermoder. Man har ogsaa troet, at Gjøgen ud paa Høsten skulde blive forvandlet til Høg. Anledningen hertil er formodentlig den tilsyneladende Lighed, den paa nogen Afstand har med Spurvehøgen. Men med sit svage Næb og sine svage Fødder kan Gjøgen ingenlunde være Rovfugl og forvandles kan den ligesaa lidt som nogen anden Fugl. Gjøgen fordøier hurtigt og øder meget; dens Mave er stor og indvendig besat med regelræssige Rader af Haar, der skulle hidrøre fra de haarede Insektlarver, som den fortærer, og hvis Haar gaae løs og sætte sig fast i Maven.

(Loppeæderen.

(Crotophaga).

Loppeæderne fjendes let paa deres tykke, sammentrykte, høiede Næb, der mangler Takker; oventil er der hvælvet og forsynet med en skarp Kant



Roppeæderen.

Man kjender to Arter af dem; der begge findes i de fugtige varme Egne i Sydamerika. De have sorte Hjæere, høie og stærke Fødder og lang tilrundet Hale. De bygge sammensatte Næder, der benyttes af flere Hunner, som ogsaa i Fællesskab made de udklækkede Unger. Disse Fugle sidde ofte tæt ved hverandre paa Grenene og lade sin fladrende Stemme høre, hvilken Indbyggerne sammenligne med Lyden af en kogende Gryde.

Tukanen.

(Ramphastos Toco).



Tukanen eller Peberfuglen udmærker sig ved sit overordentlig store Næb, der hos adskillige er

ligesaalangt som Kroppen; det bestaaer af en let, celler Substants, og er takket i Randen. De leve i Sydamerika i smaa Flokke, og ere af rovgjærrig Natur; forøvrigt ere de altædende og fæste Byttet i Veiret og gribe det med Næbbet. Naar de hvile, hænger Næbbet ned paa Brystet, sove de, ligger det tilbage paa Ryggen. De opsoge og æde andre Fugles Æg og Unger. Den store Tukan (R. Toco) er to Fod lang, hvoraf Næbbet og Halen udgjør Halvdelen. Struben og Dvergumpen ere hvide, Undergumpen blodrød. Næbbet er rødgult. I det østlige Sydamerika findes den i Mængde, og flyver der fra Skovene til Plantagerne, hvor mange skydes. Næbbet er aldeles uforholdsmæssigt, $2\frac{1}{2}$ Tomme høit og $\frac{1}{2}$ Tomme bredt; Næbroden er sort, tandet. De hæfte i Huller af Træerne. Skjønt de have Klattrefødder hoppe de meget flodset paa Træerne.

Arapappegøien.

(Psittacus Macao).

Pappegøierne (Psittacus) have et Fort, tykt, hvælvet Næb, hvis Overflæve er frummet nedover den budte Underflæve. Næbbet er ved Roden bedækket med en Vorthud, hvori Næseboerne ligge. Pappegøierne leve i store Flokke i de varme Lande, hvor de med megen Lethed klatter om paa Træerne, af hvis Frugter de nære sig, og i hvis hule Stammer de bygge Neder. Deres hele Bygning er indrettet til Klattren, og foruden Fødderne betjene de sig hertil ogsaa af Næbbet; paa Jorden bevæge de sig vanskeligere, da de udsparrede Tæer gjøre Gangen besværlig, og det store Hoved og korte Begeme ikke let kunne sættes i Rigevægt. De have vanskeligt for at flyve og kun en Art er Træfugl. Da deres Tunge er tyk, rund og fjødagtig, og deres temmelig sammensatte nedre Luftrørhoved er forsynet med flere eiendommelige Muffler, kunne de med Lethed efterligne den menneskelige Stemme og udtale adskillige Ord ganske



Arapappegøien.

tydeligt; forøvrigt have de ubehagelig og skrigen-
de Stemme. Næbbet eller Kjæberne bevæges hos disse Fugle
ved flere og stærkere Muskler, end hos Andre, og er der-
for ogsaa bevægeligere. Fødderne bruge de som Hænder,
idet de tage Foden med Kløerne og bringe den saaledes
til Næbbet. I Fangenskab røbe Pappegøierne megen
Klogskab og Lærenemhed; de lade sig let tæmme, men
ere temmelig lumskt og ondskabsfulde. De skulle kunne
opnaae en høj Levealder. Man pleier sammenligne dem
med Uerne. — Naar Uingerne komme til Verden ere de,
som alle Redeliggere, aldeles nøgne og Kroppen synes
kun ubetydelig i Sammenligning med det uhyre Hoved;
først efter to til tre Maanedes ere de fuldkommen beklæ-
rede. Man har høit Exempel paa, at de have forplantet
sig i Europa. Pappegøierne have pragtfulde og pra-
lende Farver: Grønt, Rødt, Blaåt og Guldt, Hvidt, Sort,
Lafurblaat; men sine Tegninger seer man ikke hos dem.
Efter Wagler findes der i Amerika 83 Arter, i Asien
43, i Australien 66 og i Afrika kun 10. Disse inddeles
i flere Slægter.

Aræerne have fjærløse, nøgne Kinder og en meget lang og spids Hale. De ere store Fugle, der have hjemme i Amerika. Herhen hører den ovenanførte (P. Macao), der er karmosinrød med asurblaa og grønne Binger og Hale. Med Halen er den $1\frac{1}{2}$ Alen lang. Den er en af de skønneste Pappegøier og har hjemme i hele det østlige Sydamerika. Ved Dronoco holdes disse Pappegøier af Indianerne som andet Fjærkræ paa Gaardene, hvorfra de ligesom Duerne flyve ud i Marken og Skovene for at søge sig Føde. De ere en Pryd for Urkroene, hvor de opholde sig og hvor de leve af visse Palme-frugter. Deres Strig har nogen Lighed med Ravnens. Azara fortæller et rørende Exempel paa denne Fugls Hengivenhed. En Miil fra Hovedstaden, i Paraguay, skød En en saadan Fugl og bandt den bag sig paa Hesten; dens Mage fulgte ham midt ind i Staden, og kastede sig, da han var kommen hjem, i Gaarden ned til den døde Fugl, længe sad den paa Muren og ved Siden af sin døde Kammerat, hvor den lod sig fange og blev siden tam i Huset.

Kakaduen.

(Ps. cristatus).



Kakaduerne udmærke sig ved en Fjærbusk paa Hovedet, som de kunne reise op og lægge ned. De findes i sumpige Egne af Nyholland og Ostindien og tæmmes meget let.

Den almindelige Kakadu (Ps. crist.) har ligesom de øvrige faaet Navn af sin Stemme. Den er 16 Tommer

lang og sneehvid, undertiden med et guult Anstrøg. Hjarbussen bliver 4—5 Tommer lang. Kakaduen lærer vel at pluddre noget, men lærer lettere Betydningen af Ord, som man siger til dem, og rette sig derefter; man kan afrette dem til paa Befaling at reise og nedlægge Hjarbussen og dermed hilse de Personer, som betegnes dem af deres Herre, for hvem de vise stor Hengivenhed. De ere mindre ubehjælpelige paa Jorden end de andre Pappegøier og hoppe bestandigt omkring.

Jaco.

(Ps. erithacus).



De egentlige Pappegøier, hvortil denne henhører, have hele Ansigtet beklædt med Hare og en kort stirkantet Hale.

Jaco eller den graae Pappegøie er aftegraa med rød Hale og hvidagtigt Ansigt. Den er saa stor som en Due, kommer fra Afrika og lærer let at tale. Den er derfor høit i Pris i Europa, hvor den holdes i Buur; den lever en heel Mennefsalder og hækker endogsaa i Fangerskab.

Fjerde Orden.

Hønsfuglene (Gallinæ).

Hønsfuglene ere undersættige, og kjødsfulde Fugle med libet Hoved, kort og tyk Hals og temmelig lave Been.

De have et kort eller middelmaadigt **Næb**. Overnæbbet er hvalvet og forsynet med skarpe udbagaaende Kanter. **Næseborene** ere fordetmeste bedækkede med en brustagtig Hud. **Benene** ere undersættige og lave, idetmindste hjærklædte til Anælebet. De tre Fortæere ere forenede ved Roden med en større eller mindre Hinde. **Vingerne** ere fordetmeste korte, afrundede, staalfornige, hos Duerne temmelig lange. **Halen** bestaaer af 12—18 Fjære. Alle Hønsfugle have en Kro, hvori de opbløde Næringsmidlerne, der fordetmeste bestaae af Kro og Korn, førend de gaae over i den stærke muskuløse Mave, mellem hvis Vægge Jøden knuses; for at lette Knusningen sluger de Gruus og Smaastene tilligemed Jødemidlerne. De fortære ogsaa Insekter, og disse udgjøre fornemmelig Ungernes Føde. De fleste leve i Polygami og udflække sine Unger paa Marken; disse komme saa udviklede ud af Egget, at de undertiden løbe affted med Stykker af Eggestallet paa Ryggen. De følge Moderen, der oftest viser dem Jøden. De bade sig i Sand, Muld eller Vand. De fleste fælde ei mere end een Gang om Aaret og ere lige Sommer og Vinter; nogle faa myte Baar og Høst, men fælde ogsaa Fjære hele Sommeren over. Disse flifte ogsaa Kløer. Med sine korte afrundede Vinger flyve de fordetmeste tungt, blot korte Strækninger og selv dette med Anstrængelse, tætte Vingeflag og Bulder. Derimod løbe de hurtigt. Vingerne ere altsaa kun libet udviklede, men Benene desto mere. Det modsatte gjælder om Duerne, der danne den sidste Slægt i denne Orden. Vi have af denne Orden faaet det meste tamme Hærkræ og den forsyner os

ogsaa med det meste og bedste Bildt. Man kan inddele den i tre Grupper: Egentlige Høns, Stov- og Mark- høns eller Stovfugle, og Duer.

De egentlige Høns

nedstamme næsten alle fra de varme Lande. De fleste have lange og stærkt udviklede Halefjære, især Hannerne. Herhen høre Hokko, Paafuglen, Kalkunen, Perlehønsene og Fasanerne.

Hokko.

(Crax Alector).



Hokkoerne ere store, til Sydamerika indskrænkede Hønsfugle med lang Hale, lange nøgne Fødder, uden Sporer, og kort Næb. Lustrøret gjør flere Bøininger førend det træder ind i Brystet. I Udseende have de nogen Lighed med Kalkunerne.

Den almindelige Hokko (C. Alect.) er sort med hvid Bug og gul Borchud. Den opholder sig i Biergegne, hvor den stiger op paa Træerne. Den er meget tam, og synes at nære Tillid til Mennesker, derfor kan man ogsaa let fange eller nedlægge flere, førend de øvrige

fjerne fig. De tæmmes ogsaa let og Sonini faae i Cayenne hele Storer løbe om i Gaderne, der ikke vidste den ringeste Frygt, men sorgløse gik ind i Husene og sprang op paa Bordene, for at faae Mad. Kjødet er meget velsmagende.

Paafuglen.

(*Pavo cristatus*).



Sos denne Slægt er Næbbet middelmaadigt, Fegleformigt, noget Froget og nøgent ved Roden. Hovedet er prydet med en Hjørkam. Halsen bestaaer af 18 Fjære. De øvre Saledæksfjære ere hos Hannen meget lange og brede og kunne opreises som en Vifte. De faa bekjendte Arter af denne Slægt leve i vild Tilstand i det østlige og sydlige Indien. En af disse Arter er det, der findes tamme i Europa.

Den tamme Paafugl er $3\frac{1}{2}$ Fod lang fra Spidsen af Næbbet til Enden af Halefærene. Hjørkammen er 2 Tommer høj og kan af Fuglen reises eller nedlægges efter Behag. Hovedet, Halsen og den øvre Deel af

Brystet er skønt indigoblaat med violet og guldgørn Glands. De øvre Halebæffjære ere dog Fuglens største Pryd, naar de opreises og udslaaes som en Bifte. De ere længre end Halen, og undertiden over to Alen lange, prydede med Speile eller Pine og de mest glimrende Farver. Hunnen er mindre og har kortere Halebæffjære uden Dienpletter; Kroppen er askegraa brun med nogle grønne Smaapletter paa Hovedet.

Hos den vilde Paafugl er Halsen mere guldgørn end blaa, og de skjælformige Fjære paa Ryggen ere grønnere; de mindre Bingedæffjære, der hos den tamme ere rustfarvede eller sorte, ere glindsende mørkgrønne med guldgørne Kanter; de store Dæffjære ere metalglindsende sortgrønne med brede purpurbronzefarvede Rande. De ti første Svingsfjære ere rustbrune; de øvrige glimrende bronzefarvede med grønne Kanter; de undre Dele ere sorte med guldgørn Glands. Halen er endnu pragtfuldere end hos den tamme Paafugl. Den vilde Paahøne adskiller sig fra den tamme ved sin af tæt besatte gyldengørne Fjære bestaaende Krone, ved den gyldengørne Hals og ved sin grønne Bug. Med Rette anseer man Paafuglen for en af de skønneste Fugle; og dens stolte Anstand synes ogsaa at antyde, at den selv er sig denne Skønhed bevidst. Med Omhu bærer den bestandig sin skønne Hale vandret, for ikke at tilsmudse den, og elsker derfor at opholde sig paa ophøjede Steder som Grene o. s. v. Over alle øvrige Høns fører den Herrevælde, og ingen af dem vover at æde, førend den har ædt sig mæt. I Varringstiden slaar Hannen Halebæffjæren ud som en Bifte. Hønen lægger 8—12, i sit Hjem 20 Æg, som man almindelig lader udklække af Kalkunhøns. Lader man Paahønen selv lede Ungerne, maa man forsyne dem paa et varmt Sted om Aftenen, da den som oftest flyver op og sætter sig uden at tage Ungerne med. Paafuglen tiltræk sig alt i de ældste Tider Menneskenes Opmærksomhed. Salomons Skibe hentede den fra Osfir; Alexander bragte den til Grækenland. Derfra kom den til Rom, hvor de fraadsende Romere først nøde den som

Steg ved deres Gjæstebude; men siden fortærede de blot Tungen og Hjernen. Læffermundene Vitellius og Helio- gabalus lode ofte servere med hele Fæde af ragsuserede Paafugletunger. Nu er Paafuglen udbredt over hele Europa, og findes endogsaa paa enkelte Steder her i Landet. I sit Hjem findes den vilde Paafugl i Mængde i Skovene, hvor den efterstræbes af Tigeren, som holder meget af dens Kjød. Paa Grund heraf er Paafugliag- ten, som i Indien ansees for en af de kosteligste Fønst- elser, forbunden med megen Fare.

Kalkunen.

(Meleagris Gallopavo).



Kalkunslægten har et kort, hvælvet Næb, der ved Roden er beklædt med en bar nedhængende Sudlap. Hovedet og Halsdelen af Halsen ere nøgne og besatte med tiødagtige Borter. Hannen har en Haar- duff paa den nederste Deel af Halsen, og Sporer paa Benene. Halen bestaaer af 12 til 18 Fjære, der kan op- reises og udbredes i en Cirkel. Den vilde Kalkun, hvor- fra den tamme nedstammer, er meget større end denne. Hannen er henved 4 Fod, Hønen 3. De forreste Binge-

fiære ere hos denne sortagtige med hvide Baand; Hale-
fiærene ere 18 ruffarvede, kantebe med Sort og forsynede
med et fort Baand ved Spidsen. Hannens Farve af-
værler fra sort til skinnende Kobberfarve. Hunnen og
Ungerne ere mørkgraae med ringe Metalglans. De
tamme variere, som alle Huusdyr, betydeligt i Farve.
Raskunens Hjem er Nordamerika, hvor den forekommer
til den 50de Breddegrad. Hos os forekommer den kun
tam. I England og Tydskland findes den i en Deel
Parker i halvforvildet Tilstand. Hannens latterlige Be-
vægelse og Udseende i Parringstiden og levede Brede
ere noksom bekjendte.

Perlehønen.

(Numida Meleagris).




Denne Slægt har nogen Lighed med Kasuaren.
Sovedet og den øverste Deel af Halsen er beklædt
med Kjødvorter. Paa Panden hænger en Kjød-
lap; de have undertiden en beenagtig Sjelm paa
Sovedet. Benene mangle Sporer. Salen er kort
og rettet nedad. Man kender fire Arter, der kun fin-
des i Afrika. De ere larmende, trættekære Fugle, der
leve i Polygami og i store Flokke.

Den almindelige Perlehøne har en afsegraa, med hyide Punkter bestrøet, Hjærtfladning. Hovedet og den nøgne Deel af Halsen ere graablaae; paa Isen har den en tegleformig Hjel. Fuglen har længe været kjendt i Europa. Graterne og Rømerne fik den fra Rubien. I størst Mængde synes den at forekomme i det sydlige og vestlige Afrika. I tam Tilstand findes den udbredt over en stor Deel af Europa. Den er sjelden i Norden. Den æder med de almindelige Høns, men er besværlig ved sit gjennemtrængende Skrig, og ligger i bestandig Strid med de øvrige Høns. Den er meget livlig og urolig samt flyver op i Træer og paa Tage. En eneste Høne kan Sommer og Høst lægge indtil 70 Æg, der ere langt mere velsmagende end almindelige Hønsæg. Kyllingernes Kjød er ligesaa velsmagende som Fasaner og Rappøns.

Fasanen.

(Phasianus pictus).

Fasanerne have et kort, stærkt og noget bøiet Næb. Rinderne ere fordetmeste nøgne. Fødderne ere forsynede med Sporer. Salehjærene ligge tagsteensformigt over hverandre. Fasanerne findes i det sydlige Asien paa Fastlandet og Verne. Guld- og Sølvfasanen samt den almindelige Fasan har man indført i Europa, hvor den sidste er forvildet. De opholde sig gjerne i bustrige Egne, der stode til Marker og Sumpe. De flyve meget ugrjerne og kun naar de sætte sig op om Aftenen eller ved en sig nærmende Fare, som de ikke kunne undløbe. Deres Gang er værdig og gracios, Halsen bære de lige ud eller noget opad. De ere temmelig flyve og ensfoldige, leve af Korn, Bær, Rødværter, Insekter og Frøer. Deres Kjød er bekjendt som det mest velsmagende af alle Høns.




Guldsafanen

er ilbrød med en hoi rød Hærbu, orangegul Halskrave med sorte Baand; Overdelen af Ryggen er grøn, Overgumpen gul;vingerne ere rustbrune og prydede med en skøn blaa Plet. Sunnen er graa og brunspettet. Denne Fugl holdes i Fasanerier mere til Pryd end Nytte og aflægger sjelden sin Frygtsomhed, hvis man ikke faaer den som ganske ung og bestandig lader den være i Nærheden af Mennesker. Den er uimodsigelig en af de skønneste Fugle. Dens Hjem er China. Efter Cuvier synes det, at den Beskrivelse, Plinius giver over Fuglen Fœnix, er udkastet efter Guldsafanen.

Solofasanen.

(Ph. Nycthemerus).

Den er hvid med fine sorte Streger paa hver Hæ. Bugen er sortviolet. Solofasanen er den stærkeste af sin Slægt og den, der lettest bliver tam. Dens Hjem er det nordlige China, hvorfra den næsten er udbredt i alle Egne af Europa og forplanter sig godt i Fasanerierne.




Solbfasanen.

Da dens Hjem er koldere end den almindelige Fasan, saa vilde den vistnok kunne udholde Vinteren under aaben Himmel i det sydlige Europa. Hanen faaer i April 6 Høner, som, hvis man lader dem fri i 26 Dage, omhyggeligt ruge sine 8—18 Æg.

Den almindelige Fasan.

Hannen har paa Baghovedet to smaa Hjørbuste. Hoved og Hale ere mørkegrønne. Den øvrige Fjærklædning er guldglimsende rødguul. Denne Fugl skal ved Argonauterne være bragt fra Kolchis eller Mingrelien, fra Egnen om Floden Phasis til Grækenland, hvorfra den er udbredt over Europas varme og tempererede Egne, og holdes dels i Fasanerier, dels er den aldeles forvildet, hvilket fornemmelig er Tilfældet i flere Egne i Tydssland ved, Donau og Rhin. Vild findes den i



Den almindelige Fasan.

Mængde ved det kaspiske Hav, paa Kaukasus og undertiden i Kirgisersteppen. Den holder mest af at opholde sig i buskrige Egne ved Floder, paa Marker og Agre, og lever af Korn, Fro, Bær, Frugter, Orme og Insekter.

Guus- eller Kamhønsene
(Phasianus Gallus domesticus)



danne en Underafdeling af Fasanerne og udmærke sig ved en vertikal tandet Bjødkam; Undernæbbet

er desforuden paa begge Sider besat med Rjød-
lapper. Deres Haleskjære reise sig i to lodrette, hveran-
dre berørende Flader. Hancens Halebækskjære forlænge sig
bueformigt over de egentlige Haleskjære.

Af alle Fugle ere disse de meest udbredte; de fore-
komme nu næsten i alle Lande og blandt alle Folkeslag
og de synes at være blevne udbredte med de asiatiske Fol-
kestammer, der udbandrede fra deres Hjem. I Norge
findes de overalt, selv ved Hielsgaardene.

Vore almindelige Høns variere uendeligt i Størrelse
og Farve. Nogle ere iffe større end en Due, andre op-
naae derimod en betydelig Størrelse. Nogle Varieteter
udmærke sig ved Hjørneste, og atter andre have gien-
nem flere Generationer fem, ja sex Tæer. Temminck
anseer Bankivahønsene, der leve vilde i Stovene paa
Sumatra og Java, for Stamarten til vore tamme Høns;
Bankivahanen har en tandet Kam og gylbenrøde Hals-
kjære. Huus- eller Kamhønsenes oprindelige Fædreland
er Sundæerne og kun een Art lever vild paa Indiens
Festland. Deres Tæmning taber sig i den hærneste Old-
tid og Udbredningen kan kun have gaaet for sig ved
Mennesker, da Fuglen selv formedelsk sine korte Vinger
er Standfugl. Som bekiendt leve de i Polygami og
Hanen bevogter Hønsene med Argussine. Den fører og
leder dem, lokker dem, naar den har fundet Føde og æder
sjellden førend Hønsene have begyndt at æde; den adba-
rer dem for Farer, men straffer dem ogsaa, eller tilfjen-
degiver dem sin Uvillie i det den farer omkring dem med
Vingerne slæbende paa Jorden. Hønen lægger mange
Æg, som ruges i 21 Dage ved en Varme af 32° R.
Alt i de ældste Tider har man prøvet at udklække Æg-
gene ved kunstig Varme og det er fornemmelig i China
og Egypten dette er bryet. Forhen skal der i Egypten
være udklækket 100 Millioner Hønsæg om Aaret, men
nu kun 30 Millioner. Klækningen gaaer for sig i egne
Dyde, og Egypterne vidste ved Dvælske at vedligeholde
en jævn Varme, uden Thermometer. Hanernes Kamp-
lyst har givet Anledning til Hanekampene, der, udgaaende

fra Indien, hos nogle Nationer vække lidenskabelig Deeltagelse. De skulle dog nu være i Aftagende blandt dannede Nationer. I England giver man Kamphanerne Staalsporcer paa Tarserne, i China Lancetter og Kampen er saaledes paa Liv og Død.)

Skovhønsene

udgjøre vort væsentligste Fuglevildt; de leve af Træernes Knopper, Blade, Bær og haarde Frugter; de fleste have en nøgen Plet under Vingen. De findes især i de tempererede og kolde Lande. Heberne bygge de paa Jorden; de flyve fordetmeste lavt og kort med en roende Flugt og gjøre temmelig megen Larm under Flugten. Til denne Gruppe høre Marfuglene, Kyperne, Bagtelen og Agerhønsene.

Viuren.

(Tetrao Urogallus).



Marfugleslægten har et kort tykt, og ovenil hvælvet Næb, højrøde med høie Vorter tæt besatte Vienbryn. Tarserne ere enten aldeles, eller

idetmindste til ned over Midten stærklødte. Salen bestaaer af 16—18 Fjære. De herhen hørende Fugle ere vilde og fye; de opholde sig fordetmeste i store og tætte Skove; de fleste leve i Polygami og Kjønnene søge hyerandre kun i Parringstiden. Ungerne følge Moderen lige til den følgende Vaar, og de leve saaledes familie- eller flokkeviis. Kjønnene ere forskjellige i Farve, Hannerne ere størst. Narfuglene gjøre, ligesom Egernet og Lemænnen, til ubestemte Tider Udvandringer i Masse.

Tiurens Farver ere stærklødte ligetil Tærne, Salen er afrundet. Hannen er sortvattret; paa Halsen har den askeblaa, paa Vingerne rødbrun Grundfarve. Hønen, der kaldes Røi, er spraglet af Sort, Rustgult og Hvidt. Tiuren bliver indtil $3\frac{1}{2}$ Fod lang, med Vingebredde af 4 Fod og 3—4 Tommer. Her, i det sydlige Norge, faaer man Tiurer, der veie 20—26 Mark. Røien veier omtrent det Halve af den anførte Vægt. Tiuren er for Nordeuropas og Asiens Skove, hvad den vilde Kalkun er for de nordamerikanske. Foruden de anførte Steder findes Tiuren i bjergige Skovegne i Ungarn, Tydskland og Schweiz; i Frankrig er den sjelden; i Italien, Holland og det brittiske Rige er den bleven udryddet, en Skjæbne som den for en Deel ogsaa gaaer i Nøde i Skandinavien, hvis ikke vor, som andre Landes Regjering, vil søge at frede denne nyttige Fugl i Forplantningstiden; thi fra alle Egne hører man Beretninger om, at den, formedelst ufornuftig Jægst, aftager Nar for Nar, og paa flere Steder er den endogsaa allerede aldeles forsvunden. Tiuren opholder sig i dybe Naalestove, hvor den om Sommeren tilbringer Dagen paa Marken og Natten i Trærnes Kroner. Seenhøstes flokker den sig og gjør Udflugter til Løvskovene. Tiuren er fly, men tung og ubekvem; dog løber den hurtigt. Den er stærk og arrig; og anstiller under Legtiden blodige Slagsmaal med sine Lige. Provsten Ekstrøm fortæller endogsaa et Exempel paa, at tvende Tiurer var i en saa ivrig Kamp paa et Fladbjerg i Skoven, at de bleve grebne af tvende Dreng, der fulde hugge Ved. Naar Tiuren opfødes fra Unge af,

bliver den undertiden i Fangenskab tain, men aldrig saa spag og hengiven som Marfuglen. Sjælten taber den aldeles sin arrige Natur, men løber ligesom Raskunen efter Folt for at hugge dem. Selv i vild Tilstand glemmer den undertiden sin medfødte Skyhed, bliver folkevond og angriber de Menneffer, der nærme sig dens Opholdssted. Exempler herpaa fortælles fra Sverrige og Tydskland, hos Nilsson, Ekström og Brehm, og fra Adalsen, Anner til Norderhaug, kjender jeg et lignende. Røien er spagere og mere fredelig. Tiuren holder tidlig om Vaaren, medens Sneen endnu ligger i Skovene, men efterat der er bleven blidere Veir, Leg eller Spil i Nærheden af Moser eller Søer, hvor der findes grov Skov og Fladbjerge. Legen bestaaer i at Fuglen under gravitetiske Bevægelser, der have nogen Lighed med Raskunens, spiller eller lader høre forskjellige eiendommelige Lyd, slaaes med sine Kammerater eller Rivaler og samler flere Røier omkring sig, med hvilke den parrer sig paa Jorden og gjør derunder ofte mands høie Hov. Tiuren begynder sit Spil med Røepningen: pelley-pelley-pelley, efterat den har fremstrakt Halsen, sænketvingerne og udbredt Halen. Derpaa gjør den et stærkere Slag, Klunk: Klunktop, hvorpaa umiddelbart følger Skjærpingen: hebe hebe hebe hebe, der bestaaer af flere efter hinanden følgende hvæsende Toner. Under disse er den skoldov, trækker Blindhinden frem og tilbage over Dinene og synes at være i den høieste Extase. Da er det dens Liv er i størst Fare for Krybskytten, der for hver Skjærping springer nogle Skridt og saaledes nærmer sig den aldeles ubemærket. Spillet er imidlertid lavt og høres selv ved stille Veir neppe længre end 3—400 Skridt bort, og det er denne Omstændighed, der i Forening med Røiens Marvaagenhed, giver noget Haab om at Tiuren maaske for længre Tid i vore store og øde Skove kan undgaae den Skjæbne, der, som ovenanført, har rammet den paa flere andre Steder, aldeles at ødelægges. Efter fuldendt Parring lægger Røien fra 6 til 15 Æg paa Marken.

Aarfuglen.
(Tetrao Tetrix).



Halen er fløvet. Hannen er sort med blaa Glans og har en dobbelt hvid Streg over Vingerne. Halens og Vingernes undre Dækkfjære ere hvide. Hønen er spraglet med rustgule og sorte Tværstreger. Aarhanen er 21—22 Tommer lang. Aarhønen er meget mindre. Aarfuglen findes i det nordlige Europas og Asiens Skove. Hos os findes den næsten i alle Skove og er langt almindeligere end Tiuren, især paa saadanne Steder, hvor der findes Overflod af Birk. Den opholder sig gjerne i Kantene af Skovene, i Havnegange, Lunde og Buskadser, der stode til Græsgange og beboede Steder. Den opholder sig ogsaa paa Lyngheider, hvilket fornemmelig er Tilfældet i Jylland. Aarfuglen er vild, sky og listig; den har et skarpt Syn, fin Lugt og Hørelse og overgaaer i disse Egenskaber alle andre Hønsfugle. Skøndt buldrende er dens Flugt ei saa tung som Tiurens eller Hjerpens. Ofte seer man den flyve baade høit og hurtigt. Om Vinteren samler den sig undertiden med sine Lige i større eller mindre Flokke, som streife om i Skovene. Undertiden lader den sig nedsnee, og nedgraver sig i Sneen. Den skal altid tilbringe Natten paa Marken. Aarfuglen lever af Birkesney og Frø, spæde Blade, Bær, som Blaabær, Tytebær, Enerbær, samt af Insekter og

Larver. Tidlig om Vaaren begynder Narhanen sit Spil, almindelig i Midten af Marts, og fortsætter det til Midten af Mai. I Lapland og paa enkelte Steder her i Landet, hvor den findes i Mængde, samler den sig under Legtiden i et Antal af 40—100 Stykker og undertiden derover, paa en slet Mose eller paa noget andet slet Sted i Skoven; ogsaa paa tilfrosne Kjørn og Søer pleie de at lege. De indfinde sig i Egnen om Aftenen; i den første Dæmring slaae de næsten paa eengang ned paa Legen, hvor de strax begynde at blæse, hoppe om hverandre, slaae Bingerne ned paa Benene, samt opreise og udbrede Halen. Undertiden buldre de ogsaa og lade, naar de blive vrede eller mærke nogen Fare, høre en egen knurrende Lyd, som kan udtrykkes med krotetekarre. Træffes to Haner, bliver der strax Slagsmaal, hvorved de om trent forholde sig som Huushanerne. Der indfinde sig ogsaa Høner paa Legen, som løbe omkring med langt udtrukne ynkelige Ræsetoner. Undertiden indfinder der sig ogsaa Røier og Liryper. I Solopgangen slaae de paa Toppen. Efter Kl. 5—6 om Morgenen er Legen forbi. Narhanerne flyve da bort fra Legen, hver til sin Kant, og hver ledsaget af sine Høner. Parringen gaaer enten for sig tidlig om Morgenen i Skovkanten ved Legstedet eller ogsaa mellem tætte Buske efter endt Spil. Naar Narhønerne ere befrugtede, sjerne de sig fra Legen og sprede sig enkelte i tætte Buskader o. s. v., hvor de lægge 8—12 Æg, som udbruges i 3 Uger. Saavel Narfuglen som Tiuren jages og skydes paa mange forskellige Maader: for Rødhønsbund, for Støver eller saakaldt Fuglehund, paa Leg eller Spil om Vaaren, ved Lofning, for Blus, med Risse seenhøstes; de fanges i Snarer, Stofte og Ræt. Eiendommelige Fange- og Skydnings-

*) Det er ingen Sjældenhed tidligt om Vaarmorgenene at høre Narfuglen spille ved Christiania, naar man staar paa Ugersbunds eller Toienhaven; udoer mod Frogneraasen, Greffensaaen og Ryebergene hører man den da stedse i godt Veir.

metoder for Aarfuglen er Jangsten i Buur og med Aartene, samt Skydningen for Bulvan. Disse sidste ere imidlertid ikke bekendte her i Landet, og bør heller ikke blive det, da de, som de fordeelagtigste af alle Jangmaader, i ufornuftige og egennyttige Hænder ville forarsage større Ødelæggelse blandt Vildtet end der allerede finder Sted. I høi Grad usforsvarlig, grusom og ødelæggende er Skydningen og Jangsten i Stok og Snarer paa Legene om Vaaren, samt Lokningen i Sommertiden. Tusinder af unge Fugle omkomme derved til Jagens Nytte eller blive et Bytte for allehaande Rovdyr.

Ambitiuren.

(*Tetrao hybridus*, *Urogalloides*).

Man antager ialmindelighed, at denne er en Bastard af Roien og Aarhanen, hvorfor den ogsaa i Smaalenene kaldes Halvstok, men da den oftest træffes blandt Aarfugltudene er det, som Falk anfører, sandsynligt at den ogsaa fremkommer ved Tiurens Parring med Aarhønen. Dens Hale er fløvet men har kun lidet udadbøiede eller rette Stedsejære; Tarsen er $2\frac{1}{4}$ Tomme, medens den hos Aarhanen kun er $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ Tomme. Hannen er sort eller sortagtig med fløn Purpurglands. Over Armhulen er en hvid Plet; de underste Haledekkjære ere hvide. Længden er 2 Fod og 3 Tommer. Hunnen er spraglet, med sorte og rustgule Tværbaand; Brystet er mørkere, rustbrunt. Den er 1 Fod og 9 Tommer lang.

Rypeaarren.

(*Tetrao*, *hybridus*, *Lagopoides*).

Denne besynderlige Fugl, som man uden nærmere Undersøgelse, naar man seer den udstoppet, kunde troe var sammensat af en Rype og en Aarfugl, forekommer meget sjelden og kun i saadanne Egne, hvor der opholder

fig baade Marsfugle og Vrypper. Den er saavidt man veed, kun skudt 6 Gange i Sverrige og Norge og er et Produkt af Rypernes Besøg paa Marsfugllege. Den har fløvet fort Hale; Fodderne ere aldeles fjærklædte, hybe; Tærne ere blot paa den ydre Halvdeel tandede og beslagte med Ringe. Tarserne ere $1\frac{1}{2}$ Tomme.

Hjærpen.

(Tetrao Bonasia).



Hjærene paa Isfen ere forlængede. Naar undtages de to mellemste, have Halefjærene et bredt fort Baand foran den graa Spids. Tarserne ere blot fjærklædte lidt nedenfor Midten; den øvrige Deel og Tærne ere nøgne. Struben er hos Hannen fort, hos Hunnen rustguul. Hannen er $14-14\frac{1}{2}$ Tomme lang. Hunnen $1-1\frac{1}{2}$ Tomme kortere. Hjærpen findes i de fleste tætte Bjergskove i Europa, men er især talrig i de nordlige Egne af den skandinaviske Halvø. Dog gaaer den hverken saa høit mod Norden eller saa høit op i Fjeldhæerne som Marsfuglen og Tiuren. Man savner den allerede længe førend man naaer Granens Bærggrændse. Dens Flugt er meget buldrende, og den flyver albrig langt ad Gangen. Hjærpen lever i Monogami. Dens Parringsstid indtræffer samtidig med Tiurens og Marsfug-

lens. De løffe da hverandre med en egen sørgelig sløtende Tone, der kan efterlignes med en Hjerpepibe af Been, Metal eller en Grantvift. Om Høsten kalder Hunnen Ungerne med den samme Lyd. I Rugningstiden holder Hannen sig ene. Hunnen lægger 10—12 Æg i en Hule i Moser. Naar Ungerne ere flyveborne slaar Hannen sig igjen sammen med dem og hele Familien træffes da sammen under Høsten og Vinteren. Den Egn, de engang have taget til Opholdssted, forlade de sjælden. Man finder aldrig at flere Kulb forene sig til een Flok. Mod Vaaren adskille de sig igjen parviis og Legen begynder. Man fanger Hjørpen i Stok og Snarer, skyder den med Kugle og Daggel og løtter den om Vaaren og i September. Den er ikke synderlig fly og ei engang bange for Skud. Den største Vanskelighed ved Jagten efter den, bestaaer for den Uøvede i at opdage dem i Trækronerne. Træffer man flere i et Træ kan man let skyde dem alle, naar man blot begynder med den nederste. Hjerpefleg ansees for det lækkreste, sundeste og fineste af alt Vildt, men den er dog tørrere end Vekasinfleg.

Hjørpen.

(Lagopus subalpina).



Rypeflægten, Snehønsene eller Fjeldfuglene have et kort, tykt, oventil hvælvet Næb, Gienbry-

nene nøgne, røde, næsten glatte, men oventil forsynet med en tandet Kam. Tarser og Tærne ere om Vinteren tæt bedækkede med fjær. Om Sommeren ere Tærne mere eller mindre blottede og belagte med smaa rundagtige Skæl uden Kamtænder. Kløverne ere om Sommeren halvtrinde om Vinteren lange, brede, udbulede, skarptandede; Halen bestaaer af 16 Fjære, af hvilke de 14 altid ere sorte, de to mellemste, som ligge over de øvrige, hvide eller spraglede. Ryperne opholde sig paa høie skovløse Fjelde eller i Nærheden af dem blandt Buske og Smaaskov; sjældnen forekomme de i tætte Skove. De leve i Monogami. Om Høsten, naar Ungerne ere udklækkede, slaae flere Familier sig sammen og sværme om under Vintertiden i store Skarer. De sætte sig sjældnen i Træer. Deres Føde bestaaer af Blade, Bær og Frø samt Urter og Græs. De fælde to eller flere Gange om Aaret og forandre derved Farve; Vinterdragten er meget forskjellig fra Sommerdragten. De stifte aarlig Kløer, om Høsten og rimeligviis ogsaa om Vaaren.

Lirypen har en Tarse, der er $1\frac{1}{2}$ Tomme lang; den femte Vingefjær er længre end den anden; Næbbet er tykt hvælvet; Overnæbbet nedtrykt mod Spidsen. Vinterdragten er snehvid med sort Næb og 14 sorte Halefjære. Sommerdragten Hovedet og Halsen rødbrune hos Hannen eller rustgule hos Hunnen med sorte Pletter; Ryggen er sort og spraglet med rødbrunt eller rustgult. Hannen er $15\frac{1}{2}$ —16 Tommer lang; Hunnen er en halv Tomme kortere. Den findes paa de tydste og schweiziske Alper, Pyrenæerne, i Rusland, Sibirien og i den subalpiske Region paa de skandinaviske Fjelde. Enkelte Par klæffe paa Krogskoven, Hadelandsaasen og Streibjergene ved Njosen. Rypernes Flugt er buldrende, og Hannen lader, naar den flyver op, høre en taglende, næsten leende lyd: errakakakak. Den flyver ei langt, og naar den har kastet sig igjen, raaber den fordetmeste kawaii, kawaii. Efterat Ungerne ere udklækkede, træffes hele Familien sammen og om Vinteren samle sig flere Familier til store Flokke. Stærk Frost og dyb Sne drive dem under;

tiden ned i de lavere Egne, og de vise sig da ogsaa, skønt sjælden, i Christianiabalen. I den sidste Halvdeel af Mai indfader Hypernes Vegetid. Dmtrent Kl. 1 om Natten begynder Hannen at rare, d. e. at lade høre sit høitlydende prrr, pakk, prr og sit lavere kawai, kawai. Hunnen svarer med et lavere njau, njau og disse Lyd afverle ofte, hvorunder Kjønnene nærme sig hverandre. Hvis man paa denne Tid efterligner Hunnens Lyd, faaer man snart Svar af Hannen, og skjuler man sig da bag en Buske, kommer den snart løbende og flyvende i Skudbold. Den standser iblandt, reiser Halen op som en udspredd Biste, slaaer Vingen ned paa Venet, slaaer Raffen tilbage og raaber: kawai, kawai! Undertiden har den Hunnen med sig. Naar Parringen er forbi lægger Hunnen i et konflikt Nede 10 til 12, undertiden flere Egg under en Bidiebuske. Hannen opholder sig i Nærheden og søger at forsvare den rugende Mage mod Rovdyr og Rovfugle, som nærme sig. Nilsen fortæller, at han har seet den ved Strig og Rist lokke selv Røven bort derfra. Naar Ungerne opskræmmes strige de næsten som Hønskyllinger og sprede sig næsten til alle Kanter. Der hvor de kaste sig igjen, trykke de sig haardt blandt Græsset eller Mosen, og har man lagt Mærke til Stedet, kan man let tage dem levende med bare Hænder. Hyperne leve fornemmelig af Blade, Knopper og Frø af forskellige Hjeldplanter, fornemmelig af Dværgbirken og den almindelige Birk. Om Sommeren stydes sjelden Hyper. De stydes kun paa Leg om Vaaren og om Vinteren paa Sneen, naar de have flokket sig. Med Snarer fanges en utrolig Mængde i Hjeldbygderne. En Mand udsætter ofte 500—1000, ja endnu flere Snarer. De stude eller fangne Hyper forvares paa et koldt Sted, til der indfinder sig en Fuglehandler, og naar denne har samlet et tilstrækkeligt Antal, hvilket i de nordlige Egne undertiden beløber sig til 40 til 50,000 Stykker, affætter han disse saavel i de nordligere som sydligere Stæder i de skandinaviske Riger. I Christiania sælges og opspises hver Vin-

ter en umaadelig Mængde Kyper; og selv til Lund, Malmö og Kjøbenhavn transporteres de undertiden.

Fjeldrypen.

(*Lagopus alpina*).

Larsen er $1\frac{1}{4}$ Tomme; den anden Vingeffær længre end den femte; Næbbet er mindre tykt og Dvernnæbbet sammentrykt mod Spidsen. Vinterdragten er hvid; Hannen har sorte Tøiler. Sommerdragten: hos Hannen ere Hoved, Hals, Ryg og Dverbryst sorte, mere eller mindre plettede med hvidt og fint spraglede med Rustgraat. Hunnen er tegnet med sorte Pletter og blegt rustgule Bølgestreger. Søstdragten er blaagraa, fint vatret med Sort. Fjeldrypen opholder sig i Skandinavien paa alle egentlige Fjelde eller saadanne Bjerge, der stige op over Trægrænsen, i den alpine Region. Den beboer saaledes om Sommeren Fjeldene derfra, hvor Birken ophører til deres med Sne, Stene eller Gruus beklædte Top. I Begyndelsen af Juni, da deres Vegetid indtræffer, finder man dem om Dagen parvis paa og mellem Sneedrivene. Tidlig om Morgen begynder Hannen at lade høre sin knurrende Stemme, som man har sammenlignet med et snorkende Mennekes. Hunnen svarer deri med et fint pibende tiak, tiak. Hannen flyver da for at opsoge den. Naar Jægeren skuler sig bag en Steen og efterligner Hunnens Stemme, lader den sig let lokke og kommer flyvende lige til den Plet, hvor den hører Lokningen; ja den slaar ogsaa undertiden ned paa Ryggen af Skytten. Efter Parringen tilbereder Hunnen sit kunstløse Nede i Videregionens øverste Grænse og lægger deri 10—12 Æg. Hannen træffes steds i Nærheden under Rugningen; men saasnart Ungerne ere udklækkede forlader Hannen dem og begiver sig høiere op paa Fjeldene, hvor den i Forening med andre sine Lige streifer om i Skarer paa 30—50 Stykker. I August flytter Moderen efter med Ungerne. Saaledes streife de

om familievis hele Høsten; men ved indtræffende Sne og Kulde slaar de sig sammen i store Flokke, og begive sig ved heftig Sneefog og meget streng Kulde ned fra Fjeldene paa de lavere Aase og undertiden ned mod Bygderne. Fjeldrypen flyver ofte høit og meget hurtigt, hvilket man let mærker, naar den forfølges af Jagtfalken; thi skønt denne er den hurtigste af alle Fugle, har den undertiden vanskeligt nok for at gribe den. Saa vel Fjeldrypen som Falken søge da at vinde Høiden og begge forsvinde snart i Skyerne. Den fanges og stydes paa samme Maade som Føregaaende; men dens Kjøb er ei saa godt som Virrypens.

Raphonen.

(*Perdix cinerea*).



Sos denne Slægt er Næbbet ved Roden forsynet med Næbbhud. Gienbrynene ere stærklædte, men bagenfor Cinene ligger en nogen vortet Plet. Tærerne og Tærerne ere nøgne. Salen er kort, tilrundet, nedbøiet og bestaaer af 14—18 Fjære. De Fugle, der henhøre til denne Slægt, opholde sig paa Aare og Enge og sætte sig aldrig i Træer. Deres Føde bestaaer af forskellige Slags Sæd, Frø, Urter, spæde Blade, Orme og Insekter. De leve i Monogami og begge

Nagerne træffes sammen hele Aaret rundt. Hunnerne lægge et stort Antal Æg. De falde kun een Gang om Aaret. Om Vinteren leve de familie-eller flokkerviis; om Sommeren parviis.

Hos de almindelige Raphøns ere Panden, Dienbrynene, Siderne af Hovedet og Struben blegt rustrøde; Halsen og den forreste Deel af Brystet graae, vatrede; Skuldrene og Bingedækkerne have hvidgule langsgaaende Streger; Halsens Sideskjære ere brunnrøde. Raphønsene ere meget almindelige Fugle i alle Egne af det mildere Europa, Rusland og Sibirien. I Skandinavien ere de egentlig fremmede, der for 300 Aar siden skulle være indførte i det sydlige Sverige, hvorfra de have udbredt sig lige til Värmeland og Herjedalen og til Christianiaegnen, hvor de for nogle Aar siden være hyppige. Raphønsene ere Standsfugle, der om Vinteren søge Ly i Busske, i Hække og Skovkanter. I skovløse Egne blive de ofte et Noj for Hunger og Kulde. De ligge almindelig stille om Dagen; men ere i Bevægelse Morgen og Aften. Hunnen lægger i en Ager eller Eng i Mai 12—20 Æg, som den ruger i 3 Uger. Ungerne kunne løbe, saasnart de ere krøbne ud af Æget. Raphønen er den egentlige Agerhøne, og hvad man her i Landet pleier kalde saaleledes er Agerkrøen (*Gallinula Crex*). Raphønsene flydes for Hønskund om Høsten, fanges i Drivgarn, Ryse og paa flere Maader. Kjødet er fortrinligt.

(Vagtelen.)

(*Perd. Coturnix*).

Vagtelen har en blegguul Streg langs Issen og et lignende Baand over hvert Øie. Kroppen er ovenstil rustbrunn eller rustgraa med sorte Pletter og guulagtige langsgaaende Streger. Hos Hunnen er Kraaen og Brystet tegnet med talrige rundagtige, sorte Smaapletter. Vagtelen findes i det tempererede Asien, Europa, det nordlige Afrika og Ostindien. I Skandinavien forekommer den



Bagtelen.

i de sydlige Egne; enkeltviis i Christianiaegnen. Den er den eneste Træffugl blandt vore Hønsfugle; i September drager den bort og vender tilbage i Mai. Om Vinteren trækker den, uagtet sine korte Vinger, over Middelhavet til Afrika; dog skulle ogsaa mange omkomme paa dette forvovne Tog. Naar den træet af Reisen er kommen tilbage til Italien og de italienske Der, dræbes den i stor Mængde paa Strandene. Bagtelen er en munter urolig og fly Fugl, der flyver hurtigt, men kun korte Strækninger ad Gangen; fordetmeste søger den løbende at undgaae de Færer, der nærme sig den. Bagtelen lever i Monogami og lægger 8—12 Æg.

Duerne

(Columba)

have et kort, tyndt Næb, som ved Roden er blødt og i Spidsen noget bøiet. Ved Roden er det bedækket med en nøgen og opsvulmet Hud. Tarserne ere korte, Fortærerne adskildte og Bagtaen liggende i samme Plan. Vingerne ere temmelig lange. Duerne opholde sig fordetmeste blandt høie Træer eller bratte Klippevægge ved Stranden, hvor de bygge Nede. De lægge kun faa Æg, men flere Gange om Aaret. De leve af Bælgfrugter, Korn og Træfrugter, som de

udbløde i Kroen. Ungerne fødes nøgne, blive i Redet til de ere flyveborne og mades af begge Mager af Kroen. Duerne leve i Monogami, men flaae sig om Høsten sammen i store Flokke og stryge om paa Markerne. Hos Duerne ere Bingerne mere udviklede end Fjodderne; de flyve derfor godt, men løbe daarligt. To af de tre Arter, som findes hos os, ere Træffugle. Man kjender henved 100 forskiellige Arter af Duer.


Kronduen.

(*Columba coronata*).




Denne Due, der opnaaer en stor Hanes Størrelse, er skiferblaa. Gjennem Vinene gaaer en fort Streg over Bingerne en hvid. Paa Hovedet har den en fra Siden af sammentrykt stor Fjærbu. Denne skønne Fugls Hjemland er Molukkerne. Den kommer den undertiden til Java og derfra til Europa, fornemmelig til Holland, hvor man forgjæves har gjort sig megen Umage for at forplante den.

Ringduen.
(C. Palumbus).



Ringduen er blaagraa med en hvid Plet paa hver Side af Halsen, en hvid Kant langs Bingen og et hvidgraat bredt Baand under den lange Hale ovenfor dens sorte Spids. Ringduens Hjem er fornemmelig det tempererede Europa og Asien. Her forekommer den til nordenfor Dore. I Christianiaegnen er den hyppig og kommer dertil i April. Om Sommeren opholder den sig fornemmelig i Naalestovene og flaaer sig, naar Ungerne ere flyveborne, sammen i store Flokke, som gjore Besøg i de sydligere Løvstove og derfra indfinde sig paa de indbjergede Rug-, Hvede- og Erteagre. De indfinde sig ogsaa paa de tilsaade Rugagre og gjore megen Stade ved at opplukke de udsaade Korn. Paa de Agre, hvor en Flok har faaet Bane, indfinder den sig regelmæssig to Gange daglig, Kl. 8 om Morgen og omtrent Kl. 4 om Eftermiddagen. Foruden Korn o. s. v. fortære Ringduerne Furu- og Granfrø, Regnorme, Insekter, Bær og Bøgeolden. Den lægger 2 hvide, glindsende Æg. Det første Kulb lægges i Mai, det andet i Juli. Ungerne ere, flegte, meget møre og velsmagende.

Klippeduen.
(*C. livia*).



Den er blaagraa; Halsen med metalgrøn og Purpur-Glans. Den bagerste Deel af Ryggen er hvid; to sorte Baand over de sammenlagte Vinger.

Dens Hjem er Klippesøerne i Middelhavet og det vestlige Europa. I Norge findes den paa nogle Der ved Stavanger og klækker fornemmelig paa Rennesø. Den findes der i stor Mængde, flyver i Flokke og har sine Reder i utilgængelige Fjeldkløfter. Den er Standfugl. Den er ikke sky og kommer ofte lige frem til Husene. Fra denne vilde Art synes de fleste Artsforandringer af vore tamme Duer at nedstamme. Bechstein har opregnet og beskrevet iffe mindre end 136 Varieteter af tamme Duer; her ville vi kun nævne nogle af de almindeligste: Maanedsduen (*C. domestica*), Kropduen (*C. gutturosa*), Tummelsten (*C. gyratrix*), Slagduen (*C. Percussor*), Jakobiner eller Parykduen (*C. cucullata*) og Postduen (*C. tabellaria*).

Vandringsduen.
(*C. migratoria*).

Hovedet, Ryggen, Dækslerene og Øvergumpen ere askeblaae, Halsen guldgul. Struben og Brystet rødbrune



Vandringsduen.

og Bugen hvid. De mellemste Halesjære ere sorte, Kanterne hvide. Den er 16 Tommer lang. Denne Fugl er, paa Grund af den uhyre Skade, den tilføier Sæden, en af de allerstadeligste Fugle. Den findes i Nord- og Sydamerika paa denne Side Rockybjergene lige til Atlanterhavet og mod Nord til Hudsonsbugten. Den er udbredt over hele Canada, ved Missouris Jossesald, i Louisiana, ved den mexikanske Bugt. De ere saavel i Hækningsstiden som paa Vandringerne sammen i saa umaadelige Flokke, at intet lignende forekommer blandt alle Jordens bevingede Skarer. Sine Vandringer synes den at foretage mere formedelst Mangel paa Føde, end formedelst Kulden; thi ved Hudsonsbugten ligge de lige til December og samle Bøgeolben under Sneen. I visse Egne vise de sig ikke i flere Aar, og atter til andre Tider i utallig Mængde.

I Pensylvanien, Tennessee og Virginien sætte deres Tog i Forbauselse, og dog er det kun Streiftog i Sammenligning med de Millioner, som man træffer i de vestlige Stove ved Ohio, Kentucky og Indiana, hvor de finde sin Indlingsføde, Bøgeolben, i Mængde. Have de fortæret disse i en større Stovegn, saa flyve de hver Morgen

10—12 Mile hen til en anden Skov og vende om At-
tenen igjen tilbage til sit gamle Sovested. Saadanne
Pladse see frygteligt ud. Jorden er vidt og bredt flere
Tommer høit bedækket med Møg; alt Græs og al Un-
derstov er ødelagt; Overfladen er bedækket med store Grene,
der ere afbrudte ved Tyngden af de ovenpaa hverandre sid-
dende Fuglekumper; og Træerne selv paa over 1000
Morgen Land visne og fortorrede. I mange Aar voxer
der ikke et Straa paa saadanne Skuepladse for Ødelæg-
gelsen. De flyve med en overordentlig Hurtighed og til-
bagelægge uhyre Strækninger i kort Tid. I Newyork
skød man Vandbringsduer med ufordøiet Milt i Kroen;
denne voxer først i Georgien eller Carolina, og da den
fordøies i 12 Timer, saa maa de i sex Timer have fløiet
50 norske Mile, hvilket omtrent udgjør $\frac{1}{4}$ Mil i Minut-
tet. I et Par Dage kunne de gjøre Reisen til Europa,
og i 1826 skød man ogsaa virkelig en Vandbringsdue i
Skotland. I Høsten 1813 traf Audubon paa en Reise
fra Ohios Bredder til Louisville uhyre Skarer, der fløi
fra Nordost mod Sydvest; han forsøgte at tælle Flokkene
og saae i 21 Minutter 163 Flokke trække forbi. Jo læn-
gere han reiste desto flere saadanne Flokke saae han.
Luften var, bogstavelig talt, opfyldt dermed og Jorden
fordunkledes som ved en Solformørkelse. Møgen saldt
ned i saadan Mængde, at man kunde sammenligne det
med Sneefog og Larmen af Vingeflagene virkede ganske
bedøvende. Meget skønne vare deres Svingninger, naar
en Høg viste sig: de dannede pludselig en fast, solid
Masse, idet alle trængte sig mod Midten. Man saae
dem da snart flyve i Zirkel for Høgen, snart styrtet sig
tæt ned til Jorden med Lynets Hart, snart stige lodret
op i Høiden og beskrive Spirallinier. I tre Dage va-
rede Trækningen. Hele Befolkningen stod ligesom under
Gevær og beskjød fra alle Kanter Sværmene, der især
ved Bredderne af Ohio fløi meget lavt, og der blev ned-
dundet en utroelig Mængde. Man har tilnærmelsesviis
søgt at beregne Antallet af disse Duer og den Qvantitet
Føde, de daglig fortære; og man har for en Flok saaret

ud den umaadelige Sum af 1,116 Millioner Fugle, der daglig efter $\frac{1}{2}$ Vægl fortære en Masse af 557 Millioner Pund Fødemidler. Om Dagen flyve de undertiden meget lavt og forsvinde pludselig mellem Træerne, hvor de sætte sig paa Jorden og vende hvert Blad for at søge Bøgeolden. Den sidste Deel af Sværmen flyver stedse frem over de ædende og dette gaaer saa hurtigt, at man skulde troe at alt endnu var i Bevægelse. Paa denne Maade rensede de Jorden saa fuldkommen for Bøgeolden, at det ikke kan falde noget Menneske ind at søge den der, hvor Duerne have været. I Middagstiden hvile de paa Træerne, men mod Aftenen flyve de ofte 15-16 Mile bort til sine natlige Hvilesteder. Audubon besøgte oftere en af disse Samlingspladse. Det var en Skov af høistammede Træer ikke langt fra Bredderne af den grønne Flod i Kentucky. Dens Bredde var henved $\frac{1}{2}$ Mil og Længden 7 norske Mile. Da han besøgte den første Gang havde Duerne havt Nattelseir der i 14 Dage. Det var omtrent 2 Timer før Solnedgang og man saae endnu saa Duer, men en stor Mængde Mennesker, med Feste og Bogene, vel forsynede med Geværer og Ammunition, havde opslaaet sin Leir ved Skovkanten. To Jordegodsseiere fra Egnen ved Russellsville, omtrent 15 Mil borte, havde medbragt en Hjord af 300 Sviin, for at madske dem med Duekød. Hst og her sad Folk, der vare beskæftigede med Ribning og Nedfaldning, mellem umaadelige Hobe af disse Fugle, der afgave et foreløbigt Bevis paa, hvilkken Mængde af Vandringduer her maatte overnatte. Træerne og Skoven vare saa affumpede ved Bægten af de tallose Duer, at det saa ud som der skulde have raset den frygteligste Orkan. Imidlertid rustede alle Mand sig til Jagten: nogle havde Svovl i Jernkar, andre forsynede sig med Tyrfatler, mange med Stænger og de øvrige med ladede Skydegeværer. Allerede var Solen gaaet ned og endnu var ingen Due kommen, da det pludselig lød fra alle Kanter: „der komme de.“ Alt i det Hjerne lød det som en skarp Søvind, der farer gennem Taffelagen paa et Skib, der ligger med beslaaede Seil.

Da Duerne fløi over os, følte vi tydeligt en stærk Strømning i Luften. Med Stængerne vare snart Tusinder nedslagne; men Duerne kom steds i større og større Mængder. Ildene bleve antændte, og nu viste der sig et prægtigt og forunderligt Skuespil. De i millionvis ankommande Duer nedlode sig den ene efter den anden, til de dannede uhyre, som Biesværm, sammendyngede Mængder, der overalt hang paa Træerne. Tykke Grene brødes knagende af, og dræbte i Faldet Hundreder af lavere siddende Duer. Det Hele var isandhed en frygtelig Scene af Tummel og Forvirring. Ingen kunde høre den Andens Stemme og man mærkede kun at Geværerne vare affødte ved at de bleve ladede igjen. Knaldet mærkede man ikke. Ingen vovede sig ind i Skoven, hvor denne gruelige Forvirring fandt Sted; selv Svinene holdtes indspærrede. Det Nederlag, der af Menneskene anstilledes paa Duerne, indskrænkede sig saaledes kun til den yderste Rand af Skoven; men i det Indre bevirkede Mængden indbyrdes en saadan Udelæggelse, at Forstyrrelsen der ikke var mindre. Opsamlingen af de dræbte og saarede Duer opsatte man til den følgende Morgen. Man bemærkede ingen Aftagen paa de ankommande Starer førend efter Midnat, og hele Natten varede Larmen, der, som Audubon ved udsendte Folk underrettede sig om, hørtes i en Afstand af $1\frac{1}{2}$ Mill. Først mod Daggry indtraade der nogen Stilhed og Larmen aftog mærkelig; men en Stund efter begyndte Duerne at trække bort ad en ganske anden Kant, end de vare komne og ved Solens Dypgang var der ikke mere nogen Duer igjen, der kunde bruge sine Vinger. De Rovdyr, der havde gjort sig tilgode i Nattens Mørke, skulde sig nu, og Gribbe, Falke og Ørne indtog deres Sted, for at nyde Frugterne af denne Nat. Men alle Tilstedeværende beskæftigede sig med at opsamle de dræbte og saarede Duer, indtil enhver havde saa mange, som han paa nogen mulig Maade kunde føre med sig og da bleve Hundene og Svinene løsladte for at gjøre en Efterhøst. Man skulde maaskee troe, at Arten stod Fare for at udryddes

ved saa frygtelige Blødbad; men naar man betænker, at hvert Par frembringer 2—4 Unger, saa kan først da nogen betydelig Formindskelse indtræde, naar Skovene ved den stedse tiltagende Befolkning lyshes formeget.

De her anførte Data ere saa exempellose, saa overordentlige og afvigende fra alt, hvad vi i vore Egne have Anledning til at erfare, at sikkert Mange, der ikke kjende noget til den nye Verdens Produktivitet saavel i vegetabilsk som animalisk Henseende, ville tvivle om Sandheden af vor Skildring. Men det er de tvende mest udmærkede amerikanske Ornithologers Beretning, vi have fulgt, og de stemme fuldkommen over eens, saavel indbyrdes som med alle Andres, der have skrevet om denne Materie. Vi anføre til yderligere Betræftelse Kilderne: Wilson V. S. 102. Audubon Ornitholog. Biographi I. 319. Temminck Monographie des Pigeons I. p. 346. Den Allgemeine Naturgesch. 7¹. S. 296.

Femte Orden.

Styltefugle. (Grallæ).

(Fjordum Sumpfugle).

Disse Fugle have faaet Navn af sin Levemaade og af den Bygning, hvoraf denne er betinget. Man kjender dem paa deres fordetmeste høie, trinde, smækkre **Been**, der ere nøgne mere eller mindre høit op over Knæledet; **Bagtaen** sidder fordetmeste høit oppe; undertiden mangler den; **Fortæerne** ere enten aldeles adskilte eller ved Noden forenede med en større eller mindre Pinde, eller kantede med Lapper eller Flige. **Næbbet** er almindelig langt, enten ret eller bøiet. **Fingerne** ere, undtagen hos Strudsen og Kasuaren, lange eller mid-

delmaaßige. **Halen** er enten kort eller middelmaaßig og bestaaer af 12—20 Fjære.

Styltesuglene ere, paa faa Undtagelser nær, mere eller mindre spinkle Fugle med lang Hals, sammentrykt Legeme og høie Been. Ofteft er Hunnen større end Hannen, dog finder ogsaa undertiden omvendt Forhold Sted. Kjønnene ere fordetmeste lige i Farve og fælde en eller to Gange om Aaret; Ungerne ere almindelig forskjellige fra de Gamle. De fleste opholde sig ved Bredderne af Floder og Søer, ved Kjærn og Moser; kun nogle leve tørre, sterile Sandheder, andre opholde sig ved Søkysterne, atter andre opholde sig mest i Vandet udenfor Kysterne, hvor de fordetmeste vade, undertiden ogsaa svømme, dog kun kortere Stykker. Styltesuglene leve af Insekter og Orme; nogle æde ogsaa Frø og Planter. De fleste bygge en simpel Rebe paa Marken og udklække dunebe Unger. Med Undtagelse af Strudsene have de fleste en let og udholdende Flugt, hvorunder de strække Benene lige bagud, for at holde Ligevægt med den lange Hals. Alle Arter ere her i Norden Trækfugle, der paa bestemte Aarstider drage bort i store tætte eller spredte Flokke. De, som ere af forskjelligt Køn og Alder, trække almindelig til forskjellig Tid. De fleste kunne spises og nogle ansees for Lækkerbidstener. Vi inddele Styltesuglene i fem Familier.

Første Familie.

K j æ m p e f u g l e .

Kortvingede. (Brevipennes)

Skjønt de i det Hele stemme overeens med de øvrige Styltesugle, have de dog langt korterevinger, hvilken Omstændighed berøver dem Evnen til at flyve. I Næb og Levemaade have de megen Lighed med Hønsene. Som en Følge af Vingernes ringe Udvikling danner deres Brysbein kun et enkelt Skjold, der mangler


den fremstaaende Kam, som findes paa Brysbenet hos alle andre Fugle. Brysmusklerne ere naturligviis ogsaa tynde; men hvad de forreste Extremiteter have tabt i Kraft, have de bageste vundet: Beenmusklerne ere af en overordentlig Tykkelse. Naar undtages een Art, mangle de Tømmeltaa.

Strudsen.

(Struthio Camelus).

Næbbet er hos Strudsene temmelig langt, nedtrykt, stumpt i Enden. Næseborene staae henimod Spidsen af Næbbet. Bingerne ere besatte med slappe Hære. Hærenes Kaner gribe ikke i hinanden, men hænge frit ned som Haar. Blandt Fuglene have de den største Lighed med Pattedyrene; denne Lighed viser sig ogsaa i deres indre Bygning. Foruden Brysbenets Kam mangle ogsaa de smaa Tærbeen, der hos andre Fugle forene Ribbenene; de have heller intet Gaffelbeen, men derimod Hængbeen ligesom Hængdyrene. Tungen er kjødagtig, Dienlaagene forsynede med Diehaar, og hertil kan man endnu sige, at de ere de eneste Fugle, der have Spoer til ydre Dre, og de eneste, der have en særegen Udgang for de flydende Ekstremiteter, som hos de andre blandes med de faste. De løbe med overordentlig Hurtighed og understøtte Løbet ved at udspænde Bingerne. Til Forsvar bruge de saavel Næbbet og Bingerne som Benene og have i alle disse Lemmer en overordentlig Styrke. Strudsene ere de største Fugle i Verden. De findes paa Sletterne i de varme Lande, mest mellem Benedreksene og leve almindeligst i Polygami.

Strudsen opnaar en Længde af 7—8 Fod og en Vægt af 80—90 Pund. Hovedet er kun besat med enkelte Hære, Halsen nøgen. De store Binger og Halehære med slappe Kaner ere hvide eller sorte og hvide; det er disse, der fra Oldtiden af ere blevene anvendte til Prydselse; det øvrige Legeme er sort. Den har kun to Tæer, af hvilke den ene er forsynet med en Nægl eller



Den afrikanske Struds.

Hov. Strudsfens Hjem er Afrikas og Arabiens Sandør-
fener, hvilke den gennemløber med en saa overordentlig

Surtighed, at den neppe indhentes af den rappeste Hest; ja dens Løb er saa hurtigt, at det Menneske, der for første Gang rider paa den, taber Anden. Den nærer sig næsten udelukkende af Vegetabilier og har en meget sløv Smag; thi for at fylde sin uhyre Mave sluger den ogsaa mineraliske og animaliske Substanfer. Saaledes dræbte man en ved at give den ulædsket Kalk. Dens Rede er blot en Jordybning, hvori der staaer det betydelige Antal af 30—40 Æg paa Spidsen, for at de skulde indtage et saa lidet Rum som muligt. Disse Æg lægges af flere Hunner i Fællesskab og ruges afvexlende af dem om Dagen; kun om Natten ruger Hannen dem for at forsvare dem mod Angreb af mindre Rovdyr, som den er istand til at dræbe med et kraftigt Slag af sine vældige Been. Rundt om Redet lægges endnu flere Æg, som skulde haffes itu af de Gamle, naar Angerne krybe ud, for at tjene deres svage Møder til en nærende Kost. Æggene ere meget nærende og et er nok til at mætte fire hungrige Personer. Efter Levaillant o. s. spises, selv de befrugtede Æg, flegte i Skallene med Zaaresedt, af Pottentotterne, og Lichtenstein fandt en saaledes tillavet Ret meget velsmagende. I Fangenskab viser Strudsen ikke megen aandig Dygtighed og, skönt man kan ride paa dem, lade de sig dog ikke styre. Naar de have samlet sig i Flokke, jage Araberne dem tilhest, idet de trætte dem saalænge, til de søge at skjule sig eller gjøre Stand; man siger at de da skulde skjule Hovedet, sandsynligviis fordi det er den svageste Deel af deres Legeme. Strudsen er i vild Tilstand fly og forsigtig og tager Flugten ved den ringeste Nærmelse af Fare. Instinktmæssig holde derfor Zebraerne og Dvaggæerne sig til de store Strudsflokke, der ofte udgjøre flere hundrede Stykker, og tage, naar Strudsene sætte sig i Bevægelse, Flugten uden at vide hvorfor. Paa flere Steder i Afrika holdes Strudsen som Huusdyr, for de fine kostbare Vinge og Halefjæres Skyld. De, der sendes til Europa, ere af saadanne tamme Strudse; de af de vilde ere mere eller mindre bestadigede og slidte. Man tager dem tre

Gange i to Aar og river dem ud, de bedste kjendes derfor paa de blodige Penneposer; Hannernes Hjære have Fortrinnet for Sunnernes.

Den amerikanske Struds.

(Nandu, Rhea americana).

Denne Slægt har et tykkere Næb med Næseborer ved Roden; Fodderne ere forsynede med to Tæer. Den amerikanske Struds er 5 Fod høi. Den fanges tilhest med Lasso. Hjærene kunne kun bruges til Børster. Denne Fugl bliver meget let tam. Dens Hjem er Sydamerika.

Kasuaren.

(Casuarius indicus).

Disse Fugle have ingen Svingshjære eller kun nogle faa Hjærskaster uden Faner. Fodderne have tre Tæer.

Den indiske Kasuar har fem Vingehjærskaster, og en beenagtig Hjelmskæppe paa Hovedet. Alle dens andre Hjære ere som Haar. Den lever i Flokke paa Verne i det indiske Hav. Næst Strudsen er Kasuaren den største Fugl, da den bliver 6 Fod høi. Dens Hjære ere sorte, de nøgne Lapper paa Halsen blaa og røde. Den er ligesaa hurtig som Strudsen, skjønt dens plumpe Legeme ikke synes at antyde det. Dens Fodder ere saa stærke og kraftige, at den med et Slag af dem slaar en Mand til Jorden; den slaar ligesaa godt frem som tilbage.

Emu.

(Casuarius Novæ Hollandiæ).

Denne mangler Hjelmskæppe og har ingen Hjærskaster. Emu lever i smaa Flokke paa Nyholland og kan blive meget tam og fortroelig; Sommeren 1840 vare tvende tamme Individer at see i Christiania.

Dronten.

(*Vidus ineptus*).

Næbbet er meget tykt, sammentrykt, i Spidsen bøiet. De korte rudimentære Fingre bestode af bløde korte, til Flugt udelige Fjære. Med Bighed kan man kun hense en Art til denne Slægt, der er forsvunden af de levende Skabningers Række. Imidlertid burde vi snof saavel denne, som en nærstaaende Art af en anden Slægt, *Apteryx australis*, som nogle have gjort, henføres til en egen Orden.

Dronten er en af de besynderligste Fugle. Man kjennte den kun af de første hollandske Søfarendes Efterretninger, af et Oliemaleri fra den samme Tid og af et daarlig opbevaret Hoved og nogle Fodder i to engelske Museer, indtil Desjardins i den nyeste Tid under Lavagene paa dens foregivne Fædreland Jøle de France opdagede Beenlevninger, der satte dens tidligere Tilværelse udenfor al Tvivl. Efter Levningerne sluttede Blainville, at Dronten havde hørt til Gribbene og Cuvier troede i Næbbet at finde Lighed med Alferne, i Fodderne med Pingvinerne. Den var af Størrelse som en Svane; efter Afbildningerne vare Fjærene graae, men Fingre og Hale vare hvide. Den sidste, hvis det ikke er at skrive paa Malerens Regning, har havt en besynderlig Stilling. Dens Ubehjælpelighed og maaffe ogsaa Naturrevolutioner synes at have udryddet den^{*)}.

En ligesaa besynderlig, hidtil kun ved et Exemplar bekendt Slægtning af Dronten, er den ovennævnte *Apteryx australis*, der sandsynligviis endnu eksisterer paa Nyholland. Og da denne Fugls Bygning synes at forraade lige saamegen Træghed og Ubehjælpelighed som Drontens, gaaer den rimeligviis samme Skæbne imøde.

*) En Afbildning af denne Fugl findes i *Etill.-Mag.* 1 H. Nr. 19.

Anden Familie.

Brokfugle (Pressirostres).

Denne Familie indbefatter langbenede Slægter uden Tømmeltaa, eller hvis Tømmeltaa dog er for kort til at berøre Jorden. Deres middelsmaadige Næb er imidlertid stærkt nok til at opfatte Jorden og søge Insekter deri; de Arter, hvis Næb er svagere, søge sin Føde paa Eng og i nypløiet Jord. De, hvis Næb er stærkere, æde tilslige Korn og Planter.

(Crappen.)

(Otis tarda).



Næbbet er kort. Overnæbbet let hvælvet. Mundvigene gaae langt tilbage. Næseborene ligge ved Midten af Næbbet. Benene ere høie og nøgne til ovenfor Knæerne. Løbeføddernes Tæer ere forenede ved en kort Sinde. Bagtaen mangler.

Salen bestaaer af indtil 20 Fjære. Trapperne danne et Mellemled mellem Høns- og Styltefuglene og nærme sig ved Næbbets Form og den forherstende Udvikling af Fødderne til Strudsene. De ere undersættelige, kjødfulde og tunge; de løbe overordentlig hurtigt, men flyve mindre let. De ere meget sky og vilde, leve i større eller mindre Selskaber paa høilønde og tørre Sandheder, Havre- og Boghvede-Agre. De leve af Korn, Frø, Planter og Insekter. De leve i Polygami og lægge saa 12-15. Hannerne udmærke sig fremfor Hunnerne ved en Prydelse paa Hovedet eller Halsen.

Stortrappen er paa Hovedet og Halsen lyst askegraa, Hjærklædningen forøvrigt grovspraglet paatrørs med Sort og Rustgult. Det er den største europæiske Fugl. Dens Længde er $3\frac{1}{2}$ Fod. Den skal kunne veie over 24 Pund. Hannen adskiller sig fra Hunnen ved sin Størrelse og de ved Næbroden stiddende Haar eller børsteagtige Fjære. Stortrappen findes i Europa og Asien, fra Grækenland til Skaane, fra Syrien til det nordlige Rusland. De ere Størfugle, i nordlige Egne vel ogsaa Træffugle. Den løber med saa stor Hurtighed, idet den udsprender Vingerne, at selv Vindhunde eller Mynder neppe indhente den. Før den flyver, maa den tage et meget langt Tillob. Om Sommeren flyver den sjælden, om Efteraaret og Vinteren derimod mere og bedre. Jagten efter den er temmelig moisom og vanskelig. Man jager den med Vindhunde og Parforceheste eller et større Selskab forener sig til en Rjedejagt, d. e. de omringe Flokken paa alle Kanter og trække sig sammen til den flyver op, da man i almindelighed kommer til at gjøre fordeelagtige Flugtklub; thi den flyver ikke høit. I Parringstiden bryde Hannerne sig og slaaes som Ralkunerne. Hunnerne lægge 2—3 Æg af Størrelse som Gaascæg, i en Ager. Ungerne løbe, saasnart de ere krøbne ud af Ægget.

Brokfuglen.

(*Charadrius apricarius*).

Brokfuglene have et Næb der er fortere end Sovedet, ret, sylformigt, ved Spidsen sammentrykt, oventil noget tykkere. De ydre Tæer ere forenede ved en Sinde. Bagtaaen mangler eller er meget liden.

De herhenhørende Fugle opholde sig om Sommeren parviis fordetmeste paa høie tørre Steder, ved Myrer og Strande. Hos os er de alle Trækfugle der trække flokkelviis eller familieviiis. De Gamle trække for Ungerne. De løbe hurtigt og rykkelviis, flyve let og hurtigt og nære sig af smaa Orme og Insekter. De leve i Monogami og lægge i en Hule paa Marken, omtrent 4 plettede Æg, som Han og Hun ruge verelviis; de vise megen Omhu for Æg og Unger. Deres Lyd er pibende eller sløitende.

Brokfuglen, som hos os almindeligst kaldes, Fjeldhjerpe, Fjeldplastre, Heilo o. s. v. er oventil sortagtig, bestrøet med guldgule eller blegtgule Pletter. Paa Halsen har den talrige hvidagtige Tverstreger. De lange Fjære under Vingerne hyde. Denne Fugl er udbredt over Europa, Asien, Afrika og Amerika, den forekommer saavel i det høieste Norden, som i Kina Syrien og ved det gode Haabs Fjorberg. Her i Landet opholde Brokfuglene sig fornemmelig om Sommeren i Vidierregionen paa de høiere Fjelde ovenfor Skov- og Birkeregionen. Som Trækfugl kommer den til Christianiaegnen i Slutningen af Marts eller i April og forlader os igjen i August, September og Oktober. Vinteren tilbringer den i det sydlige Europa og er paa denne Aarstid meget almindelig i Egnen om Rom og paa Sardinien. — I Lille Beir kommer man Brokfuglsflokkerne let i Skud, naar man ikke gaaer lige mod, men til Siden af dem. Naar man seer en Flok i Luften og skjuler sig, eller kaster sig ned paa Marken og efterligner dens Lyd, kan man undertiden lokke den til at flyve over eller slaae ned i Nærheden.

Pommerantsfuglen.

(Ch. Morinellus).



Den har et hvidt Baand over Dinene, der gaaer lige til Raffen; Bryst og Sider ere rustrode; de forreste Vingefjæere ere sortbrune, den yderste med hvidt Stæft. Denne Fugl har fornemmelig hjemme i de nordligste Egne af Europa og Asien. Der i Landet beboer den kun de høiere Fjeldheder, hvor den træffes parvis til indend for den evige Snees Grændser. Den er mindre talrig end den foregaaende. Som den foregaaende har den en melankolst sløitende Lyd, som den fornemmelig lader høre mod Regn. Foruden de anførte Brokfugle findes i Norge Strandrylen, (Ch. minor), hvidbrystet Ryle (Ch. cantianus) og Rysibrokfuglen (Ch. helveticus).

Viben.

(Vanellus cristatus).

Næbbet er som hos foregaaende Slægt; men Viberne udmærke sig ved en kort Bagtaa, der sidder høit og ei naaer til Marken.

Viberne opholde sig om Sommeren paa sumptige Enge. Naar Ungerne ere flyveborne slaae de sig sammen og flyve om paa Enge og nypløiede Agre. Lidt ef-



Biben.

ter lidt trække de sig til Havet, langs hvilket de drage til sydlige Lande. De løbe hurtigt og flyve høit og let. Biben har i Halsen en lang smal Hjerterop; Kraaen og den øverste Deel af Bryttet ere sorte, Mavens og den underste Halvdeel af Halsen hvide. Biben findes i de fleste Egne af Europa og forekommer lige fra Island til Egypten og Persien. I Christianiaegnen viser den sig sparsomt om Vaaren, men paa Lister og Jædderen findes den i stor Mængde. Den er den første af Sumpfuglene der vender tilbage til os om Vaaren. Biben er en meget livlig Fugl, der medens den tumler sig i Luften ofte lader høre sin eiendommelige Lyd. De brede Vinger og de underste Legemsdeles blændende hvide Farve gjøre under dens overordentlig lette Bevægelser i Luften, særdeles Effekt. Magerne opholde sig i Hækketiden almindeligviis sammen og ofte hække flere Par i samme Kjer.

[Steendreieren.]

(*Streptopelia collaris*).

Næbbet er hos Slægten *Streptopelia* næsten af Soredeets Længde, langagtigt fægelformigt, haardt

sammentrykt ved Roden, udad trindt, lidt opad-
bøiet, Spidsen ret ligesom afhuggen. Næseborene
ligge i Næsefuren, der næsten strækker sig til Mid-
ten af Næbbet. Benene ere temmelig korte. For-
tæerne ere adskilte ligetil Roden. Bagtaen sidder
høit og naaer til Marken med Spidsen. Man kjen-
der af denne Slægt kun den ovennævnte ene Art, som
forekommer saavel i Europa som Amerika.

Kjælden.

Hematopus ostralegus.



Næbbet er hos denne Slægt længere end So-
vedet, haardt, udad meget sammentrykt, ret og med
fileformig tilskærpet Spids. Næseborene ligge
i en Fure, der omtrent naaer til Midten af Næb-
bet. Benene ere tretaaige. Rørtæen er fore-
net med Mellemtæen ved en Sinde.

Kjældene eller Strandkæderne opholde sig gjerne ved
Kysterne af Havet og ved Skærene. De leve i Mono-
gami, ere livlige og muntre, løbe og flyve hurtigt, abva-
re andre Fugle ved sit gjennemtrængende Strig for Kryb-
stykker, flyve almindeligt i Rækker og leve af Skaldyr og
Muslinger, hvis Skaller de aabne med sit haarde skarpe
Næb.

Kjælben er sort; Maven, den indre Halvdeel af Halsen den bageste Deel af Ryggen og et Baand straaes over Bingerne hvide. Længden er 16 — 17 Tommer. Næbbet og Benene ere hos de ældre røde. Den er meget udbredt, findes ved de amerikanske, asiatiske og europæiske Søfyster, ved det kaspiske Hav, Ryholland og flere Steder. Ved vore Kyster er den meget almindelig og kommer undertiden til de større Søer inde i Landet. Kjælben er slu og forsigtig og særdeles sky, naar den mærker at den forfølges, ellers er den ikke bange. Den svømmer med Lethed, og dykker endogsaa. Den flyver let og svinger sig undertiden meget høit op i Luften.

3de
Muden Familie.

Zeirer (Cultrirostres).

De have et tykt stærkt Næb der er længere end Hovedet, det er ret sammentrykt og fordetmeste spidst og skjærende. Halsen er lang og Benene høie. Hos flere Arter har Lustrøret forskellige Bøininger. Denne Familie indbefatter fordetmeste store Fugle, hvis Gang er langsom og gravitetisk, hvis Flugt er høi og jævn. De der have korte Tæer holde sig mere paa Marken, de der have dem lange, opholde sig i Sumper. De leve i Monogami. De hæfte paa Træer, Huse eller i Sumpe mellem Siv og Buske. Begge Mager made Ungerne, der hos de fleste Arter blive i Redet til de ere fuldkommen fjæklædte.

Tranen.

Traneflægten har et lige Næb. Næsefuren er bred og strækker sig fra Roden til noget over Midten. Mundvigerne ere under den forreste Deel af Øiet. Den lille Bagtaa sidder meget høit og naaer neppe til Jorden.



Tranen.

Tranen er graa med sorte Vingeffære og en stor hvidgraa Plet paa Siden af Hovedet og Halsen. Længden er 4 Fod. Om Sommeren opholder den sig i de nordlige Egne af Asien og Europa, om Vinteren i de sydligere. I Norden forekommer Tranen mere i de østlige end i de vestlige Egne. Den er saaledes temmelig sjælden i Norge. Tranen er en af vore stateligste Fugle. Naar den staaer opreist, naaer den en voksen Karl til Brystet, og dens Vingebredde udgjør 7 Fod. Den er Træffugl, som kommer i April og reiser i August eller September. Undertiden gaaer Toget saa høit, at man kun hører Tranernes stærke gjennemtrængende Trompestemmer ned fra Lusten, men ei seer Skaren, skøndt hvert Individ indtager et ikke ubetydeligt Rum. Stemmen forstærkes ved en egen Indretning af Luftrøret. Tranerne flyve altid i to under en spids Vinkel sammenstødende Rækker, der danne et fuldkomment A. Ved stærk Vind eller naar de foruroliges af en Drn, danne de en Kreds. Tranen er fly og aarvaagen og ud-

fætter altid Bagter, naar den hviler eller søger Føde. Desuagtet bliver den i Fangenskab let tam og er da overmaade morsom og pudseerlig.

Storken.

(*Ciconia alba*).



Sos denne Slægt er Næbbet meget længere end Hovedet; Næbryggen er næsten jævnhøi med Panden. Mundvigene gaae hen under Øiets forreste Kant. Næseborene udgjøre en smal Sprætte i selve Hornsubstanten og ligge nær ved Næbroden. Øinene ere omgivne med en nøgen Plet, der ikke strækker sig til Næbbet. Bagtaalen naaer Marken med en Trediedeel.

Den hvide Stork har et ret Næb; den nøgne Plet om Øinene er liden og glat. Hele Kroppen er hvid, Vingene sorte den er $3\frac{1}{2}$ Fod lang. Næbbet og Benene ere røde. Med Undtagelse af de nordligste Egne er Storcken udbredt næsten over hele den gamle Verden. I Norge er den meget sjælden; almindelig derimod i det sydlige Sverrige og Danmark. Den opholder sig saavel i skovløse som skovbegroede Egne. Med sagte og asmaal-

te Stridt spadsferer den i Morabser, paa sildandte Agre og Enge. Da den fredes overalt, er den kun lidet fly og flyver sjælden op, førend man er tæt ved den. Dens Flugt er høi, og den flyver undertiden lange Stykker uden at bevæge Vingerne. Svage Unger udkaste Storkene af Redet eller ihjelbugge dem før Afreisen. Inden denne gaaer for sig, samle alle Størke i Eggen sig, og efter at have opholdt sig sammen i nogen Tid, bryde de paa een Gang op til den lange Luftreise. De flytte til forskellige Steder i Afrika og Asien, hvor de tilbringe Vinteren. Storken lever i Monogami og Magerne ere hinanden oftest meget hengivne. Dens Føde bestaaer af Orme, Kiirbeen, Frøer, Fugleunger, Æg og Stalinssekter. Sit Rede bygger den paa Mønningen af et Huus, paa en Størsteenspiibe eller et affumpet Træ. Hvor man seer den vil bygge pleier man at lægge op et Bognhjul til Underlag. Hunnen lægger 3 — 5 Æg, som udruges i noget over tre Uger. Ungerne opfødes omhyggeligt af Forældrene, der flittigt bære Frøer, Muldvarpe, Rotter o. s. v. til dem. Man holder for at de gjøre megen Nytte ved at fortære Amfibier og Rottearter.

Den sorte Stork (*Ciconia nigra*) er, saavidt vides, kun fundt en eneste Gang i Norge, nemlig ved Frederikstad. Dens Hjem er det østlige Europa og Siberien, hvor den lever ved store Myrer og Kjærn.

Heiren.

(*Ardea cinerea*).

Næbbet er langt eller middelmaadigt. For- dybningen for Næseborene er liden, men fortsættes udad i en smal fure eller Rende. Næseborene, der ligge i denne nærved Næbroden, ere halvt rilluffede af dens Sinde, Øinene ere omgivne med en nøgen Plet, som hænger sammen med Næbbet. Bagtaagen sidder i samme Plan som Fortæerne og kommer under Gangen i Berørelse med Jorden



Heiren.

efter sin hele Længde. Halsen er lang, men kan sammentrækkes, saa at Halsen ligger paa den forreste Deel af Ryggen. Heirerne adskilles let fra andre Stykterfugle ved den eiendommelige Bøining af Halsen og ved fire med uldagtigt Duun bevoxne Steder, nemlig et paa hver Side af Brystet og et paa hver Side af Overgumpen over Halsroden.

Heiren er oventil askegraa, under hvid. Larsen er meget længere end Mellemtaaen. Længden er 3 Fod og 3 Tommer; Bingebredden 5 Fod 4 Tommer. Heiren er den almindeligste Fugl i hele den Gruppe, hvortil den hører, og findes i den hele gamle Verden ligetil Trondhjem. Paa Vestkysten af Norge er den almindelig og bliver der endogsaa Vinteren over. I Christianiaegnen er den sjælden, men viser sig dog næsten hvert Aar paa Boldene i Dieiren og ved Steensfjorden paa Ringerige. Den er en Trækfugl, som kommer i Marts og April, og forlader os i September og Oktober. I Frantrig og det sydlige Tydskland træffes den hele Aaret rundt og i Italien Høst og Baar. Heiren er en fly og forsigtig Fugl, der alt paa lang Afstand flygter for Mennesker, og den vælger derfor oftest sit Opholdssted langt borte fra Menneskers

Boliger. Naar Ungerne om Høsten ere udsloine, faaar man ofte see store Flokke af disse Fugle ved Kjørn, Moser og Floder. Fordetmeste vade de adspredte omkring i Vandet til op over Knaerne. Heirens Flugt er høi og let, og Fuglen lader flyvende ofte høre en skarp skurrende Lyd. Dens Føde er Fisk og Fiskeyngel, Amfibier, Vandinsekter, Molusker og Rotter. Den har den besyndelige Vane at bygge alt hvad den gæder i Vandet, Paa flere Steder hæfter Heiren i store Kolonier af over 100 Stykker, og i saadanne Lunde eller Holt træffer man ofte 10 — 12 Stykker paa et Træ.

(Nordrummen.)
(Ard. stellaris).



Den er brunn og sortspraglet samt plettet. Halseflæene ere lange, ligesom opblæste. Vingeflæene ere tegnede med sortagtige og rustgule Tverbaand. Dens Hjem er det tempererede Europa og det varme Amerika. I Norge findes den ikke, men i det sydlige

Sverrige. Om Høsten drager den til Italien og Afrika. Det er en ensom Fugl, der lever i Monogami. Om Dagen holder den sig rolig paa et Sted, men færdes fornemmelig om Natten og lader da høre et underligt vrællende Skrig, som høres meget langt. Den er meget arrig og forsværer sig tappert med sit spidse Næb. Saa vel denne som den foregaaende jagedes fordm med Fælke.

Skeegaasen.

(Platalea Leucorhodia).

Denne Slægt nærmer sig i sin hele Bygning Storkene; men Næbbet, hvoraf de have faaet Navn, er langt fladt, bredt, og ender sig oftest i en skeeformig Skive. Den hvide Skeegaas (Pl. Leucorhodia) har et tværfuret Næb, der er sort med gul Spidse. Den nøgne Dierection og Strubeposen ere blegt gule. Fødderne sorte. Forøvrigt er Fuglen hvid; dog findes der undertiden paa Bryttet noget Gult. Duffen i Natten bestaaer af slagrende Jiære og faaer derved Udseende af en Man. Den er meget hyppig i Holland og er nogle faa Gange skudt i Norge.

Sort Ibis.

(Ibis Falcinellus).

Ibisflægten har et meget langt, tyndt, ved Basis tykt og firkantet, udad sammentrykt, buetformigt Næb. Overnæbbet er forsynet med en dyb Fure paa hver Side fra Næseborene til Spidsen og Undernæbbet med en lignende paa Undersiden. Ansigtet og Sagen ere nøgne. Benene ere høie. Fortæerne ere ved Roden forenede ved en Sød. Bagtaaen er saa lang som den halve Mellemtaa og ligger under Gangen med sin bageste Salvedel paa Marken. Ibisfuglen opholder sig i de varme Lan-

de og gjør paa bestemte Tider uhyre Reiser. De besøge næsten alle Egne af Jorden. Af de gamle Egypter an-
saaes de for hellige.

Hos den sorte Ibis ere de øvre Legemsdele sortgrøn-
ne med Metalglands. Den er en af de Fugle der yderst
sjælden forekomme hos os, thi den er kun fundt to Gange
her. Den tilhører egentlig det sydlige Asien, hvorfra
den aarlig gjør Udvandringer til det sydlige og sydosk-
lige Europa. Disse Udvandringer foregaae, naar Unger-
ne ere bleve flyvevorne i August. Efter denne Tid ind-
finde de sig i Egypten, og det er ogsaa efter denne Tid,
eller i Høstmaanederne at en eller anden, fordetmeste ung
Fugl, forvilder sig langt bort og kommer lige til vort
Norden.

Fjerde Familie.

Snepper (Longirostres).

Næbbet er hos alle disse Fugle langt eller middel-
maadigt, tyndt, blødt, svagt. Ansigtet fjærdækt, Halsen
middelmaadig. Bagtaen sidder høit oppe paa Lårben
og naaer blot Jorden med Spidsen; undertiden mangler
den. Bingerne ere spidse, middelmaadige. Halen bestaaer
af 12 — 16 Fjære. De beboe Kjør, Morabser, sumpi-
ge Enge eller Strande og Bredder af Søer og Floder.
Ingen Art opholder sig i Hækningstiden ved Havet, men
samle sig der i Flokke i Trækningsstiderne. De fortære
Insekter, Orme, Mollusker og Krustaceer, som de med
Næbbet opsoge i Vand og Dymb. De leve i Monoga-
mi, hæfte paa Marken og lægge fordetmeste fire pære-
formige, plettede Æg. Begge Mager ruge Æggene og
pleie Ungerne, som løbe fra Redet og søge sig Føde, saa-
 snart de ere udflyttede.

Storspoven.

(Numenius arquata).



Næbbet er meget langt, bøiet og trindt. Overnæbber er langt og gaaer foran Undernæbber. Spidsen er det stumpet tilspidset. Det har nær ved Kanten en smal Fure til $\frac{2}{3}$ af sin Længde. Tæerne ere forenede ved en bred Sinde, hvormed de ogsaa ere kantede. Storspovens Hoved er oventil sortagtigt med bleggraae Fjærkanter. Overgumpen og de lange Armhulefiære hvide, oftest plettebde. Den er saa stor som en Krage, 22 Tommer lang. Forekommer fornemmelig i de nordlige Egne af den gamle Verden. Paa de fleste store Moser i det sydlige og mellemste Norge og Sverrige forekommer Storspoven temmelig almindelig, men ikke saa talrigt som paa Vestkysten. Paa Derne ved Vestkysten seer man den til indendfor Polarcirkelen. Som Trækfugl kommer den i Begyndelsen af April og tilkjendegiver snart sin Nærvarrelse, ved sin høie og pibende Stemme, som den næsten stedse lader høre. Den er meget sky og forsigtig. Af Spovslægten findes hos os, foruden den anførte, ogsaa Smaa-

spoven, (Num. Phæopus), der ligner meget ovennævnte, men er kun 16 — 17 Tom. lang og kjendes let paa et hvidgraat Baand over Jæsen.

Den foranderlige Strandvibe.
(Tringa alpina).

Næbbet er nedtrykt ved Enden, og Næsefuren meget lang, men i Regelen er Næbbet ikke længere end Sovedet. Benene ere temmelig smale og mid-
delmaadig høie. Fortæerne ere adskilte ligetil Ro-
den. Bagtaaen er saa lille at den neppe naaer til
Marken. De sælde to Gange om Aaret og undergaae
derved betydelige Farveforandringer. Om Sommeren
opholde Strandviberne sig ved fide Enge, Kjær og Moser,
saavel inde i Landet, som i Nærheden af Havet. Her
leve de parviis og lægge 4 pæreformige Æg, der ruges
verelviis af begge Nager. Under Forplantningstiden
findes ingen ved Havet, men naar Ungerne ere flyvevor-
ne, streife de familieviiis omkring og de fleste Arter søge
da den nærmeste Søst, hvor de forene sig med andre
af sine Lige og danne ofte store Skarer, der drage mod
Syden.

Den foranderlige Strandvibe har et stort, sammen-
trykt i Spidsen nedtrykt Næb, der er lidt bøiet og ube-
tydelig længere end Tarsen, der er en Tomme lang; de
øvre Halefjære ere sortagtige, de der ligge ved Sider-
ne hvide; Halen har et dobbelt Indsnit. Denne Fugl
er saavel i Norge som i Sverige den almindeligste af
hele Slægten. Om Sommeren træffer man den parviis
paa fide og tuede Enge saavel i det sydlige Skaane som
i Norges og Laplands Fjeldbegne. Den viser sig fornem-
melig om Høsten i tallose Flokke paa lave Strandbred-
der.

Foruden denne findes hos os Hjæremusen (Tringa
maritima), den frunnæbbede Strandvibe (Tr. subarqva-
ta), den brednæbbede Strandvibe (Tr. platyrhyncha),

den lille Strandvibe (*Tr. minuta*), Temmincks Strandvibe (*Tr. Temminckii*), den islandske Strandvibe (*Tr. islandica*).

(Sandløberen.)

(*Calidris arenaria*).

Næbbet er af Hovedets Længde, tyndt, mygt, sammentrykt ved Roden: ved Spidsen er det tykkere, kluntet. Overnæbbet er noget længere, forsynet med en Næsefur. Benene ere tynde, middelmaadig høie, med tre Fortæer, der ere aldeles adskilte, ved Randen kantede. Bagtaagen mangler. De to mellemste Halefjære ere spidse og meget længere end de øvrige. Af denne Slægt kender man een Art: den foranderlige Strandløber, (*Calidris arenaria*).

Strandsnipen.

(*Totanus hypoleucos*).

Denne Slægt har et tyndt, rundt, tilspidset, fast Næb, hvis Overfjære krummer sig en Smule henimod Spidsen. Benene ere høie, Mellemtaagen forenet med Ydertaagen ved en Sinde. Bagtaagen sidder saa høit, at den kun berører Marken med Spidsen. Strandsnipen er øventil bruungraa med sorte Streger og Pletter, alle undre Dele ere hvide, uplettede; Næbbet er af samme Længde som Tarsen. Denne Fugl er her i Landet almindelig ved alle Bække, Elve og Indsøer og forekommer ogsaa langs med Strandene af Christiansfjorden. Den er livlig, munter og hurtig i sine Bevægelser. Foruden denne findes hos os Hørfekinsneppen (*Tot. fuscus*), den rødbenede Sneppe eller Graafjælden (*Tot. Calidris*), den graabenede Sneppe (*Tot. ochropus*), den grønbenede Sneppe (*Tot. Glareola*) og Glutsneppen (*Tot. Glottis*).


(Langnæbbe.)

(Limosa).

Næbbet er lige, lidt opadbøjet og endnu længere end hos Bekkasinerne. Næsefurerne gaae næsten lige ud til den stumpe noget nedtrykte Spids. Fortæerne ere kantede, og Vbertaaen forenet med Mellemtaaen ved en Zinde til det første Led. Bagtaaen naaer Jorden med en Trediedeel. Af denne Slægt har man hidtil hos os kun truffet en Art: den rustrøde Langnæbbe (Limosa rufa).

Holtsneppen.

(Scolopax rusticola).



Bekkasinflægten (Scolopax) har et langt, ret, ved Enden fortykket Næb, som er beklædt med en blød nerverig Hud, der efter Døden bliver rynket. Næsefuren er meget lang. Vinene ere store, ligge langt tilbage, tæt under Jæsen. Tæerne ere adskilte lige til Marken. Bagtaaen, der er kort og høitstående, naaer til Jorden med Spidsen. Bekkasinerne ere natlige Fugle, som almindelig ligge stille om Dagen, og ere i Bevægelse i Stumringen og Dæmringen, ja endogsaa om Natten. De opholde sig i Moser og paa sumpige Eng, eller blandt Buske i Skovene. De opholde sig om Som-

ren i Norden, men drage til sydlige Egne mod Vinteren. Ved sin Holtning og sit Udseende erindre de om Hønsene; de løbe hurtigt, skjule sig paa Marken og trykke for Hunden. Hos de fleste Arter er Sunnen større end Hannen og har længre Næb. Deres Flugt er hurtig og hos nogle i Zikzak, hvorfor der udfordres megen Færdighed til at skyde dem. De trække i adspredte Flokke, og Hannerne komme om Vaaren førend Hannerne. De nære sig af Matfer, Insekter og Larver. Kjødet er bekjendt som overordentlig velsmagende. Skjendt de her i Landet findes i stor Mængde, skydes der dog kun faa.

Holtfsneppen, Baldsneppen, eller Rugden er 14 Tommer lang. Hovedet er bagtil sort, med 3 rustgule Tværbaand. Øventil er den bruun og sort spraglet, med flere langsgaaende Striber paa Ryggen og fire Tverstriber paa hver af Bingerne; under er den hvidguul med brune Bølgestreger. Halespidtsen er øventil graa, under sølvhvid. Holtfsneppen forekommer og klækker om Sommeren fra Lapland og Sibirien, hvor den findes i stor Mængde, til langt mod Syden, men hvor den ei er saa talrig. Om Vinteren træffes den i største Mængde i Italien og Taurien, ja trækker endogsaa over til Anatolien og Afrika. Ogsaa i England, Frankrig og Tyskland overvintrer den. Til Christianiaegnen, hvor den er hyppig, kommer den i de sidste Dage af Marts eller i Begyndelsen af April og synes, efter Rasch, ikke at forlade os førend Kulden nøder den dertil. Den opholder og forplanter sig helst i bjergige Skovegne, hvor der er meget fugtig Mose. Holtfsneppen er en sty Flugt, der ligger stille om Dagen. Det besynderlige Instinkt hos den, at den i Skumringen og Dæmringen flere Gange flyver frem og tilbage over den samme Egn, kalder man i Överrig Morkull-sträck o: Holtfsneppedrag, Rugdetræk. Rugden trækker fornemmelig om Vaaren under Parringstiden; men naar Ungerne er blevene flyveborne, trækker hele Familien. Under Draget eller Trækningen, lader den høre en egen Lyd, som omtrent kan udtrykkes med: ort, ort, piss! Holtfsneppen skydes paa Drag og kan loffes som Tiur

og Korfugl. Kjødet er af en fortrinlig Smag, og Fuglen steges og spises med Indvoldene i.

Enkelt Bekkasin.

(Scol. Gallinago).




Salen har 14 Hjæ, der ere rustgule med sorte Baand og hvid Spids. Den yderste Vingehjæ er hvid i Iderfanen, Bryttet og Mavnen ere uplettede hvide. Den findes fornemmelig i de nordlige Lande. Der forekommer den til indenfor Polarkredsens. Som Træffugl, viser den sig ved Christiania i April og Mai og drager borti August, Septb. og Oktober. Den er meget almindelig i alle Moser i Fjeldegnene. Naar man nærmer sig den, flyver den op med Lynets Hast i Zikzak, hæver sig høit op i Lusten, flyver almindelig langt og kaster sig som en Pils ret ned i et Hjør. Under Parringstiden ligner dens Stemme en Gjedds Brægen, hvilket har givet den norske Almue Anledning til at kalde den Naajelt, Mæregaut, Dorsegaut, Skoddeføll o. fl. Ligesom de øvrige Bekkasiner fanges den i Garn og skydes for Ræbhund; men denne Jagt udbræver en udmærket Flugtskytte.

Foruden de anførte Bekkasiner forekomme i Norge: den dobbelte Bekkasin (Scol. major), der især findes i

Mængde paa de flade Der i Dieren, og Smaabektafinen.
(Sc. Gallinula.)

Bruushanen.
(*Machetes pugnax*).



Næbbet er af Hovedets Længde, noget sammen-
trykt ved Roden; ud ad er det trindt, ved Spidsen
nedtrykt. Overnæbbet er noget længere end Un-
dernæbbet, og dets Spids noget bøiet over Un-
dernæbbets. Næsefuren er lang. Bagtaen sidder høit
og naaer Marken med Spidsen. Fortæerne ere kantede;
Idertaaen forenet med Mellemtaen ved en bred Hinde.
Hannerne ere betydelig større end Hunnerne og meget
forskjellige fra dem. Hannerne ere om Vaaren prydede
med en lang smuk og yppig Hærkrave og have Ansigtet
fuldt af røde Borter. Farven varierer i det Uendelige.

Bruushanen eller Kampghanen har fortagtige Ving-
sjæere; det første Vingefjærkast er hvidt; de tre ydre Ha-
leffjære ere graae, fordømmeste uden tydelige Pletter.
Tarsen er $1\frac{5}{8}$ — $2\frac{1}{8}$ Tomme. Den forekommer i det
tempererede Europa og Asien og det nordlige Afrika.
I Norge forekommer den almindeligst ved Kysterne ligetil
de nordlige Egne af Landet. Om Høsten viser den sig

ikke sjælden paa fidslante Enge ved Christiania og paa Derne i Dieren. Skjøndt Bruusbanerne ere selftabelige Fugle, slaaes de dog uafsladelig i Parringstiden. Sunnerne, der opholde sig ved eller iblandt dem, ere af langt fredeligere Gemytsbestaaffenhed.

Femte Familie.

Sumphøner. (Macrodaetyli).

Sos denne Familie er Næbbet haardt sammentrykt og fordetmeste høit og tilspidset. Tærne ere meget lange, smale, adskilte, med eller uden Lapper paa Siderne; Bagtaagen sidder lavt og berører Jorden med $\frac{1}{3}$ eller $\frac{1}{2}$ Deel af sin Længde. Kroppen er meget sammentrykt. -- De opholde sig fordetmeste mellem Græsset i Rier og Moser i Nærheden af Vandet; nogle opholde sig ogsaa blandt Kornet paa Agrene. De løbe hurtigt og have let for at skjule sig og flyve ialmindelighed ei op, førend man er dem meget nær. De leve i Monogami og Sunnen lægger et stort Antal Æg. Ungerne løbe ud af Redet saasnart de ere udflækkede.

(Vandriren.)

(Rallus aquaticus).



Sos denne Slægt er Næbbet længere end hovedet, smalt spidst, noget nedbøiet og sammentrykt

efter hele sin Længde. Næsefuren gaaer ud til over Salvdelen af Næbbet. Salen er kort. De herhen hørende Fugle løbe hurtigt og kunne i Rødsfald svømme, men flyve ei gjerne og vise sig sjelden for Mennesker. Deres Føde bestaaer af Orme, Insekter og Frøe. Der findes blot en europæisk Art, der i alle kolde og tempererede Lande er Trækfugl. „Paa Island er den dog Standfugl; sandsynligviis fordi den ei kan trække over det vide Hav og komme dervfra. Men hvorledes den er kommen did er ikke let at begribe.“

Bandriren er oventil olivenbrun med sorte Pletter. Havens Sider ere sorte med hvide Tværbaand. Længden er 10 Tommer; dens Hjem er Europa. Dog er den meget hyppigere i de sydligere Egne. Hos os synes den kun at forekomme spredt og i ringe Mængde, især paa Vestkysten. Den er fornemmelig i Bevægelse om Natten, for at søge sin Føde.

Agerriren.

(*Gallinula crex*).


Hos denne Slægt, *Gallinula*, er Næbbet kortere end Sovedet, høit og sammentrykt, ret, oven og nedenunder lige tilspidset; Næbroden er oventil mere eller mindre bøl. Benene ere store med heelt fløvede Tæer. Bagtaalen sidder høit og berører Marken med den yderste Trediedeel. Salen er meget kort og fordetmeste skjult under Dækfjærene. Sumpbønerne opholde sig fordetmeste paa Steder, som ere bevorte med Græs eller Siv, eller og i Nærheden af aabent Vand, hvori de svømme og dykke fortræffeligt. Dog undtages herfra Agerriren, som ikke svømmer, og ofte opholder sig langt borte fra Vandet. De løbe hurtigt.

Agerriren er henved 10 Tommer lang. Vingernes Grundfarve er brunrød. — Den er temmelig hyppig lige fra det sydlige Norge til indenfor Polar kredsen, men forekommer overalt sporadisk eller flækkerviis. Den op-

holder sig mellem høit Græs og Korn paa fugtige Steder. Som Træfugl kommer den til Christianiaegnen i Midten af Mai og drager bort i September. Om Natten, og efter Regn ogsaa om Dagen, lader den høre sit høitlydende skurrende Ary — snarp eller rar — krax, som gjentages i lange Rækker. Den flyver slet og ugjerne og fordetmest kun naar den bliver opskræmt, og selv da, kun korte Strækninger. Man faaer sjelden see Agerriren; thi den skjuler sig fordetmest iblandt Kornet eller Græsset, og man kan uden tvivl antage at ikke En af Hundrede af dem, der have hørt den, have faaet den at see.

Den anden Art Sumpheue (*Gal. porzana*) er ogsaa stød i Norge. Den er mindre end foregaaende og befrøet med hvide Punkter.

Blisshønen.
(*Fulica atra*).



Sos denne Slægt er Næbbet kortere end Sovedet, tykt, ret sammentrykt efter hele sin Længde, oven og nedentil lige tilspidset; Næbryggen stræk-

fer sig tilbage paa Panden og udvides der til en ophøiet Plade. Alle Tæer ere lange; Fortæerne ere paa begge Sider kantede med en bred sliget Hud; Bagtaen, der næsten efter hele sin Længde er i Berørelse med Marken, er kantet med en heel Hinde. — Blishønen opholder sig i Færstvand og besøger kun Havet i Træknings tiden. De svømme og dykke med overordentlig Færdighed. Om Dagen skjule de sig blandt Siv og Græs, men færdes om Natten og ere meget vanskelige at komme istud. De leve i Monogami og begge Mager ruge Eggene og passe Ungerne. Blishønen har hvid Vandepfade; Hjørbedækningen er sortagtig; de underste Halebækkjære sorte, den yderste Vingekant hvid. Den er meget almindelig i det tempererede Europa, Rusland og Ostindien og forekommer temmelig hyppig i Staane; i nordlige Egne er den mindre almindelig, skjøndt den findes til nordensfor Dovre. Til sine Klækketider skal den ankomme i April og Mai. Noget før denne Tid viser den sig i smaa Flokke paa Havet. Om Sommeren opholder den sig for det meste parvis ved de sivbegroede Bredder af Moser og Indsøer. Paa Landet viser den sig sjelden; thi den gaaer ugjerne og blot kortere Stykker. Ligesaa ugjerne flyver den. Bliiver den skræmt og vil hastig afsted, slagrer den hurtig med Vingerne og slaaer mod Vandet med Fødderne. Men er den først kommen op, flyver den temmeligt rasst. Den trækker bort i September.

Svømmesneppen.

(Phalaropus).

Denne Slægt indbefatter smaa Fugle med et middelmaadigt, tyndt, ret eller nedtrykt, spidst Næb. Begge Kjæber ere furede langs Kanten fra Roden og have indboiede Spidsfer. Benene ere middelmaadig høie, nøgne til over Knæerne. Bagtaen berører blot Marken med Spidsen. Fortæerne ere forenede til Midten og derpaa kantede med en sliget Hinde. Af denne Slægt

findes hos os to Arter: den brednæbbede Svømmesneppe (Ph. fulcarius) og den smalnæbbede Svømmesneppe (Ph. hyperboreus).

Avocetten.

(Recurvirostra Avocetta).

Næbbet er meget langt, tandert og fladtrykt under hele sin Længde; den ydre Salvedeel, er høi og frummet opad; Næseborene ligge i Næsefurerne, nærved Kanterne af Næbbet. Benene ere smale, lange, sammentrykte paa Siderne og nøgne til høit op over Knæerne. Fortæerne ere meget Fortere end Tarsen, forenede ved en indringet Hud til lige ud mod de rette Kløer; Bagtaalen er meget Kort, sidder høit og naaer ei Marken. — Fuglen træffes parviis og nærer sig af Insekter, som den plukker op af Vand eller Dynd.

Denne besynderlige Slægt er ulig alle andre Vandfugle. Den staaer allene og danner ei tilligemed nogen anden Slægt en naturlig Gruppe. Den Art, som vi her ville beskrive, nærmer sig, ved sine luffede Fødder og ved sin tætte ved Vunden meget duunfulbe Hjærtslødning, samt derved, at den ofte svømmer, til Svømmefuglene og danner derfor en passende Overgang til disse.

Avocetten, der i Danmark kaldes Klybe, er hvid; Kalotten og Bingerne ere sorte; paa Skuldren er en stor hvid Plet. Den opholder sig under alle Aarstider nær ved Havets Strande, løber paa fide Enge ved Stranden, vader i grundt Vand og svømmer i det dybere. Dens Hjem er fornemmelig Sydøuropa; dens Nordgrændse er ved Scandinaviens sydligste Strande; i Norge er den ei bleven skudt, førend i dette Aars September, (1840), da et Exemplar fældedes ved Ellinggaard i Smaalshnene.

Sjette Orden.

Svømmefugle. (Palmipedes s. Anseres).

Svømmefuglene ere Fugle, hvis hele Organisation er indrettet for et Ophold paa og i Vandet.

Svømmefodderne vise sig her under tre forskellige Former. De ere enten **egentlige eller heeltforbundne Svømmefodder**, hvor de 3 Fortæer ere forenede ved en Hinde, og Bagtaalen er fri eller mangler; eller **Nare eller Pelikanfodder**, hvor alle fire Tæer ere forenede, eller endelig **Lappesfodder**, hvis Tæer ikke ere forenede, men omgivne med en hindeagtig Rand. *) **Næbbet** er kort eller middelmådigt, sammentrykt og spidst, eller trindt, eller bredt og stumpt. **Bingerne** ere lange og spidse, eller middelmådige og stumpede, eller korte. **Halen** bestaar af 12 — 20 Fjære eller mangler aldeles.

Vandet er Svømmefuglenes egentlige Element, og paa dette tilbringe de sin meste Tid og hente deraf sin meste Føde. Svømmeevnen er derfor fortrinlig udsiklet hos dem, og deres hele Legemsbygning er indrettet derafter. Benene ere korte, med trind eller fladtrykt Tarse, og sidde langt tilbage under Kroppen. Fjærene ere tæt-sluttende og bløde og holdes steds glatte og olieagtige ved en Bædste, som affondres i en Kirtel paa Overgumpen og indgnides med Næbbet. Paa lange Vandringer svømme Fuglene, som vi alt paa et andet Sted have omtalt, ikke, da selv de bedste Svømmere paa denne Maade ikke kunne tilbagelægge en Mil i Timen. Alle Svømmefugle ere i større eller mindre Grad fortrolige med sit Element. Alle kunne hvile paa Vandet, de fleste ogsaa

*) Saa vel de egentlige Svømmefodder som Lappesfodderne forekomme ogsaa hos enkelte Fugle af Stylerfuglenes Orden, f. Ex. Svømmefodder hos Flamingo, Lappesfodder hos Blisshønen og flere.

svømme og i denne Stilling med Næbbet og Hovedet søge sin Føde deri. Med Svømmeevnen er tillige hos de fleste Svømmefugle forenet Evnen til at dykke, eller sænke sig ned under Vandets Overflade. **Dykkerne** ere enten **Svømmedykker**, naar de kunne nedsænke sig, i det de hvile paa Vandet. **Styrtedykker**, naar de blot kunne sænke sig under Vandet ved at nedstyrtte sig fra Luften.

Svømmedykkerne dykke paa forskjellige Maader: Nogle slutte Bingerne tæt sammen og gjøre et lille Spring, hvorved de komme ned paa Hovedet: under Vandet svømme de blot med Fodderne. Andre brede Bingerne halvt ud og svømme under Vandet med Binger og Fodder. — I Anvendelse af Dykkeevnen vise de ogsaa nogen Forskiel: Nogle dykke baade efter Føden og for at undgaae en Fare; andre dykke efter Føde, men søge at undgaae deres Fiender ved at flyve, atter andre dykke kun i Fældingstiden, naar Flyveevnen er dem berøvet; men istedetfor Dykkeevnen have de da Evne til at kunne stille sig paa Hovedet og ophefte Foden fra Bunden af udybt Vand. — Mange Svømmefugle kunne ikke dykke førend de have faaet Hjer; saalænge de ere i deres Duunklædning komme de ikke i Vandet, men næres paa Landet af de Gamle; andre begynde at svømme og dykke saasnart de ere udklækkede.

Styrtedykkerne anvende allene denne Evne, forat gribe det Bytte, som de i Forveien have opdaget under Vandet. Naar de nemlig under Flugten bemærke et passende Bytte, holde de stille og bevæge sig med udspændte Binger mod Vandet, bevæge derpaa Bingerne nogle Gange, for at gjøre Faldet kraftigt, og styrte sig saa ned. — Ingen Styrtedykker anvender dette Middel for at undgaae Farer, og ingen Svømmefugl er baade Svømmedykker og Styrtedykker. De fleste Styrtedykker svømme kun lidt, men hvile derimod ofte ud paa Vandet.

De fleste Svømmefugle leve i Monogami. Denne er tre Slags. Hos nogle tage baade Hun og Han Deel

i Redebygningen, Eggene's Ubrugning og Ungernes Ernæring og Beskyttelse; disse ruger alle ved Havet. Hos andre ruger baade Han og Hun, og begge beskytte Ungerne; derimod fødte de dem ikke, men føre dem strax til Vandet, hvor de selv søge Næring: disse ruger ved de første Bænde. Atter hos andre er det Hunnen, som bygger Redet, ruger Eggene, leder og beskytter Ungerne, men ingen af Magerne fødte dem; ogsaa disse klække ved første Bænde. De her anførte Bestemmelser taale imidlertid adskillige Indskrænkninger. — De fleste Svømmefugle bygge et meget konflikt Red, som de dog for det meste udfodre med bløde Duun, hvilke de plukke af sit eget Legeme. Størstedelen bygge paa Marken, andre i Jordhuler, Bjergkløfter og hule Træer. De fælde for det meste to Gange aarlig. — De koldere Lande ere Svømmefuglenes egentlige Hjem; de findes der i en taløs Mængde, og blive der ved sit Kjød, Æg og Fjær uundværlige for disse Landes Beboere. I de varme Lande findes der forholdsvis meget faa Svømmefugle. De ere meget selskabelige; og ikke allene mange Fugle af samme Art, men ogsaa en Mængde forskellige Arter yngle imellem hverandre paa samme Steder, de søge især til klippefulde Strandbredder og enkeltstaaende Klipper i Havet som de besætte fra øverst til nederst. Disse Klipper kaldes Fugleøer eller Fuglebjerger. — Denne Orden indbefatter fire Familier: Maager, Gaasfugle, Pelikaner og Dyffere.

Første Familie.

Maager (Longipennes).

Vingerne ere lange og spidse, Tarsen triad eller sammentrykt, Dagtaen er fri eller mangler; Fortæerne ere forenede ved en heel eller indringet Svømmehinde. Næbbet er aldrig tandet men sammentrykt og spidst; i Spidsen ret eller nedbøjet. Hos disse sidde Benene om-

trent midt under Kroppen. Alle flyve høit og let og nogle Arter flere hundrede Mil fra Land. En Deel gaar, løbe og svømme med Lethed, andre næsten aldrig. De fleste ere Styrtebyffere. Alle vise de Tilboielighed til at bygge kolonibiis; hæfte ved Havet. De have mange Egenstaber tilfælles med Rovfuglene og man har derfor kaldet dem Rov-Svømmefugle.

Makreltårnen.

(Sterna Hirundo).




Sos Tårnerne er Næbspidsen ret, uden nogen Sage, Svømmehuden udringet, Vingerne meget lange, sabelformig spidse, Salen mere eller mindre fløvet. De opholde sig bestandig over og ved Vandet og flyve mere end de svømme; og af deres lange Vinger og smaa svage Fødder kan man allerede slutte sig til, at de mere opholde sig i Luften end i Vandet. Deres Føde bestaar i Fiskeunger, Vandinsekter, og Krusta- ceer. De lægge sine Æg paa den bare Sand eller Straa. Begge Mager bære i Næbbet Føde til Ungerne, selv efterat de kunne flyve.

Makreltårnen har et rødt Næb med sort Spids; Benene ere røde; Hovedets Sider og Struben ere reent hvide. Den findes ved Kysterne af alle Have i det nord-

lige og tempererede Europa, Asien og Amerika og forekommer ogsaa temmelig hyppig ved de større Floder og Ferskvandsøer. Ved Norges Kyster er den meget hyppig og er maaſte den eneste af Slægten, som forekommer der. Mod Vinteren drage Tærnerne noget sydligere, om Sommeren sees de til langt nordenfor Polarkredsen. Næsten steds seer man den med lette Vingeflag svæve lavt over Vandet; naar den bliver vaer en Fisk eller et Vandinsekt holder den sig stille paa eet Sted med slagrende Vinger og skyder derpaa ned med Vilens Hurtighed, for at fange sit Rov.

Skyder man en Tærne i Luften, og den falder vingestudt paa Vandet, samles der almindelig en Mængde strigende Kammerater, til hvem der ogsaa slaae sig Maager, over den. De følge Mafrelstimerne, forat opsnappe de Insekter, Krustaceer og Smaafiske, som disse tage op.

Fiskemaagen.
(*Larus canus*).



Maagerne adskilles meget let fra den foregaaende Slægt ved sit mod Spidsen til en Kroge bøiede

de Overnøb og den tværtasskarne af lige lange Fjær bestaaende Hale. Næbbet er i det Sele stærkt, og Underkæben har henimod Spidsen en fremstaaende Vinkel. I Legemsbygning og Leveemaade have de nogen Lighed med Krager og Gribbe. De forekomme fordetmeste i større eller mindre Selskaber ved Kysterne af Havet; kun saa leve ved færsst Vand. Med Hensyn til Flugt og Dykningsøve have flere Arter Lighed med foregaaende Slægt; men Venene ere som Bevægelseskab mere udviklede end hos Tærnerne, hvorfor de kunne svømme paa Vandet og gaae og løbe paa Landet. De ere alle meget glubste, og deres Føde bestaaer fornemmelig af levende og døde Fiske, Madsler, som flyde paa Vandet, Fugleunger, Eg o. s. v. Muslinger og andre Skalbyr, sætte de undertiden fast i Klipperevner, hakte dem itu med Næbbet og udtage saaledes Dyret; undertiden flyde de høit op i Luften med dem, slippe dem ned paa ujevne Klipper og knuse dem saaledes. De lægge 2—4 Eg, oftest paa en Klippe, paa et Underlag af Tang eller Græs.

Fiskemaagen har afteblaa Mantel (Ryg og Binger); Tarsen er $1\frac{1}{8}$ — $2\frac{1}{8}$ Tomme, Bingerne omtrent to Tommer længre end Halen; de første Bingeffære ere udtillforte med forte Skaster; de to yderste med et bredt hvidt Bælte bag Spidsen; de følgende have kun hvide Spidser. Denne er hos os den almindeligste Maageart; den forekommer ved alle Kyster, ligesaa Næstet til Finnmarken. Man træffer dem ogsaa ved Indsøer og andre Blande langt inde i Landet og de klæfte endogsaa i Fjeldvandene i den evige Snees-Region. Den lever altid i større eller mindre Selskaber. Naar en Storm nærmer sig eller alt har sat Havet i Dyr, flyver den undertiden i utallige Flokke flere Mil ind i Landet, og slaar ned paa lavvædte Agre og Enge. Den æder, foruden de anførte Fødemidler, ogsaa Korn paa de tilfæede Agre.

Foruden Fiskemaagen findes hos os Lattermaagen (*Larus ridibundus*), Hvidmaagen (*L. eburneus*), den retaaede Maage eller Kryfjen (*L. tridactylus*), den store

Graamaage (*Larus argentatus*), den islandfke Maage (*L. glaucus*), Havmaagen, (*L. marinus*), og Silde-
maagen (*L. fuscus*).

Norvmaagen.

(*Lestris*).

De ligne Maagerne men have det i Spidsen stærkt frummede Næb ved Roden beklædt med en Vorthud ligesom Rorvfuglene. Norvmaagerne opholde sig i de nordlige Have og i Skjærgaardene omkring den standinaviske Halvø; de forekomme fordetmeste enkelte eller parviis undtagen i Klæffeiden, da de leve i Kolonier. Deres Næring er Fisk, de ere glubfke, djærve og dristige; men da de aldeles ifke ere Svømmedykkere og flette Styrtedykkere, faa kunne de ei selv fange meget Fisk i Vandet. De paffe derfor paa, naar andre Vandfugle fornemmelig en Tærne eller Maage, blandt hvis Skarer de opholde sig, have fanget noget Ror; de angribe den da strax i Luften, klemme og hugge den faalænge til den maa udkaste den undertiden alt nedsvælgende Fisk, hvilken de da med beundringsværdig Hurtighed opfnappe inden den naaer Jorden eller Vandfladen. De hæfte paa Myre og Sandbanker ved Færskvand. — Af denne Slægt forekommer hos os tre Arter: Havstummeren eller Skua, (*Lestris catarrhaetes*) Bredstjertet Jo (*L. pomarina*) og Tyvejo, Trulort eller Maagesibdt (*L. parasitica*).

Albatrossen.

(*Diomedea exulans*).

Denne Slægt, der ifær tilhører den sydlige Salvfugles Have, har et stort tykt Næb, der er forsynet med en Sage, aldeles adskilte og til Siderne liggende Næseborer og intet Spor af Bagtaa.

Slægten indbefatter de største Søfugle, der nære sig af Fisserogn, Molusser, Aalsæl af Hvaler, Sepier o. s. v.

Albatrossen er meget større end en Svane, henved fire Fod lang med en Vingebredde af 10—12 Fod. Den er hvid med sorte Striber; Svingsflarene ere sorte, Næbbet gulagtigt, Fødderne fjødsfarvede. Den findes fornemmelig hiinsides Bendekrebsen, ved det gode Haabs Fjorbjerg, ved Kap Horn og i det hele store Verdenshav. Imidlertid synes de at foretage store Reiser; man træffer dem ofte flere hundrede Mile fra Land og saalangt nord som ved Kurilerne og Kamtschatka. De forekomme næsten steds i store Selskaber, der strige som Vælsker og ere meget graadige. De forfølge fornemmelig de flyvende Fiske. Eggene skulle være 4 Tommer lange.*)

Stormfuglen.

(*Procellaria glacialis*).

Næbbet er af Sovedets Længde; Overnæbbet er ved Spidsen nedbøiet; Undernæbbet danner en Kende og er nedenunder forsynet med en Vinkel. Næseborene danne en affaaen Tubus og aabne sig midt paa Næbryggen i en fælles med Skillevæg forsynet Aabning. Fortæerne ere lange med stor Svømmehud. Bagtaen danner blot en liden spids Klo. Stormfuglene ere af middelsmaadig Størrelse og træffes almindelig ude paa det vide Hav eller blandt Klipper og Fjorbjerge og nærme sig sjælden Kysterne. De ere mest i Bevægelse under eller mod stormfuldt Veir. De fræve frem med ubevægelige Vinger over Bølgerne, havende og sænkende sig med dem. Deres Føde bestaaer mest af Aalsæl af Hvaler, Sælhundede og andre Sødyr. De byg-

*) Som en Mærkelighed kananføres, at en sjelden Art af denne Slægt, *Diom. chlororhyncos*, som ellers aldrig pleier vise sig nordenfor Equator, blev Høsten 1837 fanget paa Eger, ei langt fra Rongsberg.

ge intet Nede, men klætte i store Flokke paa Klippeaffatter ved det aabne Hav. Hannen og Hunnen made sine Unger af Kraaen ved at indkaste de halvfordøiede Fødemidler i deres Gab.

Stormfuglen er saa stor som Fiskeaagen, oventil afteblaaagtig, under hvid; Næbspidsen og Alverne ere hvide, Vingefjærene mørkegraae. Denne Art synes kun at tilhøre de nordligste Hæde; i de sydligere Egne og den sydlige Hæmisse forekomme flere andre Arter af Slægten. Stormfuglen viser sig ikke sjelden ved Kysterne af det nordlige Norge, naar det blæser stærkt; den pleier der følge efter Baadene. Den hæfter paa de yderste ved Havet liggende Holme og Klipper udenfor Finmarken og Nordlandene og i Mængde paa Beeren-Eiland. Ved Grønland, hvor den kaldes Malemukke, og paa nogle Der ved Island klæfter den i saadan Mangfoldighed, at Antallet Aar for Aar forøges, uagtet man aarlig borttager en 20,000 Æg og Unger. Foruden de ovenanførte Fødemidler fortærer den ogsaa Meduser og Røkleare. Paa steile Klippeaffatter lægger Hunnen eet stort hvidt Æg, der ruges vekselsviis af begge Nager.

Stormspalen.

(*Thalassidroma pelagica.*)



Sos denne Slægt er Næbbet kortere end So: vedet, temmelig tyndt og svagt, meget sammentrykt;

Overnæbbet er i Spidsen nedbøiet; Undernæbbet har ingen Vinkel nedentil; Næseborene ere som hos foregaaende, Benene ere temmelig høie. Bagtaaen dannes alene af en liden spids Klo. Arterne ere smaa, og denne Slægt indbefatter de mindste Fugle med luffede Fødder. Stormsvalerne træffes ude paa det vide Hav i stor Afstand fra Landet, De ere næsten natlige Fugle, der paa klare Dage skjule sig i Jordhuler og Klipperister, men ere i Bevægelse paa Havet i Stumringen samt paa mørke og stormfulde Dage. De leve af smaa Gøddyr, klatte i Kolonier paa stejle Klipper, samt føde sine Unger af Struben ligesom Svalerne. Deres Flugt er hurtig men de flyve altid lavt over Vandfladen og staae undertiden med trippende Fødder og udbredte Vinger paa Vandet. Den eneste Art, som findes hos os, er den oven anførte, den lille Stormsval (T. pelagica).

Skrabben (Puffinus Anglorum)

eller Piren er den eneste Art, som forekommer her af Slægten Puffinus. Hos denne Slægt, som man ogsaa kalder Stormdykkere, er Næbbet længere end Sovedet, temmelig smalt, næsten trindt, udad sammentrykt; begge Næver ere randede noget opadboiede, og derpaa pludseligt nedadboiede samt spidse; Undernæbbet uden Vinkel. Benene ere middelmaadige, Tarsen sammentrykt; Tæerne temmelig lange. Bagtaaen dannes blot af en meget liden spids Klo. De dykke efter sin Føde og naar de angribes, søge de at undkomme ved Dykning eller Flugt. Ligesom Lunden grave de med sine lange spidse Kløer Gange under Jorden, hvori de lægge sit Æg. Ungerne ere bedækkede med lange myge Duun og blive i Nedet til de have opnaaet Forældrenes Størrelse.

Anden Familie.

Gaasfugle. (Lamellirostres).

Hos Gaasfuglene er **Næbbet** beklædt med en fin nervørig Hud, i Spidsen forsynet med en haard Negl og i Randen med Tagger eller Tænder, **Næseborene** mere eller mindre fjernede fra Panden, ere til Halvdelen bedækkede med en flad Hinde. Tungen er flødagtig og paa Siderne forsynet med Fryndser, Halsen er lang, tynd, Kroppen undersætsig, flodtrykt. **Benene** sidde temmelig langt tilbage under Kroppen og ere stærklædte næsten lige til Knæet, Tarserne ere korte eller middelmaadige, **Fortæerne** ere forenede ved en heel Svømmehud, **Bagtaaen** er høj med eller uden Hudslap. **Vingerne** ere middelmaadige og spidse med haarde Vingefjære. Hælen er fordetmeste kort og bestaaer af 12—20 Fjære.

Hannen er almindelig større og smukkere end Hunnen, og hos en Deel Arter er denne Forskiel meget betydelig. Ungerne ere forskjellige fra de gamle, men ligesom Hunnen mere end Hannen.

Gaasfuglene opholde sig fordetmeste Høst og Vinter flokkeviis ved Havets Kyster; men mod Hæftetiden fordele de sig parviis og begiue sig til de færste Bænde inde i Landet for at klække der. Kun nogle faa Arter blive ved Havet og klække paa Holme og Stjær. De lægge sine Reber paa bår Mark, i Jordhuller, Bjergkloster eller hule Træer. De lægge et stort Antal eensfarvede Æg, der ruges af Hunnen alene. Ungerne svømme og dykke saasnart de ere krøbne ud af Ægget; Moderen mader dem ikke, men anviser dem blot Føden og beskytter dem indtil de kunne flyve. Hos en Deel Arter slaae Hannerne sig sammen, efterat Parringen er udført og forlade Hunnerne, og man seer dem ikke hos disse igien førend Ungerne ere flyvevorne. Disse ere ikke forplantningsdygtige, førend i det andet eller tredie Aar. Af denne Familie ere mange blevne Hunddyr; deres Æg og

Kjød ere velsmagende og deres Fjær og Duun høre til de bedste af Svømmefuglenes.

Svanen.

(Cygnus Olor).



Svaneslægten har et Næb, der er længere end Zovedet og ved Foden mere høit end bredt; Næglen indtager ikke hele Næbspidsen; Eggen mellem Øinene og Næbbet er hos de Eldre nogen. Salsen er smal og længere end hele Kroppen, Tarsen kortere end Mellemtaaen. De ere de største Fugle i denne Familie. Fjærflødningen er overordentlig tæt og fældes ei mere end en Gang om Aaret. Svanerne ere egentlig ei Træffugle, men de fjerne sig blot for Jfen. Naar de svømme, bære de Bingerne oppustede paa egen Maade og benytte sig undertiden af dem som Seil; den lange Hals føres mere eller mindre S-formigt, hvilket giver dem et prægtigt Udseende. Dykningsevnen er ubetydelig; men paa grundt Vand stille de sig ofte ligesom de tamme Vender med Halsen opad og naae med den lange Hals til Bunden. De svømme fortrinligt, men gaae slet og fjerne sig derfor heller ikke langt fra Bandet. De have vanskeligt for at flyve op; men først

opkomne i Luften er deres Flugt baade høi og udholdende. De leve fordetmeste af Plantekost og Frøer.

Den tamme Svane er hvid; Vandet er forsynet med en Knold, der tilligemed Trakten mellem Nie og Næb og Neglen paa Næbspidsen ere sorte; det øvrige Næb er guulrødt; Neglen er aflang; Tænderne staae ned under Kanten. Saa vel i vild som tam Tilstand forekommer denne Art om Sommeren paa Indsøer og store Damme og andre færske Bælte i det sydlige Sverrige, Dannemark, England, Nordtyskland, Polen, Rusland, i Lilleasien, Persien, ved det kaspiske Hav o. s. v. Efter Klæfningstiden seer man dem hvert Aar i store Flokke udenfor Skaanes sydlige Kyster. Naar den svømmer er den overordentlig skøn og er unægtelig den skønneste Pryd paa en stille Sø ved Skov og Lunde; den udslaaer Ringerne som et hvælvet Seil og udvikler i sin simple snehvide Dragt en overordentlig Pragt.

Sangsvanen.

(*Cygnus musicus*).

Fjærklædningen er hvid, Vandet glat, uden nogen Knold; Næbbet sort, ved Roden guult; Næbneglen bred tilrundet; Tænderne ere ikke synlige under Næbkanten. Deres Hjem er de nordlige Egne af Europa, Asien og Amerika; i Norge hæfte de rimeligviis i Fjeldbrandene i Finnmarken. Seenhøstes og om Vinteren forekommer den hist og her ved aabne Steder i Elve og Indsøer, og man har paa den Tid fudt og fanget flere i Christianiafjorden. Mod Vinteren trække de ud til Havet og sydligere Egne; dog synes det mere at være Isen end Kulden, som fordriver dem; thi mange tilbringe Vinteren udenfor Nordlandenes og Finnmarkens Kyster. Om Høsten og Baaren er det man fornemmelig hører Svanens herligt klingende Sang. Den bestaaer vel kun egentlig af to ender Toner; men hørt ved reen klar Luft paa en af de første friske Vinterdage eller en skøn Baardag er den me-

Iodist Høen, især naar man, hvilket ofte hændes, faaer høre flere af forskjellig Alder, og hvis Stemmer altsaa er af forskjellig Fødsel, paa en Gang. Professor Nilsen siger, at den, hørt i Luften i det Fjerne, ofte har forekommet ham som Hønses Baldborntoner; Andre sammenligne den med Lyden af fjernes Basuner. Denne Lyd frembringes ved en eiendommelig Indretning af Luftrøret.


Vildgaasen.

(Anser cinereus).

Næbbet er hos Gæsene af samme Længde eller kortere end Sovedet, fegelformigt afrundet, nedtrykt mod Spidsen. Næglen er ophøiet, bred og indtager hele Næbspidsen. Benene staae næsten midt under Kroppen; Bagtaalen, der mangler Svømmehinde, naaer til Marken med Spidsen. Gæsene leve fordetmeste i Flokke og opholde sig paa lave, sumpige Enge eller Agre i Nærheden af Vandet. De leve fordetmeste af Græs- og Kornspirer, som de afbide med sine skarpe Tænder. De svømme sjelden og dykke aldrig undtagen inden de kunne flyve og i Fælblingstiden. Benenes Stilling og Længde bevirker, at de gaae bedre end Svaner og Gænder. De ere stye og slue. Naar de græsse eller sove, udsætte de Bagt, som gjør Allarm ved paakommende Fare. De leve i Monogami. —

Vildgaasen har et tykt og stort rødguult Næb med hvidagtig Negl. Benene ere blegt kødfarvede; de sammenlagte Fingre kortere end Halen. — Vildgaasen, som er Stamarten til vor tamme Gaas, tilhører de mere østlige og nordøstlige Egne af den gamle Verden. De flække i Mængde i Indsøer i det nordlige Sverrige, tilbringe Vinteren i Sydeuropa.

Graagaasen.
(*Anser segetum*).



Graagaasen, „Gavla“, har sort Næb med et gult-rødt Tværbaand, Benene ere rødgule, Ringerne længere end Halen; Hovedet mørkbrunt. Graagaasen forekommer og flækker i de nordlige Egne af Europa, Amerika og Asien. Om Vaaren drager den i store Skarer langs Elve og Vanddrag gjennem det sydlige Norge mod Norden. Over Christianiabasen trække de i temmelig Mængde i Slutningen af April, til de flade Her i den nordre Ende af Nieren, der er deres fornemste Hvileplads. I September og Oktober trække de tilbage men holde sig da mere til Søfysterne. Omtrent ved samme Tid om Høsten ankommer den i Skarer paa mange Tusinde til England, Frankrig, Holland og Tydskland, og tilbringer der Vinteren paa Agre og Enge, der ei ligge langt fra Vandet. I Sveitz og Egnen om Rom opholde de sig i stor Mængde fra Januar til Februar og Marts. Naar Vaaren kommer, bryde de op mod Norden og standse ikke, idetmindste ikke for længere Tid, førend de ere komne indenfor Polarkredsen. De trække Nat og Dag og tilbringe Natten paa en Indsø eller et andet større Vand. Deres Skrig under Flugten har man udtrykt med følgen-

de Stavesser: dabbadat keia jypiaaa aaarrreibiram. Paa Holmerne og Nerne udenfor Helgelands, Saltens og Finmarkens Kyster klækker denne Gaaseart i Mængde og ligeledes paa Island. Efter Klækketiden søge de gjerne til høie Steder, hvorfra de have en vid Udsigt, og saaledes kunne mærke sig nærmende Fære. I disse Egne, hvor den klækker i større Mængde ansees, den for en meget skadelig Fugl, som Indbyggerne af flere Egne i Helgeland og Salten regne blandt Hindringerne for Agerbrugets Opkomst og Blomstren. Naar den ankommer om Vaaren, slaar den ned i store Skarer paa de grønne Rugagre, som den afgraver, eller paa de nys tilsaade Bygagre, hvor de med Næbbet opsoge de udsaaede Korn. Naar Hunnerne have fjernet sig for at klætte sine Æg, stryge Hannerne om og hærje Agrene. Om Høsten før Afreisen samles Unge og Gamle paa de modne Kornagre, som ligge ved Kysten af Havet eller ved andre Bænde. Kornmarkerne hjemses saaledes fra Vaar til Høst af disse graadige Gæster. — De ere overordentlig flye og forsigtige og saaledes vanskelige at komme paa Stod. — Naar de sælde kunne de som andre Gaasarter ikke flyve, men de dykke derimod med megen Færdighed. Under denne Tid opholde de sig fordetmeste paa Havet, hvor de søge at undgaae Forsølgelser ved at svømme og dykke. Ofte blive de dog eftersatte i Baade af Fiskerne og dræbte med Nærerne. I de svenske Lapmarker driver man i Fælbingstiden en meget fordelagtig Jagt efter dem med Hunde.

Stokanden.

(Anas Boschas).

Enderne have et bredt, nedtrykt og but Næb. Overnæbbet, der er meget bredere end Undernæbbet ender med en smal indbøiet Negl og er paa Siderne forsynet med sammentrykte lamelformige Tænder. Benene sidde næsten midt under



Stokanden.

Kroppen. Enderne ere middelmaadige eller mindre Svømmefugle med libet Hoved, smal Hals, der oftest er af Kroppens Længde, og lang bagtil affmalnende Krop. De fælde to Gange om Aaret og Hannen undergaaer derved betydelig Farvesforandring. Hos de fleste Arter findes paa Vingerne en metallisk glindsende Plet, som man kalder Vingspeilet. Lustrøret er, hvor det deler sig mere eller mindre opsvulmet til en been- eller brustagtig Blære. Enderne opholde sig til alle Tider helst paa sivbegroede Bunde, der ere saa grunde, at de kunne naae Bunden med Hovedet. De leve af Vandplanter, Korn, Frø, Orme og Insekter. Paa Landet gaae de daarligt. Deres Flugt er let, raff og hvinende. De dykke ialmindelighed ikke, undtagen i Fældningstiden, og førend Vin- gesserene ere udborne hos Ungerne. I Parringstiden leve de parviis, men naar Hunnen begynder at ruge, samle Hannerne sig i Flokke og indfinde sig ei igien hos Familien førend Ungerne ere flyveborne. Hunnen lægger næsten altid sine 8—16 Æg paa Marken paa et Rede af tørt Græs og omgiver dem med Duun. Saa snart Ungerne ere krøbne ud af Æggene, begive de sig i Mod- deres Selskab til Vandet, hvor de søge sin Føde.

Stokanden, Vildanden eller Græsanden har blaat Vingspeil, der paa begge Sider er indfattet med en sort og hvid Streg samt oventil begrændset af Sort.

Stokanden, der er den vilde Stamart til vore tamme Vender, indtager en meget betydelig Zone af Jorden saavel fra Ost mod Vest som fra Syd mod Nord; den findes nemlig i det hele nordlige og tempererede Europa, Asien og Amerika. Den klækker saavel i det sydligste som nordligste Norge og er overalt meget almindelig. Om Høsten træffes den om Dagen i Flokke paa Havet, men trækker om Aftenen op i Kjørn og Damme, hvor den tilbringer Natten. Mod Vinteren trække de fleste mod Syd, men en Deel blive dog tilbage og træffes under den kolde Aarstid ved aabent rindende Vand. I Juli indtrækker Hunnernes Fælding; de store Flokke opløse sig da, og hvert Individ søger omhyggeligt at skjule sig mellem Siv og Græs, fornemmelig i Juli, da Vingefjærene fældes og de ei kunne flyve. De skydes for Hund paa Drag, for Bætter (malede eller udstoppede Vender) og i Baagerne paa Isen; de fanges i Garn, paa Krog og mange andre Maader.

Den tamme And.

(A. Boschas domestica).

Er kun forskjellig fra den vilde i Farven. Fra umindelige Tider af er den bleven Huusdyr saavel formedelst Kjødet, som for Egg og Fjære. Om Aaret kan en And lægge 80 Egg.

Moskus Anden.

(Anas moschata).

Man kalder denne urigtigt den tyrkiske And, den findes baade vild og tam i Brasilien og Paraguay, hvorfra den er bleven overført til Europa, i hvis tempererede sydligere Egne den temmelig almindelig findes tam. Eggen om Ræbbet og Raffen er hos denne And besat




Moskusanten.

med Borter. Benene ere røde, Kroppen fordetmeste sortgrøn med Metalglands; Vingespeilet er hvidt; Hovedet, Halsen og de andre Dele ere hvidplettede. Den er af Størrelse som en liden Gaas. Hannen, der lugter stærkt af Mustus, parrer sig med den almindelige And, og frembringer ofte Bastarder, der dog ei skulle være frugtbare.

Frikanden.

(*A. crecca*).



Vingespeilet er i Midten prægtig grønt, oven og nedtil indfattet med Sort. Vingespiærernes Skæfter ere

brune. Krikanden er ligesaa almindelig som Stokanden og forekommer omtrent i de samme Zoner; dog synes den at gaae endnu længere mod Syd; thi den findes lige til China og Persien. I Scandinavien forekommer den overalt. Den ligger høit paa Vandet, er rask i alle sine Bevægelser samt flyder meget let og stille op. Dog er den ikke sky og man kommer den uden Vanskelighed paa Skud. Den er Træffugl og ikke en eneste bliver Vinteren over hos os. Om Vaaren komme de tilbage i mindre Flokke, men fordele sig snart parviis.

Edderfuglen.

(*Fuligula mollissima*).

Denne Slægt adskilles ved første Dietkast fra de foregaaende, derved at Bagtaalen er forsynet med en Sudlap. Nebneglen indtager hos de fleste hele Spidsen. Kroppen er mere kluntet og undersætsig end hos de foregaaende; Hovedet tykt, oftest med opblåste Hjæere; Halsen er meget kortere end Kroppen. Skinnene, der for en Deel er omgivet med den almindelige Bedækning, har ovenfor Ledet en spids Udstaahed, ligesom hos de egentlige Dykkere. Hannen er hos denne Slægt ulig Hunnen. De fælde to Gange om Aaret. Hjærklædningen er tættere og duunrigere end hos de foregaaende. Hos ingen af dem findes noget metalglindsende Bingespeil; Beentisten ved Hannernes Lustror er meget rummelig. — De opholde sig mest paa dybe Bandede, svømme og dykke fortrinligt og langt. De gaae daarligt, men flyve hurtigt. Deres Fode er animalst og de hente den ved Dykningen. De fleste klæffe ved første Bandede og Hunnen ruger alene Eggene. Hannerne slaae sig da sammen i Selskaber og besøge større Strande eller fjerne Søer, hvor de fælde. Udenfor Klætningstiden leve de paa Havet. Man kalder Slægten Dykender.

Edderfuglens Næb affmaalner udad, er forsynet med to i Panden langt opgaaende nøgne spidse Vinkler

og en mellem disse liggende udadgaaende fjærklædt, der er meget kortere end de fjærklædte Sideflige, der gaae frem under Næseborene. Panden har aldrig nogen Knold. Hannen er hvidbroget, Hunnen graaspraglet. Denne for sin fine elastiske Duun saa berømte Fugl, findes i de nordlige Egne af de tre Verdensdele. Den forekommer ved alle Scandinaviens Kyster og enkelte Par klætte ogsaa hist og her, endogsaa i Skaane og paa Hvaløerne i Christianiafforden; men findes dog ingensteds i den uhyre Mængde som i den norske Stjærgaarde indenfor og i Nærheden af Polarfredsen, hvor den fredes og hvor Egningen stæer sparsomt og med Forskand. Saadanne fredlyste Stjærgrupper kaldes Eggvær eller Fuglevær. Edderfuglen opholder sig altid i det aabne Hav eller blandt de nøgne Stjær udenfor Kysterne. De flyve aldrig af egen Drift langt fra Havet; selv naar den trækker fra den ene Viig til den anden, tager den neppe nogensinde Kursen selv over den smaleste Landtunge, men følger noiagtig Omridset af Kysten. Naar Edderfuglen om Vaaren af Storme kastes ind i Landet, saa den taber Havet af Syne, skal den tabe Flyveevnen og blive saa forvirret at den kan gribes med Hænderne. Om Vintere spærmer den Vild og fly omkring i store Skarer, men fordeler sig mod Vaaren parviis og indfinder sig i April ved Stjær og Holme, hvor de gamle Hunner opsoge sine forrige Klæffesteder; de yngre vælge sig nye. Naar Parringstiden er forbi og Egningen begynder, begive Hannerne sig flokkeviis ud i aaben Sø. Naar Ungerne ere fuldborne, i Midten af August, forene flere Familier sig og Hannerne stode da til dem lidt efter lidt. I Begyndelsen af Mai og Juni finder man deres Egg — 5 til 6 — i en Klost eller Hul paa Steenhellerne nær ved Vandet. Underlaget bestaaer af tørre Straae eller Tang, hvorpaa der ligger en Seng af Duun, som Fuglen har plukket af sig og som ogsaa danner en Krands om Eggene. Hunnerne ere paa de beboede Holmer, hvor man længe har fredet dem, saa tamme, at de lægge Egg

Inde i Baadnostene og undertiden inde i Rjoffenet hos Fisserne. Naar de ruger kan man røre ved dem, klappe og stryge dem, uden at de gjøre Mine til at flybe; ja, man kan endogsaa løfte dem op fra Eggene uden at de ytre sin Misfornøielse derover ved andet end en hvæsende eller knurrende Lyd. Edderfuglen er en af Norges nyttigste Fugle, og kunde blive endnu langt mere indbringende, end den er, hvis man fredebe og omgiffes huusholberiff med den overalt i Landet. Inden kort Tid vilde den da uden Tvivl forege sig talrigt og give en betydelig foreget Indtægt af Eg og Duun. Dunene ere under Navn af Edderdun verdensbekjendte for sin Lethed og Elasticitet.

Fisken.

(Mergus Merganser).

Fiskenderne, (Mergus) have et smalt og spidst Næb, hvis Kanter ere forsynede med spidse, fordetmeste tilbagerettede, saugtaffede Tænder; Overfjærens bestaaer af en nedbøiet stump Negl. Paa Hovedet har den nogle opblæste Fjære; Halsen er lang; Skinnebenet meget indtruffen i Kroppen; Larsen sammentrykt, Bagtaalen der sidder høit, er forsynet med en bred Hudlap; Halen er afrundet, bestaaende af 11—20 Fjære. Hunnen er ulig Hannen. De fælde en Gang om Aaret og Vinterdragten ligner Sommerdragten. Fjærklædningen er meget tæt og haard. Ved Hannens Lustrør er der en Beentfiste. De leve saavel paa Salt- som Færkvand, ialmindelighed flokkeviis undtagen i Forplantningstiden. Medens Hunnen alene ruger, klækker og opfoder Ungerne, danne Hannerne Flokke paa andre Steder. — De ere meget graadige og leve næsten udelukkende af Fisk. De svømme dybt og dykke langt, men gaae daarligt og i opret Stilling. Flugten er høi og ubholdeude. Rjodet er tranet og flet.

Den store Fiskand (M. Merganser) har hvidt Bingespeil; Benene og Undernæbbet røde; Afstanden fra Næseborene til Næbspidsen er neppe længere end den halve Ider-taa; Fjærduffen i Halsen er tyk; hos Sunnen mindre mærkelig. Hannen er fornemmelig sort og hvid; under hvoilguul; Sunnen er oventil assegraa med rødbrunt Soved og hvid Hals. Denne store og smukke Fugleart er vidt udbredt saavel i den nye som i den gamle Verden. Sin Nordgrændse synes den at have noget indenfor Polarfredsen og udbreder sig derfra ulige langt i forffjellige Lande. Saavel ved Havet som ved Floder og Indsøer i hele Skandinavien til den angivne Grændse mod Norden forekommer og klækker den. Mod Vinteren udbreder den sig langt mod Syden og træffes da talrigt paa Frankrigs, Hollands og Tydsklands Kyster, samt i de større Floder, Elben, Rhin o. s. v. Under Vinteren seer man den ogsaa paa Sverne ved Schweiz og i Eggen ved Rom. Et og andet Par bliver ogsaa Sommeren over ved de høiere Fjeldvande i Schweiz og klække der; men de fleste drage naar Baaren nærmer sig tilbage til Norden, hvor de gamle Fugle indfinde sig ved første aabne Vand og ligge langs Fiskanten i Baagene. De synes ikke at vige for Kulden men for Isen. De lunge taale derimod mindre Kulde og vende først meget senere tilbage. Den større Fiskand er en af de flyvende af vore Svømmefugle; dog kan man undertiden nærme sig den med Baad midt paa Dagen, naar den ligger paa en Klippe og bader sig i Solskinnet. Den synes af alle vore Søfugle at være den, der først lægger Egg. Man finder dem alt i Midten af April. Den skal inden den begynder at ruge dem, lægge indtil 15 Egg, helst i en huul Træstamme 3—5 Favn fra Marken. Underlaget bestaaer af Fjære og Eggene omgives med Dvun. Saa snart som Ungerne ere udklækkede, flytter Moderen strax med dem til Vandet; men det er vanskeligt at forestille sig hvorledes dette gaaer til, da Redet ofte er 12 til 14 Alen fra Marken og 600 til 1000 Alen fra det nærmeste Vand. Det er almindelig bekjendt, at naar den sto-

re Fiskeand mærker nogen Fare efterat den er kommen i Vandet med sine spæde Unger, samler den dem paa sin Ryg og svømmer hurtigt bort med dem. Men om den paa lignende Maade fører dem til Vandet eller om den tager dem i Næbbet er endnu ei afgjort, thi Fiskerne fortælle begge Dele i de Egne, hvor Fuglen klækker. — Til Mærkværdighederne i Fiskandens Historie hører den eiendommelige Maade, hvorpaa den fisker om Hosten. Hele Flokke af dem forene sig da paa fiskegrunde, danne enslags Fiskerier ved at formere en frum Linie og trække sig under Dykken og Slaaen med Ringerne sammen til en grund Vig eller Strand; herefter drive de Fisken sammen og opsluge den i Mængde. Have de ikke faaet nok, gjøre de et nyt Nodværk. Dette Instinkt skal man i de svenske Stjærngaarde have draget Fordeel af ved paa saadanne Steder at udsætte Rysr og bygge Fiskehuse under Vandet. (Bet. Akad. Handl. for 1749 Side 190). Ogsaa paa en anden Maade veed man at drage Fordeel af denne Fugl. Paa de Steder, hvor den klækker udsætter man Holter (hule affaugede Furustokke med en Bund i hver Ende og et Hul paa Midten) paa Træstammer nær ved Stranden. I disse lægger Fiskanden Æg, af hvilke man borttager de fleste tilligemed en Deel Duun. Paa denne Maade har man ofte nødt Fuglen til at lægge over 20 Æg. Har man adskillige saadanne Fugle bliver Fordelen ikke ubetydelig, og naar Besætningen stiger med Forstand og Maadehold kan den ei heller synderlig skade Fuglen. Villigt synes det ogsaa at være at den yder nogen Erstatning for den Skade den tilføier Fiskevandene; thi den er meget graadig og lever alene af Fisk. Som et Exempel paa dens Graadighed og Fordøielseskraft anfører Prof. Nilsson, at han engang skød en Fiskand, som i Svælget havde en Malekrabbe (*Zoarces viviparus*) af 12 Tommers Længde og en deril svarende Tykkelse. Fiskens Hale stod den lige op i Næbbet, medens Hovedet, som var sunket ned i Fuglens Mave, for en stor Deel var fordøiet.

Den lille Fiskand.

(*Mergus albellus*).



Vingespejlet er sort med en hvid Tværfreg over Midten og en bagtil. Denne Fugl tilhører fornemmelig Rusland, Siberien og det østlige Ocean samt de tilgrændsende Dele af Nordamerika, og er temmelig sjelden i Skandinavien, hvor den kun synes at forekomme i de sydlige Dele. Den viser sig saaledes undertiden om Vinteren i det østlige Skaane og er i Norge stød i Sigdal, ved Christiania og ved Frederikstad. Den forekommer almindelig i Selskab med Knipanden og gaaer med denne ligetil Schlesien og Italien. Dens Bevægelser i Vandet ere meget livlige og den dykker med megen Færdighed.

Föruden de anførte Gaasfugle findes i Norge: Blisgaasen (*Anser albifrons*), Fjeldgaasen (*A. leucopsis*), Gaul (*A. torquatus*); Fagergaasen (*Anas Tadorna*), Skovlanden (*A. clypeata*), Spidsanden (*A. acuta*), Bruunnakken (*A. Penelope*), Topanden (*Fuligula cristata*), Bjerganden (*Ful. Marila*). Svartanden, Sjørørren (*Ful. fusca*), Skjæranden, Hvinanden eller Knip-

anden (Ful. Clangula), Stellers And (Ful. Stelleri),
Fisanden eller Havellen (Fulig. glacialis), Erkingen,
(Ful. spectabilis) og Siilanden eller Fiskanden (Mergus
Serrator).

Tredie Familie.

Pelikaner (Totipalmati).

Det første og sikreste Kjendtegn paa disse Fugle
er at de have Aare- eller Pelikanfødder, paa hvilke baa-
de Bagtaagen og Fortæerne ere forenede ved en eneste
Svømmehinde, samt at **Struben** danner en mere eller
mindre nogen Sæk, der kan udvides. Det første anty-
der, at de bevæge sig med overordentlig Lethed i Van-
det; det andet, at de kunne sluges større Rov. — De ere
store eller midelmaadige Fugle med temmelig langstrakt
Krop, lang eller midelmaadig **Hals**, korte undersøftige
Been: Halsen bestaaer af 12—14—20 meget stive Fjære. —
Kjønnene ere lige i Farve, men Ungerne ere meget uli-
ge de gamle. Det er en næsten udelukkende Eiendom-
melighed for disse Svømmefugle, at de, uagtet sine
fuldkomne Svømmefødder, kunne sætte sig i Træer og
gribe om Grenene med Tæerne. De ere alle fortrinlige
Dykkere, der ved Dykning hente sin Føde, som mest be-
staaer af Fisk, op fra Havbøvet; men nogle ere blot
Styrtebykkere, de øvrige Svømmedykkere. De opholde
sig paa Klipper i Havet; men nogle Arter trække langt
og træffes undertiden i Trækningstiden midt inde i Lan-
det. De hæfte kolonivits paa Klipper, i Bjergkloster,
i Skove og Lunde nær ved Havet: de leve i uindskræn-
ket Monogami: begge Mager ruger verelivits og bringe
Mad til Ungerne i Strubesækken. De lægge et lidet
Antal hvide eller hvidagtige Æg.

Havsulen.

(Sula Bassana).



Sos denne Slægt, (Sula), er Næbbet langt, stærkt, sammentrykt og danner en langagtig Kegle; det har en noget frummet Spidse. Overnæbbet er forsynet med en stor langsgaaende Fure, og bag Spidsen med en mere eller mindre mærkelig Tand, Ansigtet og Struben ere nøgne. Havsulerne ere større Fugle, som bestandig opholde sig ved Havet. De ere Styrtedyffere, der fare ned med en saadan Fart, at de trænge flere Favn ned i Vandet. De gaae paa Tærne men daarligt; de svømme godt og flyve tidt og udholdende. De hvile og sove paa Vandet. De lægge et Æg. Maden kaste de ved Nedet og af Strubesæffen og føde Ungen paa denne Maade til, den er flyvevoren. Ved Nedet kan man gribe dem med blotte Hænder.

Havsulen er henved 3 Fod lang. Vingefjærene af første Orden ere sorte med Hjørskaster, der nedentil ere hvide, Ansigtet er blaaagtigt. Den skal forekomme i hele Nord- og Isthavet og selv i den sydlige Hemisfære;

man har saaledes truffet den ved det gode Haabs Fjorberg. De klæffe i umaadelig Mængde paa de Der og Stjær, som ligge omkring Island, Skotland, Færøerne og Grønland. Ved Norges Kyster viser Havsulen sig ikke saa sjelden under Vintersildesfiskeriet. Den flyver meget høit, staaer undertiden stille i Luften og styrter sig derpaa som en Piiil ned i Vandet.

Havsulernes Flugt er høi og ffjøn; ofte kredse de omkring i Luften ligesom Storkene, ofte svæve de lavt nede ved Bølgerne. Naar de have ædt sig mætte, hvile de flydende paa Vandet, og sove undertiden saa haardt, at Skibe kunne seile tæt forbi dem uden at de vaagne. Ei sjælden hændes det, at denne Fugl driver død til Kysterne; saaledes fandtes i 1834 en drevende død i Christianiaffjorden mellem Drøbak og Christiania, hvor den ellers pverst sjælden viser sig. Indbyggerne af de Der, ved hvilke Havsulen klæffer, anvende dens overordentlig fede Unger til Vinterføde.

Storsharven.

(Phalacrocorax Carbo).

Næbbet er langt med hele skarpe Kanter. Spidsen af Overnæbbet er foran Undernæbbet nedbøiet til en Sæge. Viekredsen, Kinderne, Mundviger og Underhage ere nøgne. Mellemtaagens Klo er paa Indsiden kamformig indskaaren. Galen, som er afrundet, bestaaer af 12—14 faste elastiske fjære. Stærkerne ere store eller middelmådige, oftest sortagtige Fugle, der fordetmeste opholde sig og klæffe kolonivis paa Stjær og Klipper, undertiden ogsaa i Træer, i eller nærved Havet. Om Vinteren trække de undertiden, og komme da tilfældigvis til Steder langt borte fra Havet, hvor de sætte sig paa Kirfetaarne og andre høie Steder, som de i det Hele synes at gjøre meget af. De staae lige op og støtte sig derhos paa den lange stive Ha-



Stor skarven.

le som til et tredie Been, og viste derhos med Bingerne, for at tørre Fjærene. De dykke dybt og langt forat fange Fisk, som de først svælge ned naar de ere komne op. De lægge 3—4 uplettede Æg. Ungerne opfødes af begge de gamle, fra hvilke de adskille sig i Dragt. Han og Hun ere blot forskjellige i Størrelse.

Stor skarven kaldes ogsaa Kvitlaaring, Nalekraake, Kormoran. Den er sortbrunn og af Størrelse som en Gaas. Næbbet er længere end Tarsen. Halen bestaaer af 14 Fjære. Stor skarven findes i begge Verdensdele, men opholder sig fornemmelig i Skjærgaardene, især udenfor de nordlige Kyster af Norge, hvor man ofte seer den i meget betydelig Mængde paa adskillige høie og lodrette Klipper, der ere ligesom hvidkalkede af Fuglens Exkrementer. Den er fly og vanskelig at komme iftud. Naar man nærmer sig det Skjær, hvorpaa den staaer, gaaer den enten sagte ned til Havet og svømmer bort eller og styrter den sig hovedkulds ned og dykker. Den flyver ugjerne, men svømmer og dykker med stor Færdighed. I China bruger man en Art af Kormoranen, der synes at

være forskjellig fra vor, til at fiske. Man trykker den en Ring om Halsen, hvorved den hindres i at sluge Fiskene. Naar den er bleven træt heraf, tager man Ringen af og lader den fiske for egen Regning, eller giver den en Deel af de fangede Fiske.

Den anden Art af Skarv, som findes her i Landet, er Smaaskarven eller Topskarven (*Phalacrocorax cristatus*).

Pelikanen.

(*Pelicanus onocrotalus*).



Pelikanerne have et Overnæb, der gaaer ud over Kanterne af Undernæbber; ved Undernæbets svage bøielige Grene, hænger en voluminøs Sæk, der kan udvides. Fjærene ere hos de fleste Arter hvide. Salen er afrundet. — De ere store Fugle, der klække i Sumpe og lægge 2—3 Æg. Endnu værre Fiskerøvere end de Foregaaende, samle de, fornemmelig i den Tid de have Unger, i Kroen og Stru-

besættten et betydeligt Antal Fiske, som de gylpe op igjen til Ungerne, hvorfra rimeligviis Fabelen om at den opriver sit Bryst og nærer Ungerne med sit eget Bloder kommen. Pelikanerne skulle, ligesom Fiskænderne, forene sig og gjøre lignende Rodvarp som disse. Deres Flugt er høi og skøn, især naar de ere komne op til en betydelig Høide.

Den almindelige Pelikan er noget større, fornemmelig tykkere end Svanen og 20—25 Pund tung, svagt rødagtighvid; Næbbet er guult, i Spidsen rødt. Næbben, Dinene og Strubesættten ere gule, Svingfiærene sorte; paa Baghovedet har den en liden Kalot. Den er $5\frac{1}{2}$ Fod lang; men heraf udgjør Næbbet og Halen $\frac{1}{2}$ Fod. Bingebredden er $8\frac{1}{2}$ Fod. Pelikanens egentlige Opholdssted er de varme Lande i den hele Verden, med Undtagelse af Amerika. Meget hyppig er den i det tempererede Asien, ved det sorte og kaspiske Hav. I Grækenland, det sydlige Rusland og Ungarn forekommer den ogsaa i temmelig betydelige Stærker. I det mellemste Europa forekommer den sjelden, men den viser sig dog der undertiden som i 1768, da man fra Lindau ved Bodensøen saae 130 Pelikaner. Skjønt dens Vinger i Forhold til Legemet ikke ere store, saa flyver den dog ret godt; thi Luften trænger næsten ind i alle dens Been og selv ind i Sellevævet under Huden, hvilket gjør dens Legeme meget let. Raster man Føde til den, saa griber den samme i Luften. — Fra de ældste Tider har man anført denne Fugl som et Symbol paa moderlig Kjærlighed og ogsaa fortalt mange andre fabelagtige Histo-rier om den.

Fjerde Familie.

Dykkere (Brachypteri).

De Fugle, som man har henført hertil, stemme overens deri, at de alle ere fortrinlige Svømmedykkere, samt

at de ved Dykningen skaffe sig Føde i Vandet. **Benene** sidde langt tilbage ved Siderne af Gumpen og ere for-
detmeste bøiede udad. De gaae derfor megetdaarligt og
de fleste støtte sig tillige paa hele Bagfiden af Tarsen.
Tarsen er sammentrykt, kortere end Mellemtaaen;
Fortæerne ere lange og forsynede med heel eller deelt
Svømmehud; **Bagtaaen** er fri og forsynet med Hud-
lay, eller ogsaa mangler den. **Næbber** er kort eller mid-
delmaadigt, mere eller mindre sammentrykt og haardt,
spids og ret, med nedbøiet eller ret Spids. **Galen** er
meget kort, bestaaer af 12—20 Fjære eller ogsaa mang-
ler den og der sidder en Duff af Duun istedet. De svøm-
me og dykke bestandig eller ogsaa staae de i lige Stil-
ling paa Stranden eller Klippen. Deres Binger ere
meget korte og smale, hos en Deel spidse, hos andre til-
rundede. Naar de dykke eller svømme under Vandet
bruge de baade Binger og Been som Finner og flyde
paa denne Maade frem med en forbausende Hurtighed.
De første Slægter i denne Gruppe flyve baade høit og
temmelig let; men af de sidste findes Arter, som aldeles
ikke kunne flyve og som saaledes for stedse ere bundne til
Havet. Deres Føde bestaaer fornemmelig i Fisk og
Krustaceer; nogle fortære ogsaa Vandplanter. — De
lægge et lidet Antal Æg. Ungerne ere ulige de Gamle
og disse, som fælde to Gange om Aaret, ere meget for-
skjellige i Sommer- og Vinterdragt.

Opplømt.

(*Podiceps cristatus*)

Sos denne Slægt (*Podiceps*) er Overnæbbets
Spids ubetydelig bøiet; Undernæbbet har en svag
Vinkel. Tøilerne ere bare. Tarserne ere meget
sammentrykte, Fortæerne lange, nedtrykte, forenede
ved Roden, udad fløvede, men kantede med en bred
Svømmehinde. Bagtaaen er sammentrykt og for-



Topplommen.

synet med en Sudlap; Kløerne danne brede fladtrykte Negle. Salen mangler. Dykkerne tilbringe hele Sommeren paa færste Bande; da de gaae slet, seer man dem sjelden paa Stranden, men de opholde sig næsten bestandig paa Vandet, hvor de endogsaa sove. De svømme og dykke med overordentlig Færdighed, og ligge dybt i Vandet, især naar de mærke nogen Fare; naar Binden kruser Bandfladen, seer man neppe mere af dem end den smale Hals med sit ligesaa smale Hoved, der staaer op af Vandet som en Pinde. Skyder man paa dem, eller de mærke nogen anden pludselig Fare, styrte de sig hovedfuld som en Piil under Vandet og komme ei op, og flyve ei heller op sørend de ere udenfor Skudvidde. De bygge af Vandplanter et Rede, der flyder paa Vandet, og befæste det til Siderne. De leve i Monogami, og begge Mager ruge Ungerne, og saasnart disse ere udklækkede, føre de Gamle dem strax med sig ud paa Vandet.

Toplommen eller den hvidstrubede Dykker er den største af sin Slægt og har den længste Hals. Den er 20 Tommer lang. Den er mørkebrun. Halsen foran og de nedre Legemsdele ere hvide. De Gamle have en tydelig rødbrun fortkantet Halskrave. I Nakken har den en lang tvedeelt Hjørnbusk, der oftest er sort. Denne Dykker er sjelden hos os, men forekommer og flækker i Mængde i Tydskland, Holland, England, Frankrig, i hele Rusland, Sibirien og det Indre af Nordamerika. Om Vinteren forekommer den i Schweiz og Italien. Toplommen er sky og forsigtig, især der, hvor den har været udsat for nogen Følgelse, og dens skarpe Syn og fine Hørelse advarer den betimeligt for enhver Fare. Den flyver sjelden uden i Fortplantningstiden.

AF Dykkere forekomme desforuden i Norge: den graastrubede Dykker; (*Podiceps rubricollis*), den nordiske Dykker (*Pod. arcticus*) og den lille Dykker (*Pod. minor*).

Den almindelige Lom.

(*Colymbus arcticus*).

Lomslægten udmærker sig ved et middelmaadigt, langt, sylformigt, næsten ret, stærkt sammentrykt Næb, der har indbøiede Kanter og en ret, meget hvas Spidse. Næseborene, der ligge paa Siden, ere oven og bagtil omgivne med en Zinde. Pandeskjællene har en foroven indgaaende Vinkel. Zovedet er stort, tilspidset fortil; Toilerne stærklædre. Benene ere temmelig store og ligge langt tilbage ved Siderne af Salen, med sammentrykte Tær og lange med heel Svømmehud forenede Fortær. Bagtaalen er kort og forsynet med Sudlap. I Levemaade have Lommene megen Lighed med Dykkerne: de dykke og svømme med overordentlig Færdighed, føre Kroppen dybt i Vandet og opholde sig om Sommeren paa Indsøer og andre Færstænder. Om Vinteren opholde Lom-

mene sig paa Havet og trække da til blidere Himmelstrøg. De flyve sjelden ved andre Tider end Forplantningstiden; men da er deres Flugt baade høi og hurtig. Deres Strig er skarpt og gjennemtrængende og Nordboen paaer efter det Veirforandringer.

Søs den almindelige Lom er Næbbet oventil noget mere hvælvet end under; Næbsømmen er noget nedbøiet; fra Bingeleden til Spidsen er 13 — 13½ T. Hovedet og Halsen er oventil afegraa; Struben og Halsen fortil sorte med violet Glands. Ryggen, Skuldrene, Bingerne, Dvergumpen og Siderne ere reent sorte. Bryttet, Naven og de nedre Legemsdele reent hvide. Denne Lom opholder sig i Sommertiden paa Indsøer og andre stille Bande i hele Skandinavien, dog meest i det Indre af Landet. Den nærer sig fornemmelig af Fisk, som den fanger ved Dykning og fortærer naar den er kommen op. Den lægger sine to Æg nær ved Bandet. Ofte udflettes ei mere end det ene Æg, og undertiden dør den ene Unge nogle Dage efter Klækningen. Den gjenlevende opfødes med særdeles Omhu af Forældrene, som, naar de forfølges, eller i Storm ville sætte over et større Band, tage Ungen paa Ryggen og føre den med sig. I Lapland, hvor man fanger Lommen i Slagjern, spises Kjødet og Skindet af Halsen bruges til Huebræm. Her bruger man Lommeffind til Jagttafer. Foruden den almindelige Lom have vi Fislommen eller Havimmern (*Colymb. glacialis*) og Smaalommen (*C. septentrionalis*) i Norge.

Lommen.

(*Uria Troile*).

Næbbet er ret op, temmelig smalt og ligesaa bredt som høit; Overnæbbet er hvælvet og i Spidsen noget nedbøiet; Undernæbbet har en mere eller mindre tydelig Vinkel, Fortæerne ere temmelig lange med heel Svømmehud; Bagtaen mangler.



Lombien.

Kløerne ere hvasse og frogede. Fuglene af Slægten *Uria* opholde sig altid paa og ved Havet. De svømme og dykke fortrinligt, staae opret og gaae paa hele Tarsen, det sidste med Besværlighed. De leve i Monogami, hække kolonibvis i Steenure og lægge et eller to Æg, uden noget Underlag, paa den blotte Steen. Han og Hun ruge Ungerne verebvis og bære Smaafisk til dem i Næbbet.

Artsmærket hos Lombien eller den spidsnæbbede Alke er, at Vingefjærene af anden Orden ere hvide i Spidsen; for Øvrigt ere Vingerne ensfarvede; der gives ellers af denne Art en heel Række af Former, hvis Extremer ere saa ulige, at de af de fleste ansees for forskjellige Arter og beskrives under forskjellige Navne.

Lombien forekommer ved de fleste nordlige Kyster lige til Scandinaviens sydligste. Saaledes forekommer den om Høsten meget hyppigt i Christianiafjorden, hvor den gjerne viser sig før Alken (*Alca torda*) og flydes, efter Rask, tilligemed denne af Byens Jægere og Ikkjægere til et Antal af 3 — 4000. I størst Mængde hæfter den indenfor Polarfredsen blandt Maager, Alfer

og Lunnefugle og man seer dem der samlede i saadanne Masser, at de bedække en stor Deel af Havfladen. Her finde vi Noget, der, rigtignok i mindre Maalestok, erindrer os om Amerikas umaadelige Landfuglesværme. Boie fortæller i sin „Reise gennem Norge“, om et Træktog af disse Fugle og Alker (Alca Torda) ved Mostafjeldet paa Lofoden, der havde den uhyre Udstrækning i Længde, at han ti Gange kunde lade og afstykke sin Dobbeltbøsse inden hele Sværmen, som var mindst 1000 Skridt bred, var kommen over ham. Man seer sjelden eller aldrig disse Fugle gaae; enten svømme, dykke eller flyve de; paa Klipperne staae de lige op og ned, støttende sig paa hele Tarsen og Fodsaalen, og man seer ofte Stjærene aldeles bedækkede af dem. Naar de ville flyve op, kaste de sig hovedfuld i Luften fra Klipperne.

Foruden Lomvien findes i Norge ogsaa Teisten, eller Peer Drifter (Uria Grylle). Den er sort med hvid Plet paa Vingen og røde Been. Længden 13 Tommer.

Alkekongen.

(Mergulus Alle).

Næbbet er hos Slægten Mergulus meget kort, tykt, oventil hvælvet, ved Roden ligesaa bredt som høit, nedad noget sammentrykt med indbøjede Næbkanter. Over- og Undernæbbet ere lige lange; Næbsømmen er bøiet. Næseborene ere halvdækkede ved en nogen hvælvet Sud. Benene ere korte og sidde langt tilbage; Fortæerne ere lange med heel Svømmehud. Indertaaen er omtrent halv saa lang som Yder- og Mellemtaaen, Bagtaaen mangler. De herhen hørende Fugle opholde sig i Havet omkring Nordpolen, hvor de flække i Kolonier. Om Høsten, naar Drifisen samler sig om deres Fødested, drage de mod Syd. De ere korte og undersætsige Fugle, der dykke med megen Færdighed og flyve hurtigt og udholdende.

Alsekongen er sort og hvid; nogle hvide Streges paa Skuldrene og den anden Ordens Bingesjære i Spidsen hvide. Ved Spidsbergen, Grønland og de øvrige nordligste Dele af Amerika forekommer Alsekongen i største Mængde; men allerede Jisland ligger sydenfor dens egentlige Zone. Under sin sidste Opdagelsesreise til Nordpolen, saa Kapt. Parry saa umaadelige Skarer af disse Fugle, at de deels siddende paa Jisstykkerne og Vandet, bedækkede store Strækninger deraf, deels flyvende formørkede Luften. De vare saa lidet fly, at man kunde dræbe dem ved at kaste Stene iblandt dem. To og tredive Stykker bleve skudte i et Skud, og med tre Bøsser sælledes paa 5—6 Timer 1263 Stykker. Ved Skandinavien klæfter Søkongen, saavidt man veed, ingensteds, men kommer blot til vore Kyster som Strog- og Træfugl under Vinteren. „Naar den egentlige Alsejagt er forbi, og Kulden begynder at krave de inderste Bugter af Christianiafforden, viser denne lille Søfugl sig undertiden i stor Mængde. Undertiden forvilder den sig ogsaa paa Indsøerne og Floderne dybt inde i Landet“.

Lunnefuglen.

(Mormon arcticus).

Sos denne Slægt er Næbbet kortere end So: vedet meget høit, og stærkt sammentrykt, og furet paatværs. Ved Roden er Overnæbbet kantet med en punkteret Svulst. Tarserne ere kortere end Tæerne; Bagtaalen mangler. Aløerne, fornemmeliggaa Indertaaen, ere stærkt sammentrykte, krogede og spidse. De leve i Kolonier i de arktiske Have, hvor de bedække Stær og Holme. De hæfte i Huller, som de selv grave i Jorden mellem Steenurene og lægge et eneste Æg. De gaae bedre end Lombvier og Alker; thi de støtte sig blot paa Fodsaalen. De dykke og svømme fortrinligt. Deres Fode er Krustaceer, Mo-



Linnéfuglen.

luster og Smaafiske, som de ogsaa bringe i Næbbet til sine Unger.

Linnéfuglen er oventil sort, under hvid og har en sort Halsring; Hovedets Sider ere graae. Foran Næseborerne er der (hos de Fuldborne) idetmindste tre Tverfurer. Denne Fugl tilbringer Sommeren alene i Polarhavet; der opholder den sig og hækker kolonibiis i umaaelige Skarer paa Siderne af høie og bratte Klippesøer. Saadanne Fuglebjerge ere ved Norge: Lovunen og Fuglesøen ved Nordlandene, Solandsnuppen m. fl. i Lofoden, Fuglesøen og Sværholt ved Finmarken. Ved disse Steder skal Fuglen vise sig i Mai, men den gaaer et i Land, førend al Sneen er bortsmeltet. Derpaa op søger den sine gamle Klækksteder i Steenuren. Blandt de fra Bjergene nedrasede Stene, der ere mere eller mindre bedækkede med Jord, grave Fuglene sig Gange og Huller, der undertiden ere over en Alen lange, og i det Jnderste af disse lægger Fuglen et eneste smudsigt hvidt Æg af Størrelse som et Andæg. Endstjønt den hækker flokkebiis og flere undertiden klække i samme Jordhule, lever den dog i Monogami og Magerne hjæl-

pes ad ei blot med at udruge Eggene, men ogsaa med at bære Mad i Næbbet til Ungerne. De føde dem fordetmeste med Smaafisk, som de fange ved Dykning. Hermed ere de fornemmelig sysselsatte i Juli Maaned, da man hele Dagen seer dem flyve frem og tilbage, mellem Havet og Røderne. Naar man nærmer sig det Bjerg hvori Kolonien hæfter, hører man en ved Fuglenes Frem- og Tilbageflyven forarsaget uophørlig Susen i Luften ligesom af en stærk Vind, og Solen for-
dunkles af deres Skarer. Dog ere ei alle i Bevægelse i Luften. Klipper og Skjær ere ogsaa bedækkede, og rundt omkring paa Havet ligger utallige spredte. I Midten af August ere Ungerne flyvevorne og forlade først da Rødet. I Slutningen af Maaneden skulle de trække bort mod Sydvest. Senere paa Høsten viser der sig unge Individuer af disse Fugle i Christiansfjorden. I de Egne, hvor Lunnefuglen slækker, udgjør den en af Indbyggernes fornemste Næringskilber og et af Vilskaarene for deres Tilværelse der. Saavel Kjødet som Fjærene anvendes; og Kjødet af de Unge er ogsaa ret godt. Indbyggerne nedsalte dem i Tønder og anvende dem til Vinterføde. Dunene ere næsten af samme Værdi som Ed-derduun. De jage Fuglen med Hunde. af hvilke hver Bonde holder 6—12 Stykker, der have nogen Lighed med almindelige Fuglehunde. Almindelig sendes en Dreng eller en Pige hen i Uren Kl. 3 om Morgenen. Derpaa lader hun Hundene adspredde sig. Naar en Fugl vender tilbage med Mad til sin Unge og har styrket sig ind i et Hul, stiller Hunden sig paa Luur ved Nabningen og saasnart Fuglen kommer tilbage fra Rødet, tager Hunden Tag i den. Ofte trækker Fuglen sig tilbage, naar den bliver Hunden vaer. Denne kryber da, hvis den kan, ind og dræber Fuglen i Rødet. Ofte hugger denne sig fast i Hundens Snude med sit skarpe Næb og rækker den slemt til. Pigen, der følger Hundene, optager hvad der fanges, vrider Halsen om paa hver Fugl, stiller Hovedet under et Baand, som hun har omkring Livet, og har paa denne Maade inden kort en Krands af Lunnefugle omkring

fig. Ved at bære sin Fangst paa denne Maade har hun Armen fri til at bruge den Kjæp hun bærer, og i hvis ene Ende der er fæstet en Krog, som anvendes til at gribe og udtrække Fugle af Uren med.

Alken.

(Alca Torda).

Næbbet er hos denne Slægt middelmaadigt; dets underste Salvedeel er bedækket med Fjær; dets ydre høiere, stærkt sammentrykt og furetpaa tværs; Overnæbbet er i Spidsen stærkt kroget foran Undernæbbet. Næseborene ere bedækkede med en stærklædt Sud. Benene sidde meget langt bag; de tre Fortæer ere forenede ved en heel Svømmehud; Bagtaalen mangler. — De hæffe kolonivis i bratte Klippefider og tilhøre fornemmelig de nordlige Have. De svømme og dykke fortrinligt men gaae slet (paa Tarsen); nogle flyve skarpt men kort; Andre kunne ei flyve. De leve af Fisk v. s. v. De lægge blot et Æg og maa de Ungerne, selv efterat de have forladt Nebet. —

Alken, den krumnæbbede eller brednæbbede Alke, er sort, under hvid; de sammenlagte Binger naae over Halsroden og ere dannede til Flugt. Halsen er kileformig, spids og bestaaer af 12 Fjære. — Alken forekommer saavel i Nordsøen som Østersøen; men dens egentlige Hjem er Skjærene indenfor Polarkredsen, hvor den hækker i umaadelige Skarer tilligemed Lunnefuglen og Lomvien. Om Høsten og Vinteren drage en stor Deel sydlige og sees da ved Skaanes og Lybflands Kyster. I October og November flydes de i Mængde i Christianiafiorden. Alken svømmer og dykker med udmærket Lethed, og, skjønt Kroppen er klodset og Bingerne smaa, flyver den dog temmelig hurtigt. Naar den ei er beskæftiget med at fiske, sidder den paa Skjærene i opret Stilling og hviler sig. — Ungerne fanger man ved at trække dem frem af Nebet med en Krog. Paa nogle Steder i de norffe og svenske Skjærgaarde skal man bruge at fange Fuglen i Garn, som udsprendes i Luften mellem Klipper.

hvor den pleier flyve. Alten skal være en Ynder af Musik og de svenske Skjærgaardskarle bruge derfor, naar de ville komme den paa Skud, roende at istemme en Sang, der lidt efter lidt stiger til det frygteligste Skraal, hvorover Fuglen fortryllet bliver liggende stille og flydes.

Geirfuglen.

(Alca impennis).

Geirfuglen, den vingeløse Alke, er sort, under er den hvid; Vingerne ere meget korte og uduelige til Flugt; Halsen er kort, afrundet, og bestaaer af 16 Fjære. Geirfuglen er saa stor som en Gaas og den sjældneste Fugl i Norge. For ti til tolv Aar siden troede man, at den var aldeles udryddet, men den forekommer nu igjen udstoppet hos Naturaliehandlerne til uhyre Priser. Vinteren 1837—38 dræbtes et Exemplar ved Fredrikstad og samme Aar blev et fanget i Jylland. Den er aldeles forsvunden fra Island og Færøerne, hvor den forud fandtes talrigt. Efter ældre Forsfatteres Forsikringer forekom den forud i Havet udenfor Norge og benævnedes af Fiskerne med forskjellige Navne; den gik sjelden i Land, men viste sig paa det aabne Hav og ved de yderste Der; den skal da undertiden have vilst sig i Kattegattet. Ved Grønland og andre Dele af det nordligste Amerika synes den dog endnu at forekomme. Den svømmer og dykker med utrolig Hurtighed, men kan aldeles ikke flyve. Mest opholder den sig paa det aabne Hav; paa Skjærene, som den undertiden med megen Møie klatter op paa, staaer den ret op og ned og synes kun at være lidt flye. Den lever af Fisk og Krustaceer og lægger paa eensomme af stærke Brændinger omgivne Skjær i Huler eller Kløfter et eneste stort aflangt, hvidagtigt med sorte og brune Pletter tegnet Egg. Dunene skulle være fortrinlige og Rødet ganske velsmagende. Denne mærkværdige Fugl, som i ingen Alder og til ingen Aarstid kan flyve, danner Overgangen til den sydlige Halvfugles Pingviner eller Fædgjæs, hvorved Fuglenes Række forenes med Amfibiernes.

BIBL. STE
GENEVIÈVE

